

检查技师资格模拟试卷（四）

壹、 如下每壹道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。請從中选择壹种最佳答案，并在答题卡上将对应题号的对应字母所属的方框涂黑。

1. 血糖测定特异性最佳的措施是

- A. 氧化酶法
- B. 己糖激酶法
- C. 邻甲苯胺法
- D. 比浊法
- E. 干化学法

答案：B

2. 下列论述中哪壹项是错误的

- A. 标本放置于冰箱中（4℃），血糖测定成果偏高
- B. 某些肾脏病人尿中可以检出葡萄糖
- C. 糖尿病患者糖、蛋白质和脂代谢均会出现紊乱
- D. 糖尿病病情轻重与血糖升高程度亲密有关
- E. 糖尿病具有遗传易感性

答案：A

3. 以溴甲酚绿测定血清白蛋白，发生反应的最适 pH 应是

- A. pH 4.2
- B. pH 7.4
- C. pH 3.0
- D. pH 5.6
- E. pH 8.6

答案：A

4. 用缩脲法测定总蛋白时如下哪些说法是错误的

- A. 蛋白质肽键与试剂反应進行双缩脲复合物
- B. 双缩脲法是首选的常规措施
- C. 其中的酒中酸钾钠可以稳定铜离子
- D. 反应是在酸性溶液中進行的
- E. 反应中产生紫紅色络合物

答案：D

5. 醋酸纤维薄膜電泳可把血清蛋白提成五条，由负极数起它們的次序是

- A. γ 、 $\alpha 1$ 、 $\alpha 2$ 、 β 、Alb
- B. Alb、 β 、 $\alpha 1$ 、 $\alpha 2$ 、 γ
- C. γ 、 β 、 $\alpha 2$ 、 $\alpha 1$ 、Alb
- D. Alb、 $\alpha 1$ 、 $\alpha 2$ 、 β 、 γ
- E. $\alpha 1$ 、 $\alpha 2$ 、 β 、 γ 、Alb

答案：C

6. 下列何处不产生 ALP

- A. 骨
- B. 肠
- C. 胎盘
- D. 肝脏
- E. 心脏

答案：E

7. 下列何种物质不合用做尿液中尿酸测定防腐剂

- A. 甲苯
- B. 二甲苯
- C. 草酸钾

D. 盐酸

E. 麝香草酚

答案：D

8. 目前血清酶活力测定最常用的措施是

A. 荧光法

B. 同位素法

C. 量气法

D. 比浊法

E. 吸取光谱的分光光度法

答案：E

9. 血清酶活力测定采用

A. 两點法

B. 壹點法

C. 速率法

D. 终點法

E. 平衡法

答案：C

10. 有关临床血清酶活力测定的下列论述哪项是错误的

A. 可测定产物生成量

B. 可测定底物消耗量

C. 需最适 pH

D. 测定温度為 37℃

E. 底物浓度高下不影响测定成果

答案：E

11. 火焰分光光度法测定血清钠，其发射光谱的波长是

A. 628nm

B. 280nm

C. 450nm

D. 589nm

E. 767nm

答案：D

12. 血气分析标本使用的抗凝剂应为

A. 枸橼酸钠

B. 肝素

C. 氟化钠

D. 草酸钠

E. EDTA-Na₂

答案：B

13. 速率法测定血清碱性磷酸酶所选测定波长为

A. 405nm

B. 450nm

C. 560nm

D. 620nm

E. 280nm

答案：C

14. 精确度最高的临床生化措施为

A. 经典措施

B. 對比措施

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/858035014043006102>