专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年辽宁省普兰店区《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题真题带答案（巩固）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.下列关于紫杉醇的描述，错误的是

A：广谱、天然抗肿瘤药

B：与多西他赛相比，神经毒性和心脏毒性都较轻

C：长期应用可产生抗药性，出现多药耐药性现象

D：应预防由紫杉醇所致的超敏反应

答案：B

2.以下关于比索洛尔说法错误的是

A：为水脂双溶性β受体阻断剂

B：可阻断部分β1受体

C：首关效应高、半衰期短

D：口服吸收率高，中度透过血-脑屏障

答案：C

3.属于头孢三代的是

A：头孢唑林

B：头孢呋辛

C：头孢曲松

D：拉氧头孢

答案：C

4.有关纤维蛋白溶解药的叙述，错误的是

A：能使纤维蛋白溶酶原转变为纤维蛋白溶酶

B：该药也称为血栓溶解药

C：主要不良反应为凝血障碍

D：主要代表药有链激酶、尿激酶

答案：C

5.属于磷酸二酯酶抑制剂的是

A：双嘧达莫

B：替罗非班

C：氯吡格雷

D：替格瑞洛

答案：A

6.能明显抑制骨髓造血功能的药物是

A：庆大霉素

B：青霉素G

C：红霉素

D：氯霉素

答案：D

7.糖皮质激素用于某些慢性病的长期疗法中，采用隔日1次给药法，将48小时用量一次服用，合适的时间是

A：上午8时

B：中午12时

C：下午6时

D：下午3时

答案：A

8.下述药物中属于缓解鼻黏膜充血引起的鼻塞、鼻出血的是()

A: 硼酸

B: 过氧化氢

C: 酚甘油

D: 盐酸麻黄碱

答案：D

9.α肾上腺素受体分布占优势的效应器是

A: 皮肤黏膜血管

B: 冠状血管

C: 肾血管

D: 骨骼肌血管

答案：A

10.关于他扎罗汀治疗银屑病的叙述，错误的是

A: 对严重的银屑病效果显著

B: 不用于18岁以下银屑病患者

C: 成人每晚(睡前半小时)1次，一般12周，使用面积应不超过20%体表面积

D: 育龄期妇女用药前2周，应进行血清或尿液妊娠试验

答案：A

11.与肝素比较，低分子量肝素的特点不包括()

A: 应用期间应常规检测抗凝疗效及调整剂量

B: 半衰期长，皮下注射吸收较好

C: 达肝素钠对延长APTT的作用较弱

D: 不易致出血

答案：A

12.可引起心脏Q-T间期延长的药物是

A：头孢呋辛

B：磺胺甲恶唑

C：克林霉素

D：左氧氟沙星

答案：D

13.对革兰阳性菌作用弱，而对革兰阴性菌作用强的药物是

A：第四代头孢菌素

B：第二代头孢菌素

C：第三代头孢菌素

D：第一代头孢菌素

答案：C

14.促进子宫颈成熟的是()

A：米非司酮

B：普拉睾酮

C：达那唑

D：戈那瑞林

答案：B

15.可用于治疗铜绿假单胞菌感染的药物是()

A：头孢他啶

B：头孢米诺

C：头孢呋辛

D：头孢唑林

答案：A

16.螺内酯利尿的作用机制是

A：拮抗醛固酮

B：抑制Na+，K+-2Cl-转运系统

C：抑制Na+，K+-2Cl-同向转运系统

D：抑制碳酸酐酶

答案：A

17.关于单克隆抗体抗肿瘤药物的描述错误的是()

A：利妥昔单抗主要用于淋巴瘤的治疗

B：对癌细胞和正常体细胞都有"杀灭"作用

C：贝伐珠单抗作用于血管内皮生长因子

D：静脉滴注可致过敏样反应

答案：B

18.依托泊苷注射液的溶媒选择要求是

A：先用氯化钠注射液溶解,再用5%葡萄糖注射液进一步稀释

B：5%葡萄糖注射液稀释

C：氯化钠注射液稀释

D：先用乳酸钠注射液溶解,再用氯化钠注射液或5%葡萄糖注射液进一步稀释

答案：C

19.抑制蛋白质合成的起始阶段，使核蛋白体分解

A：紫杉醇

B：高三尖杉酯碱

C：氟尿嘧啶

D：顺铂

答案：B

20.（2018年真题）适应症仅应用于治疗失眠的药物是（）

A：苯巴比妥

B：氟西汀

C：佐匹克隆

D：地西泮

答案：C

21.头孢噻吩

A：用于非典型病原体感染

B：肾毒性较大

C：脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

D：与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

答案：B

22.下述不属于水溶性维生素的是

A：维生素B1

B：维生素B6

C：维生素

D：维生素C

答案：C

23.西地那非引起的不良反应有

A：嗜睡乏力

B：视觉异常

C：出血

D: 低血糖

答案：B

24.具有缩小皮脂腺，抑制皮脂腺活性，减少皮脂分泌的药物()

A: 壬二酸

B: 异维A酸

C: 维A酸

D: 阿达帕林

答案：B

25.口服呋喃妥因可用于治疗()

A: 尿路感染

B: 肠道感染

C: 肺感染

D: 呼吸道感染

答案：A

26.主要用于口服给药的广谱青霉素类是

A: 庆大霉素

B: 阿莫西林

C: 头孢噻肟

D: 头孢哌酮

答案：B

27.（2019年真题）患者，女，52岁，因“闭经1年，潮热、情绪波动、严重失眠半年”就诊，临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为：戊酸雌二醇片，每日1次，每次1mg，醋酸甲羟孕酮片，每日1次，每次2mg。

A: 可以降低绝经后妇女心脑血管病发生风险

B: 应在绝经后6年之内开始

C: 激素替代疗法应结合患者情况个体化制定

D: 绝经后使用雌激素可缓解更年期症状，但增加患糖尿病的风险

答案：D

28.（2020年真题）患者，男，60岁。入院诊断为:高胆固醇血症、支原体肺炎。医师拟选用克拉霉素治疗支原体肺炎，同时需进行调血脂治疗，不宜与克拉霉素合用的调血脂药是

A: 辛伐他汀

B: 非诺贝特

C: 依折麦布

D: 氟伐他汀

答案：A

29.属于钙通道阻滞剂的抗心律失常药是()

A: 普鲁卡因胺

B: 胺碘酮

C: 利多卡因

D: 维拉帕米

答案：D

30.属于抗孕激素药，用于终止早孕的是

A: 米非司酮

B: 甲地孕酮

C: 左炔诺孕酮

D: 黄体酮

答案：A

31.无雌激素、雄激素、肾上腺皮质激素样作用代谢物没有雌激素活性,可用于黄体功能不足的先兆流产治疗的药物是

A: 甲羟孕酮

B: 地屈孕酮

C: 屈螺酮

D: 环丙孕酮

答案：B

32.属于芳香化酶抑制剂，用于治疗乳腺癌

A: 喜树碱

B: 甲氨蝶呤

C: 卡莫氟

D: 来曲唑

答案：D

33.哌嗪类驱虫药主要用于治疗

A: 疟疾

B: 绦虫病

C: 蛲虫病

D: 蛔虫病和蛲虫病

答案：D

34.很少单独缺乏，常伴其他维生素缺乏，大量服用可使尿液变黄，该物质是

A: 精氨酸

B: 维生素B2

C: 维生素AD

D: 维生素C

答案：B

35.小剂量碘主要用于

A: 呆小病

B: 抑制甲状腺素的释放

C: 黏液性水肿

D: 单纯性甲状腺肿

答案：D

36.下述关于铋剂的描述，错误的是

A: 牛奶可促进铋剂的吸收，服药期间应同服牛奶

B: 不得同食高蛋白饮食，如牛奶

C: 剂量过大时，可导致铋剂脑病现象

D: 两种铋剂不宜联用

答案：A

37.氨基糖苷类抗菌药无效的是()

A: 厌氧菌和肠球菌

B: 结核杆菌

C: 铜绿假单胞菌

D: 需氧革兰阴性菌

答案：A

38.可使人体对维生素B2的需求增加的是

A: 异烟肼

B: 糖皮质激素

C: 雌激素

D：丙磺舒

答案：D

39.（2017年真题）可用于吗啡中毒解救的药物是（）

A：氟马西尼

B：纳洛酮

C：阿托品

D：苯甲酸钠咖啡因

答案：B

40.患者，女性，63岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸人、氨茶碱静脉滴注治疗。

A：可使用头孢类口服剂型，与氨茶碱无明显药物相互作用

B：可使用大环内酯类药物如红霉素

C：左氧氟沙星与茶碱相互作用较小

D：依诺沙星可抑制茶碱代谢

答案：B

41.鲑降钙素对骨质疏松症进行治疗期间，为防继发性甲状旁腺功能亢进需要补充

A：双膦酸盐类骨吸收抑制剂

B：铁剂

C：维生素D

D：钙剂

答案：D

42.（2016年真题）属于M胆碱受体激动剂的降低眼压药是

A：甘露醇

B：毛果芸香碱

C：乙酰唑胺

D：噻吗洛尔

答案：B

43.口腔黏膜溃疡、牙龈炎及冠周炎可选用

A：9%硼酸冰片滴耳液

B：1%碘甘油

C：曲伏前列素

D：四环素

答案：B

44.变异型心绞痛不宜选用的药物是()

A：硝酸甘油

B：普萘洛尔

C：硝苯地平

D：胍乙啶

答案：B

45.卡马西平适用于

A：原发性失眠

B：急慢性脑功能不全

C：神经源性尿崩症

D：内分泌失调引起的失眠

答案：C

46.对甲硝唑无效或禁忌的肠外阿米巴病患者可选用

A：氯喹

B：喹碘仿

C：依米丁

D：替硝唑

答案：A

47.连续使用应间隔4h以上

A：赛洛唑啉

B：麻黄碱

C：酚甘油滴耳液

D：羟甲唑啉

答案：D

48.奥美拉唑主要用于治疗

A：慢性便秘

B：恶心、呕吐

C：消化不良

D：胃溃疡

答案：D

49.（2017年真题）可导致新生儿药物性黄疸的是（）

A：阿莫西林

B：兴孢他啶

C：林可霉素

D：磺胺嘧啶

答案：D

50.（2021年真题）痰培养结果为铜绿假单胞菌，宜选用的抗菌药物是（）

A: 哌拉西林他唑巴坦

B: 青霉素G

C: 苄星青霉素

D: 苯唑西林

答案：A

51.下列属于长效和强效的特异性胃肠道脂肪酶抑制剂的药物是

A: 奥利司他

B: 黄体酮

C: 米非司酮

D: 环孢素

答案：A

52.主要经胆汁排泄的是

A: 庆大霉素

B: 头孢噻肟

C: 头孢哌酮

D: 阿莫西林

答案：C

53.缺铁性贫血患者最宜选用的治疗药物是

A: 铁剂

B: 维生素B12

C: 叶酸

D: 维生素C

答案：A

54.（2016年真题）2岁以下儿童腹泻，禁用的药品是

A：地衣芽孢杆菌胶囊

B：双八面体蒙脱石散

C：双歧三联活菌胶囊

D：洛哌丁胺片

答案：D

55.可引起肌痛、骨关节病损、跟腱炎症和跟腱断裂

A：环丙沙星

B：克霉唑

C：灰黄霉素

D：咪康唑

答案：A

56.长期使用应定期检查甲状腺功能的药物是

A：胺碘酮

B：索他洛尔

C：利多卡因

D：普罗帕酮

答案：A

57.下列关于奥沙利铂的描述，错误的是

A：应给予预防性或治疗性的止吐用药

B：与氯化钠和碱性溶液（特别是氟尿嘧啶）之间存在配伍禁忌

C：其神经系统毒性与剂量大小无关

D：遇冷可加重奥沙利铂的神经毒性

答案：C

58.（2021年真题）可致超敏反应综合征（AHS），推荐用药前做HLA-B*5801基因筛查的抗痛风药物是（）

A: 苯溴马隆

B: 非布司他

C: 秋水仙碱

D: 别嘌醇

答案：D

59.不可与氟西汀合用的是

A: 肝药酶抑制剂

B: 核酸合成抑制剂

C: 竞争性 β-内酰胺酶抑制剂

D: 单胺氧化酶抑制剂

答案：D

60.以下药物中，不属于抗胆碱能扩瞳药的是

A: 新福林

B: 阿托品

C: 后马托品

D: 东莨菪碱

答案：A

61.下列哪项不属于地西泮的注意事项

A: 静注速度过快可引起高血压

B: 不应连续滴注，癫痫持续状态除外

C: 同类药之间的交叉过敏反应

D: 可使肌无力者病情加重

答案：A

62.单纯饮食控制及体育锻炼无效的2型糖尿病肥胖者首先得降糖药是

A：普萘洛尔

B：瑞格列奈

C：二甲双胍

D：格列美脲

答案：C

63.利奈唑胺的主要抗菌作用机制是

A：抑制细菌蛋白质合成

B：增加细菌胞浆膜的通透性

C：抗叶酸代谢

D：干扰细菌细胞壁的合成

答案：A

64.属于5-HT3受体阻断剂的止吐药物是

A：阿瑞吡坦

B：格雷司琼

C：甲地孕酮

D：甲氧氯普胺

答案：B

65.碳酸氢钠可用于

A：代谢性碱中毒

B：呼吸性碱中毒

C：代谢性酸中毒

D：呼吸性酸中毒

答案：C

66.患者，男性，26岁，因“咳嗽、咳痰伴间断发热1周”入院，查体：T38．9℃，P90次／分，R21次／分，BP110／70mmHg，血常规：白细胞16．9×109／L，中性粒细胞百分比84．6%；胸部CT示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”，入院后使用莫西沙星和氨溴索治疗。

A: 对厌氧菌有效

B: 属于氟喹诺酮类

C: 对链球菌感染疗效较好

D: 对非典型病原体无效

答案：D

67.（2019年真题）β-内酰胺酶抑制剂的抑酶活性由强到弱的顺序是（）

A: 他唑巴坦>克拉维酸>舒巴坦

B: 舒巴坦>他唑巴坦>克拉维酸

C: 舒巴坦>克拉维酸>他唑巴坦

D: 他唑巴坦>舒巴坦>克拉维酸

答案：A

68.肝癌晚期患者疼痛剧烈，可以选用的镇痛药物是

A: 可待因

B: 阿司匹林

C: 哌替啶

D: 布桂嗪

答案：C

69.属于二氢叶酸还原酶抑制剂的抗肿瘤药物是

A: 顺铂

B: 阿糖胞苷

C: 环磷酰胺

D: 甲氨蝶呤

答案：D

70.有关阿莫西林特点的说法正确的是()

A: 口服吸收差，生物利用度小

B: 耐酸、耐酶

C: 对耐药金黄色葡萄球菌有效

D: 广谱青霉素，对革兰阴性菌也有效

答案：D

71.（2018年真题）可用于治疗铜绿假单胞菌感染的药物是（）

A: 头孢呋辛

B: 头孢他啶

C: 头孢米诺

D: 头孢唑林

答案：B

72.阿米卡星与万古霉素合用()

A: 药理作用拮抗

B: 不良反应叠加

C: 后者血药浓度升高，不良反应增加

D: 后者血药浓度下降，药效降低

答案：B

73.高血压合并冠心病不宜选用()

A: 氢氯噻嗪

B: 胍乙啶

C: 肼屈嗪

D: 普萘洛尔

答案：B

74.会加重奥沙利铂所致的严重神经系统毒性(感觉障碍、痉挛)的行为是()。

A: 冷水浴

B: 饮用热饮

C: 日光浴

D: 接触塑料制品

答案：A

75.临床口服最常用的、唯一经过安慰剂对照临床试验评估的强心苷药物是()

A: 去乙酰毛花苷

B: 洋地黄毒苷

C: 毒毛花苷K

D: 地高辛

答案：D

76.患者,女75岁,既往有2型糖尿病史18年,有青霉素过敏史,因车祸导致左下肢开放性骨折,术后发生骨髓炎,给予克林霉素治疗10余天,临床应关注的典型不良反应是

A: 肌肉震颤

B: 急性溶血性贫血

C: 抗生素相关性腹泻

D: 红人综合征

答案：C

77.蒙脱石散是

A：抗动力药

B：抗分泌药

C：微生态制剂

D：吸附剂

答案：D

78.存在低度致吐风险的抗肿瘤药物是

A：卡莫司汀

B：多西他赛

C：泼尼松

D：表柔比星

答案：B

79.（2019年真题）以肝细胞膜损害为主的急慢性肝炎患者，宜使用的药物是（）

A：还原型谷胱甘肽

B：多烯磷脂酸胆碱

C：甘草酸二铵

D：葡醛内酯

答案：B

80.激动岛受体，对慢性心力衰竭疗效较好()

A：氨力农

B：多巴酚丁胺

C：硝普钠

D：地高辛

答案：B

81.儿童使用阿托品最低致死量为

A：50mg

B：10mg

C：5mg

D：80mg～130mg

答案：B

82.（2020年真题）可以碱化尿液，用于代谢性酸中毒的药物是

A：乳酸钠

B：氯化铵

C：氯化钠

D：硫酸镁

答案：A

83.长期大量使用可导致肝功能异常

A：四环素可的松

B：氯霉素

C：更昔洛韦

D：利巴韦林

答案：D

84.不属于浓度依赖性抗菌药物的是

A：氨基糖苷类

B：氟喹诺酮类

C：阿奇霉素

D: 达托霉素

答案：C

85.即可溶解白色黏痰，又可溶解脓性痰的是

A: 乙酰半胱氨酸

B: 右美沙芬

C: 羧甲司坦

D: 氨溴索

答案：A

86.（2015年真题）患者，男，56岁。有高血压病史4年。体检：血压156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。该患者若长期服用依那普利片，除应监测血压、心、肾功能外。还应监测的指标是（）。

A: 血氯

B: 血钠

C: 血钙

D: 血钾

答案：D

87.氨苄西林()

A: 抗菌作用强，对厌氧菌有效

B: 对G

C: 对G

D: 特别对铜绿假单胞菌有效

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/858054067116007022