

人卫一类口腔外科学考试题含答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、婴儿唇裂术后饮食方法为

- A、小汤匙喂饲流汁
- B、普通奶瓶喂流汁
- C、术后 24 小进禁食
- D、半流食
- E、吮吸母乳

正确答案：A

2、局部麻醉术后麻木症状仍未恢复的可能原因是

- A、注射区有血肿
- B、注射针折断
- C、注射区有神经损伤
- D、注射区有感染
- E、注射区有水肿

正确答案：C

3、新生儿上唇裂开求治。检查见：左上唇部分裂开，未裂至鼻底。口内牙槽突及腭部未见异常，诊断

- A、单侧完全性(III°)唇裂
- B、混合型唇裂
- C、单侧不完全性(I°)唇裂
- D、单侧隐性唇裂
- E、单侧不完全性(II°)唇裂

正确答案：E

4、局麻药直接注入血管可引起

- A、药物中毒
- B、血管扩张
- C、晕厥
- D、药物过敏反应
- E、全身神经麻醉

正确答案：A

5、以下最不宜行组织活检术的恶性肿瘤为

- A、唇癌
- B、舌癌

- C、肉瘤
- D、恶性黑色素瘤
- E、恶性淋巴瘤

正确答案：D

6、用 70%酒精浸泡手臂时浸泡范围应在肘部以上

- A、4cm
- B、6cm
- C、3cm
- D、5cm
- E、7cm

正确答案：B

7、头颈部肿瘤放疗前的常规准备工作中不包括

- A、拔除无法治愈的病牙
- B、治疗可以保留的龋齿、牙周炎等病牙
- C、修复口内缺失牙
- D、去除口内金属义齿
- E、牙周洁治

正确答案：C

8、在拔除下颌低位阻生智齿时最常损伤的神经为

- A、颜神经
- B、下颌神经
- C、下牙槽神经
- D、颊神经
- E、舌神经

正确答案：C

9、发生损伤时口腔颌面部特点不利之处包括

- A、血运丰富易形成血肿、水肿，可与口腔异物一起堵住呼吸道上端，引起窒息
- B、牙损伤碎块可造成 二次弹片伤 ，并将细菌带入深部组织引起创口感染，而腔窦多，创口与之相通也易引发感染
- C、上与颅脑相连，常并发颅脑损伤；下与颈部相连，常并发颈椎损伤
- D、常损伤腮腺、面神经及三叉神经，形成面部畸形
- E、A+B+C+D

正确答案：E

10、当出现后牙早接触，前牙开合，侧合运动受限时表示

- A、单侧髁状突骨折
- B、双侧髁状突骨折
- C、颞孔区骨折
- D、颈部骨折
- E、下颌角部骨折

正确答案：B

11、口腔颌面外科手术止血方法中，最基本、最常用的方法是

- A、热凝止血
- B、降压止血
- C、阻断止血
- D、压迫止血
- E、钳夹、结扎止血

正确答案：E

12、一侧舌神经阻滞麻醉的区域是

- A、舌尖
- B、同侧舌前 2 / 3
- C、对侧舌前 2 / 3
- D、整个舌体
- E、舌前 2 / 3

正确答案：B

13、颞下颌关节紊乱病中患病率最高的是

- A、上述各类疾病发生率大致相等
- B、炎性疾病类
- C、咀嚼肌紊乱疾病类
- D、骨关节病类
- E、关节结构紊乱疾病类

正确答案：E

14、锤造冠缩颈的目的

- A、为了就位
- B、使龈缘更为密合
- C、为了固位
- D、为了美观
- E、减少对龈组织的刺激

正确答案：B

15、黏液囊肿好发于

- A、腭部
- B、上唇及舌尖腹侧
- C、下唇及舌根腹侧
- D、下唇及舌尖腹侧
- E、颊部

正确答案：D

16、舌下神经切断后将会

- A、有分泌障碍
- B、使同侧的舌肌麻痹
- C、没有上述结果
- D、使舌同侧半边的感觉丧失
- E、有味觉障碍

正确答案：B

17、局麻时出现暂时性面瘫，一般多见于

- A、眶下神经阻滞麻醉时
- B、口内法下牙槽神经阻滞麻醉时
- C、腭前神经阻滞麻醉时
- D、局麻药中加入肾上腺素后
- E、腭后神经阻滞麻醉时

正确答案：B

18、投照下颌骨侧位片时，下颌体长轴与暗盒成

- A、45°角
- B、60°角
- C、平行
- D、垂直
- E、80°角

正确答案：C

19、口腔颌面外科手术全麻后易造成呼吸困难的原因是

- A、拔管或术中气管内插管的移动造成的喉头损伤
- B、手术留置插管的时间过长
- C、咽后壁、舌根等部位手术造成组织移位
- D、口腔内异物、渗血或分泌物阻塞

E、以上均是原因

正确答案：E

20、临床进行淋巴结触诊检查应注意

A、部位、大小、数目

B、硬度、活动度

C、有无压痛与波动感

D、有无粘连并与健侧比较

E、以上都是

正确答案：E

21、颞孔的位置在

A、下颌第一第二双尖牙下方

B、下颌第一磨牙下方

C、下颌中切牙下方

D、下颌升支内侧乙状切迹下方1~1.5cm

E、下颌尖牙下方

正确答案：A

22、关于脓肿切开引流的描述下列错误的是

A、切口部位应尽可能隐蔽

B、尽可能选择口内切口

C、勿损伤重要解剖结构

D、颜面部应尽量顺皮纹切开

E、切口长度应尽可能小

正确答案：E

23、暂时性牙关紧闭是由于麻药注入

A、翼内肌或咬肌

B、翼内肌或翼外肌

C、翼外肌或咬肌

D、翼外肌或颊肌

E、翼内肌或颞肌

正确答案：A

24、发生双侧颈部淋巴结转移的肿瘤是

A、口底癌

B、牙龈癌

C、腭癌

D、舌背中线处癌

E、上颌窦癌

正确答案：D

25、舌下腺和颌下腺导管位于哪个分区

A、面侧深区

B、颌下区

C、舌下区

D、颏下区

E、腮腺嚼肌区

正确答案：C

26、塑料全冠最突出的特点是

A、颜色谐调，制作简单

B、吸水性小

C、耐磨耗

D、用于严重缺损牙

E、切割牙体组织少

正确答案：A

27、舌癌区域性淋巴结转移早的原因是

A、距区域淋巴结近

B、舌淋巴丰富

C、舌机械活动频繁

D、生长快

E、舌淋巴及血运丰富，舌活动频繁

正确答案：E

28、嵌体箱状洞形的轴壁应

A、相互内聚 $2\sim 5^\circ$

B、相互平行

C、内聚不超过 2°

D、外展不超过 15°

E、以上均不对

正确答案：B

29、颌骨骨折最常见的临床体征是

A、骨摩擦音

B、颌骨整体活动

- C、咬合错乱
- D、局部肿痛
- E、张口受限

正确答案：C

30、关于拔牙器械的描述哪项是正确的

- A、使用牙钳拔牙因力量易控制，故无需进行保护
- B、牙钳由钳喙、钳柄和关节构成
- C、使用牙挺各种工作原理应单独使用，避免综合使用而造成严重损伤
- D、牙挺由挺刃和柄两部分组成
- E、牙挺工作原理包括杠杆原理和轮轴原理两种

正确答案：B

31、阻生齿拔除时的阻力不包括

- A、软组织阻力
- B、冠部骨阻力
- C、根部骨阻力
- D、对合牙阻力
- E、邻牙阻力

正确答案：D

32、女，7岁，需拔除Ⅱ°松动的左下第一乳切牙，临床常用的麻醉方法是

- A、阻滞麻醉
- B、浸润麻醉
- C、冷冻麻醉
- D、表面麻醉
- E、针刺穴位麻醉

正确答案：D

33、下列断根原因中哪项属技术原因

- A、死髓牙
- B、牙钳安放不当
- C、根分叉过大
- D、根尖弯曲
- E、牙冠龋损过大

正确答案：B

34、患者，女性，64岁。发现左上牙龈菜花样溃疡2个月，病检诊为鳞

癌 I 级。查见溃疡 2cm ~2cm 大小，X 线片示溃疡区牙槽突骨质有破坏，颌面颈部未触及明显肿大淋巴结。该患者应选择的最佳治疗方案为

- A、病变区上颌骨区域性扩大切除术加根治性颈清扫术
- B、病变区上颌骨区域性扩大切除术加功能性颈清扫术
- C、病变区上颌骨区域性扩大切除术，定期复查，密切注意颈部淋巴结改变
- D、病变侧上颌骨次全切除术加功能性颈清扫术
- E、病变侧上颌骨全部切除术加功能性颈清扫术

正确答案：C

35、语言检查对下列哪些疾病的诊断具有重要意义

- A、腭裂
- B、舌根部肿块
- C、蔓状血管瘤
- D、颈动脉体瘤
- E、对以上疾病均有意义

正确答案：E

36、关于腐败坏死性蜂窝织炎错误的是

- A、全身高热，局部红肿热痛明显
- B、易造成中毒性休克
- C、以造成组织液化坏死为主要表现
- D、好发于深部组织
- E、局部可触及捻发音

正确答案：A

37、下列间隙感染中可引起骨髓炎的是

- A、颞下间隙感染
- B、眶下间隙感染
- C、颊间隙感染
- D、翼下颌间隙感染
- E、颞间隙感染

正确答案：E

38、唇裂是因为下列哪些面突未能融合所致

- A、上颌突与侧鼻突
- B、球状突与侧鼻突
- C、上颌突与下颌突

D、上颌突与中鼻突

E、上颌突与球状突

正确答案：E

39、患者女性 52 岁，左上 7 残冠，高血压病史 10 余年，服药控制在 20 / 12kPa(150 / 90mmHg) 近半月出现劳累后心前区疼痛症状，下列叙述哪项是错误的

A、拔牙可能诱发心内膜炎

B、拔牙可能诱发心梗

C、拔牙可能诱发心绞痛

D、应内科治疗后再拔牙

E、此患者目前应禁忌拔牙

正确答案：A

40、一患者因右上 6 残根需拔除，应麻醉的神经为右侧的

A、上牙槽中神经+鼻腭神经+腭前神经

B、上牙槽中神经+上牙槽后神经+腭后神经

C、上牙槽中神经+上牙槽后神经+腭前神经

D、上牙槽后神经+腭大神经

E、上牙槽中神经+上牙槽后神经+鼻腭神经

正确答案：C

41、清创术缝合的基本原则是

A、先缝合、关闭与口、鼻腔和上颌窦等腔窦相通的创口

B、对裸露的骨面应争取用软组织覆盖

C、创口较深者要分层缝合，消灭死腔

D、面部创口的缝合要用小针细线，创缘要对位平整

E、以上均是

正确答案：E

42、临床上最常见的脱位是

A、前方脱位

B、上方脱位

C、嵌入性脱位

D、侧方脱位

E、后方脱位

正确答案：A

43、下列哪种情况可引起拔牙术后出血

- 、牙龈撕裂
- B、对颌牙损伤
- C、骨组织损伤
- D、口腔与上颌窦相通
- E、下颌骨骨折

正确答案：A

44、关于神经鞘瘤哪项描述不正确

- A、来源于神经鞘膜
- B、生长缓慢，包膜完整
- C、为常染色体显性遗传
- D、穿刺可抽到不凝血样液
- E、以上都不对

正确答案：C

45、患者男性 21 岁，左上 1 外伤 3 年逐渐松动，检查左上 1 变色Ⅲ度松动，根吸收 1 / 2。此牙缺失后目前最佳修复方法为

- A、牙种植
- B、烤瓷桥修复
- C、异体牙移植
- D、即刻牙再植
- E、延期牙再植

正确答案：A

46、牙齿在萌出过程中，牙冠周围软组织发生的炎症称为

- A、牙周炎
- B、根周炎
- C、冠周炎
- D、牙龈炎
- E、牙髓炎

正确答案：C

47、男性，20 岁。颜下皮肤内无痛性肿块缓慢生长 7 年。检查见肿块呈圆形，表面皮肤光滑。肿块与皮肤及周围组织无粘连，触诊坚韧而有弹性，穿刺抽出乳白色豆腐渣样分泌物。最可能的诊断是

- A、皮脂腺囊肿
- B、表皮样囊肿
- C、鳃裂囊肿

、甲状舌管囊肿

E、皮样囊肿

正确答案：E

48、哪项不是减小桥体挠曲变形的措施

A、合理的桥体结构 形 形

B、延长桥体长度

C、加厚桥体金属层

D、增加桥体材料机械强度

E、减轻桥体所受力

正确答案：B

49、关于深部脓肿下列错误的是

A、局部有明显压痛感

B、超声波检查可确定脓肿部位

C、表面皮肤有凹陷性水肿

D、穿刺法可协助诊断

E、波动感是诊断的主要依据

正确答案：E

50、游离皮片移植，皮片越厚，则

A、收缩越大

B、越能耐受摩擦

C、越容易成活

D、色泽变化越大

E、质地越脆

正确答案：B

51、临床上应用局麻时在麻药中加入肾上腺素的作用如下，其中哪项可以除外

A、降低毒性反应

B、减少术区出血，使术野清晰

C、减少病人心悸、紧张症状

D、镇痛效果加强

E、延缓吸收，延长麻醉时间

正确答案：C

52、腮腺和下颌下腺肯定不能做的辅助检查是

A、影像学检查

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/858102037134007010>