

精神护理考试试题库及答案

1、病人, 男性, 35 岁。半年前无明显诱因出现敏感、多疑, 认为同事在背后说他的坏话, 阻碍其工作, 常出现冲动行为, 诊断为“精神分裂症”入院治疗。对该病人的护理措施中, 应初步考虑该病人为

- A、焦虑症
- B、抑郁症
- C、强迫症
- D、精神分裂症
- E、睡眠障碍

答案: D

2、抑郁发作的核心症状不包括

- A、情绪低落
- B、兴趣缺乏
- C、乐趣丧失
- D、自责自罪
- E、心境低落

答案: D

3、病人, 男性, 60 岁, 对其他事情没有兴趣。常忘记和户约会的时间, 已熟悉的工作流程, 近日也常忘记, 他常自编说法, 以弥补忘记的东西。情绪易怒、易激动与病前判若两人。诊断为阿尔茨海默病, 此病最先出现的症状是

- A、记忆障碍
- B、智力障碍
- C、人格障碍
- D、语言障碍
- E、定向力障碍

答案: A

4、病人, 女性, 18 岁, 诊断为焦虑症。病人整日处于惶恐不安中, 感觉“太难受了”, 有自杀企图, 正服苯二氮草类药物。目前最重要的护理措施是

- A、观察药物不良反应
- B、保护病人安全, 降低焦虑程度
- C、改善睡眠环境
- D、深入了解引发病人焦虑的来源
- E、鼓励病人参加工娱治疗

答案: B

5、阿尔茨海默病关于该病的叙述, 正确的是

- A、病情发展迅速
- B、病情呈进行性加重
- C、好发于青壮年
- D、早期突出症状是近事遗忘
- E、主要针对病因治疗

答案：D

6、病人, 女性, 22 岁。与家人吵架后倒地翻滚, 号啕大哭, 之后肢体抽动。随即四肢瘫痪, 无法站立行走。下列护理评估中关于情感评估内容的是

- A、有无幻听、幻视
- B、有无冲动, 易激惹
- C、有无自知力
- D、婚姻状况
- E、家庭关系

答案：B

7、病人, 女性, 46 岁, 病人因关窗户而扭伤腰部无法下床活动, 每天多数时间卧床, 要求家人带其去检查, 骨科医生认为腰伤不会导致病人不能下床活动, 后其丈夫提出离婚, 病人情绪激动不愿意离婚, 哭泣, 腰部不适加重不能行走, 整日卧床, 生活不能自理。该病人的症状属于

- A、分离性神游症
- B、分离性运动障碍
- C、分离性身份障碍
- D、分离性木僵状态
- E、其他分离障碍

答案：B

8、病人, 女性, 25 岁, 诊断为抑郁症, 药物治疗一周后没有效果。评估该病人时特别要注意

- A、病人的情绪状态
- B、病人的思维过程
- C、病人有无自杀先兆
- D、病人的人际关系
- E、病人的生活自理能

答案：C

9、某患者从高山上跌下 头部受伤 不省人事 醒后不认识已婚一年的爱人

- A、记忆减退

- B、记忆错误
- C、记忆恍惚
- D、遗忘
- E、错构

答案：D

10、关于精神分裂症药物治疗的原则 下列哪项说法不正确

- A、系统而规范
- B、强调早期、足量、足疗程的“全程治疗”
- C、治疗应从低剂量开始 逐渐加量
- D、病情好转后即可停药 不需要维持治疗
- E、原则上单一用药

答案：D

11、病人, 女性, 55 岁。工人, 和老伴一起生活。平时个性争强好胜, 受不了任何委屈。30 分钟前因为家庭琐事与老伴发生争吵, 当即出现表情茫然, 全身僵直, 四肢颤抖, 继而倒地不起, 四肢抽搐, 呼之不应, 家人立即将其送往医院。途中病人症状缓解, 能回忆发病过程入院后各项检查均无异常, 诊断为癔症。对此类病人, 最常用的治疗方法是

- A、家庭治疗
- B、药物治疗
- C、放松治疗
- D、暗示治疗
- E、催眠治疗

答案：D

12、“空气枕头”属于

- A、模仿动作
- B、蜡样屈曲
- C、违拗
- D、作态
- E、意志增强

答案：B

13、关于幻觉的定义为

- A、对客观事物的错误感受
- B、对客观事物的胡思乱想
- C、缺乏相应客观刺激时的知觉体验
- D、客观刺激作用于感觉器官的感知体验

E、是一种病理性的歪曲信念

答案：C

14、自知力的描述下列哪项是错误的

A、.自知力的评定仅限于能够认识自己有精神病

B、不要求患者对病因有认识

C、检查自知力时要打消患者的顾虑

D、要求有符合医师观点的认识

E、多数的精神病中 自知力的恢复是完全的

答案：D

15、精神分裂症患者可出现幻觉其中最常见的是

A、幻味

B、幻听

C、幻触

D、幻视

答案：B

16、易某，女，23岁，医生问她：“你是哪里人？”患者答：“我是中国人，祖国在我心中，我从三中毕业，又到山中去，我们矿务局在山中，我在锡矿山当会计，电子计算机的应用，新的时代，培养了新人，我们都是新一代的接班人…”该症状可能是

A、思维奔逸

B、思维云集

C、思维插入

D、思维中断

答案：A

17、王某，23岁，原先无任何精神异常，某次听广播时，突然坚信播音员在说他，而他的生活经历与当时的广播内容并无明显联系，这病人可能的症状为

A、听幻觉

B、原发性妄想

C、继发性妄想

D、病理性象征性思维

答案：B

18、抑郁症病人的核心表现是

A、情绪低落

B、思维迟缓

- C、情感淡漠
- D、睡眠障碍
- E、自责自杀

答案：A

19、病人, 女性, 29 岁, 强迫清洗, 病人明知不应该又无法控制, 因此产生强烈焦虑情绪。医嘱: 地西洋 5mgp. o. 。护士应注意观察药物的不良反应是

- A、依赖性, 成瘾性
- B、皮疹
- C、共济失调
- D、嗜睡
- E、兴奋、多语幻觉

答案：D

20、关于自知力描述错误的是

- A、是指患者对其本身精神状态的认识能力
- B、是指患者能否察觉或识别自己有病和精神状态是否正常、能否正确分析和判断的能力
- C、是判断疗效和精神疾病严重程度的指标
- D、是判断患者是否存在意识障碍的指标之一
- E、自知力缺乏的患者会拒绝治疗

答案：D

21、常规治疗焦虑症的药物不包括

- A、地西洋
- B、咪达唑仑
- C、阿普唑仑
- D、劳拉西洋
- E、奋乃静

答案：E

22、当病人情绪低落、悲观绝望、自责自罪存在什么样的危险?

- A、自杀
- B、营养失调
- C、睡眠紊乱
- D、焦虑

答案：A

23、遗忘综合征又称?

- A、痴呆综合症

- B、急性脑综合征
- C、科萨科夫综合征
- D、慢性脑综合征

答案：C

24、某病人近 2 年来总感到肚子里有虫爬,很不舒服,但说不出具体的部位。

此症状为

- A、内感性不适
- B、错觉
- C、幻触
- D、感知综合障碍
- E、感觉过敏

答案：A

25、易某,女,23岁,医生问她“你是哪里人”患者答“我是中国人,祖国在我心中,我从三中毕业,又到山中去,我们矿物局在山中 我在锡矿山当会计,电子计算机的应用 新的时代,培养了新人,我们都是新一代的接班人…”该症状可能是

- A、思维云集
- B、思维插入
- C、思维中断
- D、病理性赘述
- E、思维奔逸

答案：E

26、诊断精神分裂症特征性依据是

- A、幻觉突出
- B、无自知力
- C、思维情感不协调
- D、行为异常
- E、妄想

答案：B

27、在护理阿尔茨海默病病人时,错误的做法是

- A、促进病人多料理自己的生活,积极维持自理能力
- B、反复强化训练病人用脑,维持大脑活力
- C、多鼓励病人回忆往事,锻炼记忆力
- D、病人回忆出现错误并坚持己见时,要坚持说服其受正确的观点
- E、保证夜间休息,保证充足的睡眠

答案：D

28、谵妄属于下列哪种障碍

- A、情感障碍
- B、思维障碍
- C、意识障碍
- D、记忆障碍
- E、 认知障碍

答案：C

29、患者，男性，30岁，总是回想刚过去的事，如上街，就一直想：从家里是怎么出门的、出去都干什么，在车站上等车都看到了什么等。如果正在想的时候被打断了，就必须从头再想一遍。该病人的症状是

- A、超价观念
- B、强迫性对立观念
- C、强迫性穷思竭虑
- D、强迫性疑虑
- E、强迫性回忆

答案：E

30、精神分裂症患者的思维内容障碍形式上以哪种妄想最具特征和诊断价值

- A、继发性妄想
- B、原发性妄想
- C、夸大妄想
- D、被害妄想

答案：B

31、狂躁发作典型的临床表现是情感高涨、思维奔逸和____，临床习惯称之为“三高“症状。

- A、活动减少
- B、活动增多
- C、思维迟缓
- D、情感低落

答案：B

32、病人，男性，23岁，性格内向，近两周来表现健谈，说话滔滔不绝，自觉脑子快，好像机器加了“润滑油”，无法安静下来正常学习，由同学和老师送入医院治疗上述症状属于

- A、思维形式障碍

- B、思维逻辑障碍
- C、异己体验
- D、语言障碍
- E、思维内容障碍

答案：A

33、CMD-3 将精神疾病分为

- A、2 类
- B、5 类
- C、9 类
- D、10 类
- E、12 类

答案：D

34、病人不吃饭说饭里有毒)

- A、被害妄想
- B、被洞悉感
- C、关系妄想
- D、夸大妄想
- E、嫉妒妄想

答案：A

35、某患者有被害妄想,认为饭中有毒而拒食,此时护士的正确做法是

- A、避免冲突,不勉强患者进食,让其饥饿再进食
- B、强行喂食
- C、患者约束起来直至同意进食为止
- D、去餐厅与其它病友一起进食
- E、静脉营养以维持生命体征

答案：D

36、在精神分裂症病因学研究中,目前最重要的因素是:

- A、遗传因素
- B、环境因素
- C、精神因素
- D、性格因素
- E、社会因素

答案：A

37、患者走路一定要走左边,声称自己是”左派”的症状是

- A、逻辑倒错

- B、被洞悉感
- C、象征性思维
- D、破裂性思维

答案：C

38、该病人用氯米帕明的整个治疗时间不短于

- A、3个月
- B、4个月
- C、5个月
- D、6个月
- E、8个月

答案：D

39、下列那项不属于思维内容障碍

- A、联想松弛
- B、被害妄想
- C、被洞悉感
- D、夸大妄想
- E、自罪妄想

答案：A

40、阿尔茨海默病的临床表现不包括

- A、以记忆障碍为早期症状
- B、人格改变为典型症状
- C、起病隐渐, 进行性发展
- D、痴呆为部分性的
- E、脑 CT 检查可有弥漫性萎缩

答案：D

41、阿尔茨海默病该病人住院后 3 天无大便, 护士应采取的措施为

- A、病人多食高维生素食物
- B、嘱病人多饮水
- C、给予缓泻药
- D、给病人进行腹部热敷
- E、继续观察

答案：C

42、下列哪项是抑郁症患者的核心症状表现

- A、思维迟缓
- B、情感淡漠

- C、情感低落
- D、意志减退
- E、罪恶妄想

答案：C

43、下列那项不属于意识障碍

- A、意识模糊
- B、昏睡状态
- C、痴呆
- D、梦幻状态
- E、朦胧状态

答案：C

44、抑郁症患者可出现的症状有

- A、思维贫乏
- B、木僵状态
- C、愚蠢行为
- D、情感倒错
- E、意志增强

答案：B

45、卢某，男，28岁，病人自述“脑子里空洞洞的，不想任何问题，也没有什么事情，可想”该症状可能是

- A、思维中断
- B、思维松散
- C、思维不连贯
- D、联想贫乏

答案：D

46、精神分裂症治疗首选

- A、物理治疗
- B、药物治疗
- C、痉挛治疗
- D、手术治疗
- E、行为治疗

答案：B

47、病人躺在床上突然看见一只猛虎扑来

- A、错觉
- B、妄想

- C、朦胧
- D、感知觉综合障碍
- E、幻觉

答案：E

48、精神分裂症各种类型中，治疗效果最差的是

- A、单纯型
- B、青春型
- C、紧张型
- D、偏执型
- E、未分化型

答案：A

49、一组表现为急性广泛性的认知障碍，尤以意识障碍为主要特征，病情发展迅速，故又称为急性脑综合征的是？

- A、嗜睡
- B、谵妄
- C、妄想
- D、昏迷

答案：B

50、病人，女性，45岁。近来总认为自己全身不舒服，患了不治之症，全国四处求医，惶惶不可终日。此病人的症状属于

- A、夸大妄想
- B、疑病妄想
- C、被害妄想
- D、嫉妒妄想
- E、焦虑症

答案：B

51、思维迟缓是

- A、癔症的典型症状
- B、强迫症的典型症状
- C、抑郁症的典型症状
- D、恐怖症的典型症状
- E、精神分裂症的典型症状

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/858106016023006034>