专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024贵州省钟山区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题王牌题库含答案（典型题）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.患儿,女,5岁,误服香豆素灭鼠药,可选用的解救药物是（）

A：亚甲蓝

B：二巯丙醇

C：纳洛酮

D：维生素K

答案：D

2.早期AD患者选用

A：金刚烷胺

B：司来吉兰

C：加兰他敏

D：普拉克索

答案：C

3.解热镇痛药用于退热，两次用药的间隔时间应该是

A：4～6小时

B：2～4小时

C：3～5小时

D：5～7小时

答案：A

4.（2018年真题）患者,男,60岁,因轻度冻疮（无破溃）到药店购药,药师应推荐的药品是（）

A: 特比萘芬乳膏

B: 10%樟脑软膏

C: 氢化可的松软膏

D: 利巴韦林软膏

答案：B

5.以下所列药品中，进餐时服用可减少脂肪吸收的药品是

A: 奥利司他（减肥药）

B: 吉非贝齐

C: 苯扎贝特

D: 阿昔莫司

答案：A

6.以下所列药物中，一般不会导致蛋白尿的是

A: 青霉素

B: 甲氨蝶呤

C: 多黏菌素

D: 庆大霉素

答案：A

7.使用非甾体类抗炎药治疗类风湿关节炎时，为预防其胃肠道副作用常并用

A: H2受体拮抗剂

B: 维生素K

C: 碱性药

D: 钙剂

答案：A

8.关于粪胆原和粪隐血叙述正确的是

A：一般情况下，粪便中可见红细胞，但检测结果通常为阴性

B：只有在消化道出现溃疡的情况下，才会粪隐血呈阳性

C：正常情况下，粪便中的粪胆原检查呈阳性反应

D：粪胆原大部分以原形的形式经直肠被排出体外

答案：C

9.瑞舒伐他汀钙的日剂量范围是()

A：10—20mg

B：5—20mg

C：40—200mg

D：10—80mg

答案：A

10.患者，男，28岁，2天前因淋雨后出现发热，体温最高达39℃，经实验室和胸片检查，临床诊断为社区获得性肺炎，无其他基础疾病，可首选的抗菌药物是：

A：头孢哌酮舒巴坦

B：头孢拉定

C：阿米卡星

D：亚胺培南西司他丁

答案：B

11.除解热镇痛药外，可推荐给长期精神紧张的头痛患者应用的处方药是

A：卡马西平

B: 氟西汀

C: 谷维素

D: 地西泮

答案：D

12.验证药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性是指

A: 临床预试验

B: Ⅲ期临床试验

C: Ⅱ期临床试验

D: Ⅰ期临床试验

答案：B

13.属于A型单胺氧化酶抑制剂的是

A: 氟西汀

B: 阿米替林

C: 吗氯贝胺

D: 文拉法辛

答案：C

14.某男性，27岁，间断上腹痛3年，表现为餐后痛，约1～2h后缓解，以冬春季多发。

A: PPI+西咪替丁+阿莫西林+铋剂

B: 法莫替丁+克拉霉素+阿莫西林+铋剂

C: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铋剂

D: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铝碳酸镁

答案：C

15.属于非麻醉性强效镇咳药，起效迅速，抑制外周传入神经，也可部分抑制咳嗽中枢的药物的是

A: 羧甲司坦

B: 可待因

C: 右美沙芬

D: 苯丙哌林

答案：D

16.当创伤应激严重时，给予肠外营养的热氮比调整为

A: NPC5：5

B: 100kcal:1gN

C: NPC7:3

D: 150kcal:1gN

答案：B

17.易引起冠脉痉挛、心肌缺血的药物

A: 环磷酰胺

B: 氟尿嘧啶

C: 紫杉醇

D: 阿霉素

答案：B

18.后记

A: 临床诊断、费别

B: 药品名称、剂型、规格、数量、用法用量

C: 医师签名、药品金额

D: 主要实验室数据

答案：C

19.合剂的规范书写是

A: Dos

B: Dil

C: Liq

D: Mist

答案：D

20.高TC血症首选

A: 阿昔莫司

B: 依折麦布

C: 非诺贝特

D: 氟伐他汀

答案：D

21.可用于慢性消耗性疾病的蛋白同化激素是

A: 依普黄酮

B: 甲羟孕酮

C: 司坦唑醇

D: 他莫昔芬

答案：C

22.主要用于抗病毒的药物是

A: 氟尿嘧啶

B: 阿糖胞苷

C: 氟胞嘧啶

D: 阿糖腺苷

答案：D

23.（2017年真题）根据《中国成人超重和肥胖预防控制指南》体重指数（BMI）判断为肥胖的标准是（）

A：BMI≤18.5

B：BMI≥24.0

C：BMI<21.5

D：BMI≥28.0

答案：D

24.患者，男，75岁,有高血压，长期服用厄贝沙坦氢氯噻嗪片（150mg/12．5mg）1片qd，血压控制平稳。因排尿困难、尿频和尿不尽感就诊，诊断为良性前列腺增生。给予非那雄胺片5mgqd,特拉唑嗪片5mgqd。患者用药后出现头晕，前来咨询。

A：建议睡前服用特拉唑嗪，有助于缓解头晕症状

B：非那雄胺可增强降压药的降压效果，建议更换降压药

C：头晕可能与患者焦虑有关，继续用药会逐渐缓解

D：非那雄胺可引|起直立性低血压，头晕可能与此相关

答案：A

25.无治疗指征补钙

A：过度治疗用药

B：非适应证用药

C：超适应证用药

D：盲目联合用药

答案：A

26.用量化的方法表达治疗目的，不以货币为单位。该药物经济学评价方法是

A: 最小成本分析

B: 成本-效益分析

C: 成本-效果分析

D: 成本-效用分析

答案：C

27.关于他汀类和贝特类的联合使用，下列说法正确的是

A: 早晨服用

B: 早晚分别服用

C: 早晨服用贝特类、而晚上服用他汀类

D: 晚间服用

答案：C

28.下列临床试验分期中，属于上市后药品临床再评价阶段的是

A: Ⅳ期临床试验

B: Ⅱa期临床试验

C: Ⅰ期临床试验

D: Ⅲ期临床试验

答案：A

29.患者，女，50岁，体重60kg，因咳嗽、咳痰伴发热就诊，查体：体温38.5℃、双肺可闻及湿性啰音，查血常规提示：WBC12.4×10

A: 1.5片qd

B: 1/2片qd

C: 1片bid

D: 1片qd

答案：D

30.服药饮酒可增加发生胃溃疡出血危险的是

A：甲氨蝶呤

B：普萘洛尔

C：吲哚美辛

D：格列本脲

答案：C

31.提示"药物都应保存在原始包装中，并不要将瓶外的标签撕掉"，是针对

A：药品贮存

B：药品有效期

C：特殊剂型用法

D：特殊装置药品

答案：A

32.下列中药、化学药联合应用，不存在重复用药的是

A：消渴丸联用格列本脲片

B：曲克芦丁片联用维生素C片

C：新癀片联用吲哚美辛胶囊

D：鼻炎康片联用马来酸氯苯那敏片

答案：B

33.治疗痔疮的常用内服药是

A：地奥司明

B：联苯苄唑乳膏

C：聚甲酚磺醛栓

D：九华膏

答案：A

34.能提示患者大量或长期应用广谱抗生素的粪便细胞显微镜检出物是

A: 真菌

B: 上皮细胞

C: 吞噬细胞增多

D: 红细胞

答案：A

35.不良反应的评价结果分为6级,ADR与用药时间相关性不密切，反应表现与已知该药ADR不相吻合，原患疾病发展同样可能有类似的临床表现，药品不良反应因果关系评价结果为

A: 肯定

B: 待评价

C: 可能无关

D: 很可能

答案：C

36.下列药品中，应该贮存在棕色玻璃瓶内的是

A: 硫酸镁

B: 硫糖铝片

C: 狂犬疫苗

D: 硝酸甘油片

答案：D

37.用于治疗角化皲裂型足癣的是口服

A: 伊曲康唑

B: 抗真菌药

C: 抗生素

D: 特比萘芬

答案：B

38.下列情况的首选药物是高TG血症

A: 他汀类

B: 弹性酶

C: 贝特类

D: 胆酸螯合剂+贝特类

答案：C

39.长期大量用药时，可出现流感样症状的抗结核药是

A: 乙胺丁醇

B: 利福平

C: 链霉素

D: 异烟肼

答案：B

40.某女性，19岁，2年前因上呼吸道感染后逐渐出现甲状腺肿大，伴多汗、多食、消瘦、心悸、烦躁，根据血T

A: 丙硫氧嘧啶

B: 放射性

C: 碘化钾

D: 碳酸锂

答案：A

41.嗜酸性粒细胞正常参考区间是

A: 0.20～0.40

B: 0～0.01

C：0.03～0.08

D：0.01～0.05

答案：D

42.促进铁剂吸收的

A：胰酶

B：牛奶、蛋类

C：维生素C

D：碳酸氢钠

答案：C

43.静脉给药用于重度及危重度哮喘治疗的药品是

A：孟鲁司特

B：噻托溴铵

C：异丙托溴铵

D：氨茶碱

答案：D

44.老年人服用可能出现认知功能受损、谵妄、跌倒的药物是

A：苯二氮䓬类药

B：哌替啶

C：双嘧达莫

D：甲氧氯普胺

答案：A

45.患者，男，32岁，因细菌性扁桃体炎口服阿莫西林胶囊，出现全身瘙痒。立即停药，无特殊治疗，患者症状逐渐好转，未再给阿莫西林胶囊治疗，该ADR的因果关系评价结果是（）。

A：很可能

B：肯定

C：可能

D：可能无关

答案：A

46.采用华法林进行抗凝治疗时，国际标准化比值（INR）的有效安全范围是

A：1.5～2.0

B：0.8～1.5

C：3.0～4.0

D：2.0～3.0

答案：D

47.为下列各类慢性阻塞性肺病治疗药物选择合适的代表药,白三烯受体阻断剂

A：异丙托溴铵

B：茶碱

C：沙丁胺醇

D：扎鲁司特

答案：D

48.某男性，53岁，参加婚礼后5小时突发左脚第一跖趾关节剧痛．3小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为500μmol／L；足部X线示非特征性软组织肿胀。

A：别嘌醇

B：苯溴马隆

C：丙磺舒

D：秋水仙碱

答案：D

49.患者，男，62岁，患带状疱疹，治疗期间出现轻至中度疼痛，可给予的止痛药物是

A：布洛芬

B：加巴喷丁

C：山莨菪碱

D：吗啡

答案：A

50.消化不良性腹泻宜选用的药物是

A：双歧三联活菌制剂

B：双八面体蒙脱石散

C：山莨菪碱

D：胰酶

答案：D

51.与地西泮合用会影响其代谢导致镇静催眠作用增强的药物是()

A：阿司匹林

B：铝碳酸镁

C：维生素B

D：伏立康唑

答案：D

52.适宜餐前给药的药物是

A：复方铝酸铋

B：二甲双胍

C：缬沙坦

D：法莫替丁

答案：A

53.MAO-B抑制剂

A：恩托卡朋

B：司来吉兰

C：苯海索

D：左旋多巴

答案：B

54.流行性结膜炎者宜选用的滴眼液是

A：磺胺醋酰钠

B：色甘酸钠

C：碘苷

D：维生素B2

答案：C

55.设有对照组但未用随机方法分组的研究属于

A：二级证据

B：一级证据

C：四级证据

D：三级证据

答案：D

56.退热或缓解疼痛都“不宜同时应用两种以上解热镇痛药”的主要依据是

A：可能导致酸中毒

B: 可能引起哮喘发作

C: 可能导致血管性水肿

D: 可能引起肝、肾、胃肠道的损伤

答案：D

57.患者，女，51岁，近期出现失眠、潮热、出汗、烦躁等不适症状，临床诊断为围绝经期综合征，在使用激素替代治疗之前应先排除禁忌证。下列情况属于禁忌证的是

A: 胆囊疾病

B: 癫痫

C: 子宫内膜增生

D: 严重肝功能障碍

答案：D

58.视疲劳所呈现的显著临床特征是

A: 视物时症状加重

B: 复视

C: 眼睑沉重、痉挛

D: 泪液减少

答案：A

59.患者女,56岁,既往有高血压、高脂血症病史,长期服用依那普利片、阿托伐他汀钙片。现因上腹痛2周,伴黑便数日就诊。患者自诉3周前因膝关节痛,服用布洛芬,疼痛未缓解,自行加用萘普生。胃镜检查显示：胃窦小弯侧有一约7mm溃疡,幽门螺杆菌（Hp）阳性。肾功能未见异常

A: 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）枸橼酸铋钾+克拉霉素+左氧氟沙星A

B: 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）+枸橼酸铋钾+阿莫西林+克拉霉素

C: 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）十阿莫西林+克拉霉素

D: 埃索美拉唑（艾司奥美拉唑）十枸橼酸铋钾+阿莫西林十甲硝唑

答案：D

60.可造成儿童呼吸抑制，故5岁以下儿童不宜应用的是

A: 可待因

B: 右美沙芬

C: 喷托维林

D: 苯丙哌林

答案：C

61.连续规律用药2日以上方能充分发挥作用的药品是

A: 非甾体抗炎药

B: 短效 β

C: 吸入型糖皮质激素

D: β 受体拮抗剂

答案：C

62.（2018年真题）患者,女,68岁,体重45kg,因发热、咳嗽咳痰入院治疗,临床诊断为社区获得性肺炎。化验结果:白细胞计数11.76×109/L,肌酐清除率18ml/min。该患者使用下列抗菌药物治疗时不需要减量的是（）

A: 阿莫西林

B: 左氧氟沙星

C: 头孢噻肟钠

D: 莫西沙星

答案：D

63.用于用药错误分级的是（）

A：CoCkroft-GAut公式

B：NCEMERP标准

C：CLHD公式

D：CoChrAnE分级

答案：B

64.下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法，错误的是

A：剂量逐步递增，尽可能采用最小有效剂量，使不良反应减至最小

B：当单药治疗无效时，可考虑联合使用两种作用机制不同的抗抑郁药

C：抗抑郁药起效较快，使用1周后可判定疗效

D：应尽可能单一用药，足量、足疗程治疗

答案：C

65.（2019年真题）患者，男，68岁，既往体健，因受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热2天入院。查体:体温39.1℃，血压138/80mmHg，心率102次/分，呼吸32次/分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果:白细胞计数11.2×109/L，中性粒细胞百分比85%。胸部X线左肺下叶浸润性阴影。痰培养结果待归。入院诊断:社区获得性肺炎。

A：当体温正常48～72h，且达到肺炎临床稳定标准后，可停用抗菌药物

B：病情稳定后可从静脉给药转为口服序贯治疗

C：在病原学送检后，可立即实施经验性抗菌治疗

D：抗菌药物应持续用至胸片X线病灶完全吸收

答案：D

66.老年（≥65岁）帕金森患者，或伴认知障碍，首选

A：金刚烷胺?

B: 普拉克索?

C: 苯海索?

D: 复方左旋多巴?

答案：D

67.患者，男，60岁，呈典型的“面具脸”、“慌张步态”及“小字征”表现，确诊为帕金森病，患者同时患有闭角型青光眼，不宜选用的治疗帕金森病药物是（）

A: 司来吉兰

B: 多奈哌齐

C: 普拉克索

D: 左旋多巴

答案：D

68.能早期发现患者用药伤害、尽快地采取干预措施的方法是

A: 计算机检测方法

B: 病历审查

C: 直接观察

D: 岗位工作问责

答案：A

69.已知"1%(g/ml)盐酸麻黄碱溶液的冰点降低值为0.16"，1g盐酸麻黄碱氯化钠的等渗当量为0.28，欲配制2%(g/ml)盐酸麻黄碱滴鼻剂500ml，需要氯化钠的量是

A: 1.7g

B: 1.78g

C: 1.88g

D: 1.83g

答案：A

70.能够影响叶酸利用障碍的药物有

A：秋水仙碱

B：苯乙双胍

C：甲氨蝶呤

D：二甲双胍

答案：C

71.（2017年真题）下列关于巨幼细胞性贫血的说法错误的是（）

A：恶性贫血者需要终生维持治疗

B：老年人和酗酒者为高危人群

C：可静脉滴注维素B12100~500μg

D：全胃切除的巨幼细胞性贫血患者需要终生维持治疗

答案：C

72.患者，男，72岁，患有阿尔茨海默病，给予卡巴拉汀每日3mg治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是（）

A：每日清晨空腹口服

B：每日早晚与食物同服

C：每晚睡前口服

D：每日早晚空腹口服

答案：B

73.肾素抑制剂

A：阿米洛利

B：依普利酮

C：雷米普利

D: 阿利吉仑

答案：D

74.异环磷酰胺的主要毒副作用是（）

A: 出血性膀胱炎

B: 心脏毒性

C: 溶血性尿毒症

D: 肺纤维化

答案：A

75.使患者可清晰看到咨询药师的是

A: 位置标志明确

B: 配备必备设备

C: 环境舒适

D: 适当隐秘

答案：A

76.减少不良反应的配伍用药是

A: 应用地高辛与氢氯噻嗪

B: 纳洛酮用于解救吗啡中毒

C: 阿托品联用吗啡镇痛

D: 青蒿素与乙胺嘧啶或磺胺多辛联用延缓抗药性

答案：C

77.（2017年真题）半衰期大于24h的药物通常选择（）

A: 静脉滴注给药

B: 2～3个半衰期给药1次

C: 每个半衰期给药1次

D: 每日给药1次

答案：D

78.艾滋病的传播途径不包括

A: 性途径传播

B: 消化道传播

C: 经血制品传播

D: 经血传播

答案：B

79.（2018年真题）患者,女,30岁,既往体健,无癫痫病史怀孕8个月,突然出现抽搐,从小腹开始,发展至全身,口唇发绀,意识丧失,诊断为子痫,应选用的治疗方法是（）

A: 5%氯化钙注射液静脉滴注

B: 25%硫酸镁注射液稀释后静脉注射

C: 50%硫酸镁溶液口服

D: 50%葡萄糖注射液湿敷

答案：B

80.90g/L≤Hb量＜正常参考范围下限可诊断为

A: 中度贫血

B: 重度贫血

C: 基本正常

D: 轻度贫血

答案：D

81.药物不良反应多潘立酮（）

A: 睡眠障碍

B：溢乳现象

C：性功能障碍

D：黑便

答案：B

82.能显示药师的文献评价能力和技巧的咨询服务方法步骤是

A：对查阅的资料进行评价、分析和整理

B：对问题进行确定并归类

C：形成答案并以口头形式提供给询问者

D：随访工作效果，并建立档案

答案：A

83.（2016年真题）患者，男，60岁，呈典型的“面具脸”，“慌张步态”及“小字症”表现，确诊为帕金森病，患者同时患有闭角型青光眼，不宜选用的治疗帕金森病的药物是（）。

A：司来吉兰

B：多奈哌齐

C：左旋多巴

D：普拉克索

答案：C

84.宜于清晨服用的药品是

A：甲氧氯普胺

B：阿卡波糖

C：洛伐他汀

D：糖皮质激素

答案：D

85.药师在指导患者合理用药时应同时关注药物、食物和膳食补充剂的相互影响。下列合用方式合理的是()

A：异烟肼与牛奶同服

B：华法林与人参同服

C：左甲状腺素与钙剂同服

D：硫酸亚铁与维生素C同服

答案：D

86.治疗艾滋病的非核苷类逆转录酶抑制剂是（）

A：阿昔洛韦

B：拉米夫定

C：依非韦伦

D：利巴韦林

答案：C

87.粪外观所对应的疾病,上消化道出血(>50ml)

A：暗红果酱色

B：柏油便，黑色有光泽

C：白陶土便

D：米泔水样

答案：B

88.（2018年真题）某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮3mg和炔雌醇0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

A：在取出最后一个周期包中的透皮贴剂的当天开始服用本品

B：在服用以前所用的另种复方激素避孕药的停药期未开始服用本品

C：在服用前一种复方激素避孕药最后一片的当天开始服用本品

D: 在取出最后一个阴道环的当天开始服用本品

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/865041303114012033