

2024 年四川省松潘县《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题完整题库【完整版】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 呋塞米的适应证不包括

- A: 高钠血症
- B: 充血性心力衰竭
- C: 高钾血症
- D: 高血压危象

答案：A

2. 哌拉西林

- A: 肾毒性较大
- B: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- C: 口服，肌肉注射或静脉注射均可用于全身感染
- D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染

答案：D

3. 唑来膦酸静脉给药输注的时间应在

- A: 5 分钟以上
- B: 30 分钟以上
- C: 60 分钟以上
- D: 15 分钟以上

答案：D

4. 患者，女 52 岁，因“闭经 1 年，潮热、情绪波动严重失眠半年”就诊，临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为：戊酸雌二醇片，每日 1 次，每次 1mg，醋酸甲羟孕酮片每日 1 次，每次 2mg。

- A: 泌尿系统感染
- B: 骨质疏松症
- C: 血脂异常
- D: 血栓性静脉炎

答案：D

5. 单独应用时止吐作用相对较弱，主要作为辅助药物，用于减轻地塞米松所致焦虑和甲氧氯普胺所致静坐不能，也可用于减少预期性的化疗所致恶心呕吐的是

- A: 氯丙嗪
- B: 甲氧氯普胺
- C: 帕洛诺司琼
- D: 劳拉西泮

答案：D

6. （2020 年真题）主要用于治疗皮肤真菌感染，可抑制角鲨烯环氧酶活性，属于丙烯胺类的抗真菌药物是

- A: 特比萘芬
- B: 阿莫罗芬
- C: 制霉菌素
- D: 联苯苄唑

答案：A

7. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌Ⅱ级，同侧腋下淋巴结 1/18，免疫组化：ER（-），PR（-），Her（+）。肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列关于多柔比星的说法中错误的是

- A: 曾用过表柔比星的患者可更换多柔比星
- B: 对增殖和非增殖细胞均有杀伤作用
- C: 典型不良反应是骨髓抑制和心脏毒性
- D: 属于蒽环类抗肿瘤药物

答案：A

8. 铁剂用药期间需定期做下列检查，以观察治疗效果，不包括

- A: 血清铁蛋白
- B: 血红蛋白
- C: 网织红细胞计数
- D: 巨核细胞计数

答案：D

9. （2018 年真题）用于治疗疥疮的药物有（）

- A: 克霉唑乳膏、克罗米通乳膏、维 A 酸软膏
- B: 林旦乳膏、硫黄乳膏、克罗米通乳膏
- C: 克罗米通乳膏、过氧苯甲酰凝胶、咪康唑软膏
- D: 硼酸软膏、咪康唑乳膏、特比萘芬软膏

答案：B

10. 可用于治疗非何杰金(非霍奇金)淋巴瘤的单克隆抗体是()

- A: 西妥昔单抗
- B: 利妥昔单抗
- C: 贝伐单抗

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 曲妥珠单抗

答案：B

11. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊，塞来昔布胶囊，碳酸氢钠治疗。

- A: 选择短期口服给药
- B: 选择注射与口服并用
- C: 选择注射给药
- D: 选择长期口服给药

答案：A

12. 为了防止动脉硬化，经药物治疗后，适当增加浓度对人体有益成分的是

- A: IDL
- B: HDL
- C: VLDL
- D: LDL

答案：B

13. 伊曲康唑属于

- A: 吗啉类
- B: 丙烯胺类
- C: 抗生素类
- D: 唑类

答案：D

14. 可引起肌痛、骨关节病损、跟腱炎症和跟腱断裂

- A: 环丙沙星
- B: 灰黄霉素

C: 咪康唑

D: 克霉唑

答案: A

15. 下列关于直接凝血酶抑制剂的优势描述，错误的是

A: 治疗剂量下不会引起血小板减少

B: 可预测抗凝效果，无需监测 INR

C: 选择性高

D: 不能灭活纤维蛋白结合的凝血酶

答案: D

16. 催眠药应()

A: 睡前内服

B: 空腹内服

C: 定时内服

D: 饭前内服

答案: A

17. 属于神经激肽-1 受体阻断剂的止吐药是()。

A: 托烷司琼

B: 甲氧氯普胺

C: 维生素 B

D: 阿瑞吡坦

答案: D

18. 可发生双硫仑样反应的是

A: 甲硝唑+乙醇

B: 替硝唑+苯巴比妥

C: 替硝唑+华法林

D: 奥硝唑+乙醇

答案：A

19. 铂类化合物治疗期间，需要每周检查的项目是

A: 肝功能

B: 肾功能

C: 全血计数

D: 血钙

答案：C

20. 可用于防治泌尿系统结石的是

A: 氯化钙

B: 氯化钾

C: 枸橼酸钾

D: 氯化钠

答案：C

21. 关于胺碘酮的描述，正确的是()

A: 对室上性和室性心动过速都有效

B: 特异性针对房颤有效

C: 只对室上性心动过速有效

D: 只对室性心动过速有效

答案：A

22. (2019 年真题) 患者，男，34 岁，晨起出现上腹部剧烈疼痛，考虑为胃肠道平滑肌痉挛，适宜该患者使用的治疗药物是 ()

A: 酚妥拉明

B: 溴吡斯的明

C: 山莨菪碱

D: 多潘立酮

答案: C

23. 可用于配合防治肝性脑病的泻药为

A: 酚酞

B: 硫酸镁

C: 甘油

D: 乳果糖

答案: D

24. 抑制胃酸分泌作用最强的药物是

A: 雷尼替丁

B: 奥美拉唑

C: 西咪替丁

D: 尼扎替丁

答案: B

25. 右旋体是产生神经毒性的主要根源，故开发其左旋体，用于治疗敏感厌氧菌引起的多种感染性疾病的药物是

A: 替硝唑

B: 甲硝唑

C: 奥硝唑

D: 多黏菌素

答案: C

26. (2017 年真题) 患者，男，62 岁。高血压病史 10 年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压 162mmHg，心率 72 次/分。该患者目前服用药物除抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

- A: 氨氯地平+氢氯噻嗪
- B: 利血平+氨苯蝶啶
- C: 硝酸甘油+美托洛尔
- D: 特拉唑嗪+氢氯噻嗪

答案：A

27. 与甘露醇相比，甘油果糖具有的特点不包括

- A: 起效更快，维持作用时间较长
- B: 对患者电解质的平衡无明显影响
- C: 可为患者提供一定的能量
- D: 利尿作用小

答案：A

28. 可用于恶性淋巴瘤的药物是

- A: 利妥昔单抗
- B: 氟尿嘧啶
- C: 甲氨蝶呤
- D: 阿糖胞苷

答案：D

29. 皮肤寄生虫感染治疗药的禁忌证，叙述错误的是()

- A: 妊娠及哺乳期妇女禁用林旦
- B: 18 岁以下儿童禁用林旦
- C: 有癫痫病史患者禁用苯甲酸苄酯

D: 中枢神经系统器质性病变者禁用苯甲酸苄酯

答案：B

30. 氟他胺适用于治疗()。

A: 绒毛膜上皮癌

B: 晚期前列腺癌

C: 晚期睾丸肿瘤

D: 急性淋巴细胞白血病

答案：B

31. 金刚烷胺与阿托品合用

A: 增加锥体外系不良反应的风险

B: 增加肾毒性

C: 增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)

D: 可增加抗胆碱不良反应的危险

答案：D

32. 用药过程中需要监护甲状腺功能的是()

A: 硝普钠

B: 胺碘酮

C: 哌唑嗪

D: 氯沙坦

答案：B

33. 钩端螺旋体病、梅毒、回归热的首选药的是()

A: 克林霉素

B: 青霉素

C: 氯霉素

D: 两性霉素 B

答案: B

34. (2019 年真题) 患者，男，52 岁，BMI28kg/m²，既往有动脉粥样硬化性心血管病、高尿酸血症、痛风病，患者诉昨晚 8 点起右大脚趾关节处疼痛难忍，宜使用的药物是 ()

A: 非布司他

B: 碳酸氢钠

C: 秋水仙碱

D: 别嘌醇

答案: C

35. 对血吸虫具有杀灭活性的药物是 ()。

A: 噻嘧啶

B: 甲硝唑

C: 阿苯达唑

D: 吡喹酮

答案: D

36. 患者男性，29 岁，阴茎头部出现下疳两个月就诊。有不洁性接触史。临床诊断为梅毒。立即给予青霉素注射治疗，十分钟后患者出现胸闷，全身瘙痒、面部发麻，查体：血压 85/60mmHg，脉率 110 次/分。

A: 给药方式错误

B: 药物剂量过大

C: 使用药物缺乏针对性

D: 未做皮肤过敏试验

答案: D

37. 可抑制细菌 β -内酰胺酶的是 ()。

- A: 替考拉宁
- B: 磷霉素
- C: 舒巴坦
- D: 利福平

答案：C

38. 糖皮质激素和抗生素合用治疗严重感染的目的是

- A: 增强机体的应激性
- B: 增强抗菌药物的抗菌活性
- C: 抗毒素、抗休克、缓解毒血症状
- D: 增强机体对疾病的防御能力

答案：C

39. 下列药物中属于缩瞳药的是

- A: 氢溴酸后马托品
- B: 硫酸阿托品
- C: 毛果芸香碱
- D: 托吡卡胺

答案：C

40. (2020 年真题) 主要用于治疗呼吸道合胞病毒感染的药物是

- A: 更昔洛韦
- B: 阿德福韦酯
- C: 利巴韦林
- D: 拉米夫定

答案：C

41. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗。

。

- A: 肾结石
- B: 胃肠道反应
- C: 促进血栓形成
- D: 尿道刺激

答案：D

42. 属于 α_1 受体阻断药，用于治疗良性前列腺增生症的是()

- A: 度他雄胺
- B: 西地那非
- C: 他达拉非
- D: 坦洛新

答案：D

43. 化学结构与醛固酮相似

- A: 氢氯噻嗪
- B: 螺内酯
- C: 乙酰唑胺
- D: 呋塞米

答案：B

44. 用于抢救肝素所致严重出血的药物是

- A: 硫酸鱼精蛋白
- B: 亚叶酸钙
- C: 对羧基苄胺
- D: 维生素 K

答案：A

45. 既能增加糖分解和减少糖生成，又能改善对胰岛素的敏感性的药物是

- A: 胰岛素
- B: 罗格列酮
- C: 氢氧化镁
- D: 二甲双胍

答案：D

46. 重组人促红素的最佳适应证是

- A: 严重再生障碍性贫血
- B: 严重缺铁性贫血
- C: 化疗药物所致贫血
- D: 慢性肾衰竭所致贫血

答案：D

47. 治疗各种人类血吸虫病的首选药物是

- A: 左旋咪唑
- B: 乙胺嗪
- C: 酒石酸锑钾
- D: 吡喹酮

答案：D

48. 使用螺内酯的心力衰竭患者，不宜选用的药品是

- A: 氯化钾
- B: 氯化钙
- C: 硫酸镁

D: 果糖

答案：A

49. 过量会引起严重心脏毒性的药物是()

A: 氨氯地平

B: 卡托普利

C: 地高辛

D: 哌唑嗪

答案：C

50. 可使前者作用加强或延长的是

A: 维生素 C

B: 氯丙嗪

C: 红霉素

D: 他莫昔芬

答案：B

51. (2020 年真题) 患者，女，26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺素(FT3、FT4)增高、促甲状腺素(TSH)降低，诊断为甲状腺功能亢进症。医师处方给予抗甲状腺药治疗。

A: 利多卡因

B: 碘化钾

C: 特布他林

D: 普萘洛尔

答案：D

52. 应用雌激素时需要停药的指征是

- A: 肝功异常
- B: 乳房胀痛
- C: 突破性出血
- D: 性欲改变

答案：C

53. 青霉素的抗菌谱不包括

- A: 肺炎球菌
- B: 脑膜炎双球菌
- C: 破伤风杆菌
- D: 伤寒杆菌

答案：D

54. 林旦不应与碱性物质或铁器接触。口诀：“碱淡淡铁旦旦”。

- A: 莫匹罗星
- B: 阿达帕林
- C: 克罗米通
- D: 林旦

答案：D

55. 毛果芸香碱的作用特点不包括

- A: 缩小瞳孔，拉紧虹膜
- B: 减少房水生成
- C: 开放前房角降低眼压
- D: 收缩睫状肌，使小梁网眼张开

答案：B

56. 作用机制是竞争雌激素受体的是

- A: 紫杉醇
- B: 枸橼酸他莫昔芬
- C: 巯嘌呤
- D: 吉非替尼

答案：B

57.（2016 年真题）患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

- A: 餐前半小时
- B: 餐后 1 小时
- C: 餐时
- D: 餐后半小时

答案：C

58. 有减轻体重作用的口服降糖药是

- A: 格列苯脲
- B: 那格列奈
- C: 吡格列酮
- D: 达格列净

答案：D

59.（2015 年真题）可引起胰岛素自身免疫综合征的抗甲状腺药是（）。

- A: 卡比马唑片
- B: 甲状腺片
- C: 复方碘口服液
- D: 甲巯咪唑片

答案：D

60. 以脉冲方式从垂体中释放出来，在血液循环中的半衰期只有 7～12min 的药物是

- A: 催乳素
- B: 促性腺激素
- C: 促肾上腺皮质激素
- D: 醋酸去氨加压素

答案：C

61. 在体外无抗凝作用，在体内有抗凝作用的是

- A: 肝素
- B: 尿激酶
- C: 华法林
- D: 噻氯匹定

答案：C

62. 下列药物中属于抗纤维蛋白溶解药的是

- A: 酚磺乙胺
- B: 氨甲环酸
- C: 维生素 K
- D: 卡巴克络

答案：B

63. 适用于肥胖及单用饮食控制无效的糖尿病患者的是

- A: 胰岛素
- B: 西格列汀
- C: 格列本脲
- D: 二甲双胍

答案：D

64. 下列选项中，主要用于控制疟疾复发和传播的药物是()。

- A: 奎宁
- B: 青蒿素
- C: 氯喹
- D: 伯氨喹

答案：D

65. 按作用时间分类，属于速效的胰岛素的是()

- A: 谷赖胰岛素
- B: 短效胰岛素
- C: 甘精胰岛素
- D: 地特胰岛素

答案：A

66. 患者，女，41岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日6~8次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞8~10/HP，红细胞3~5/HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2片，口服，3次/日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2次/日。

- A: 肾功能
- B: 尿量
- C: 电解质
- D: 肝功能

答案：C

67. 癫痫大发作合并小发作选用

- A: 苯巴比妥
- B: 丙戊酸钠
- C: 乙琥胺
- D: 苯妥英钠

答案：B

68. 属于芳香化酶抑制剂，用于治疗乳腺癌

- A: 羟喜树碱
- B: 甲氨蝶呤
- C: 来曲唑
- D: 卡莫氟

答案：C

69. 属于 I c 类抗心律失常药的是

- A: 胺碘酮
- B: 普罗帕酮
- C: 奎尼丁
- D: 利多卡因

答案：B

70. 患者，男，60 岁，诊断为冠心病，经皮冠状动脉介入术置入支架。医生给予氯吡格雷、阿司匹林抗血小板治疗。

- A: 兰索拉唑
- B: 艾司奥美拉唑
- C: 右兰索拉唑
- D: 奥美拉唑

答案：C

71. 在胃黏膜表面形成屏障的药物是

- A: 法莫替丁
- B: 枸橼酸铋钾
- C: 谷丙胺
- D: 奥美拉唑

答案：B

72. 属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的首选药品是()。

- A: 氟他胺
- B: 他莫昔芬
- C: 乙烯雌酚
- D: 托瑞米芬

答案：A

73. 用于治疗低磷血症的药物是()

- A: 葡萄糖
- B: 碳酸钙
- C: 三磷酸腺苷
- D: 二磷酸果糖

答案：D

74. 头孢曲松()

- A: 肾毒性较大
- B: 用于非典型致病原感染
- C: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于脑膜炎
- D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

答案：C

75. 属于促凝血因子合成药的是

- A: 氨甲环酸
- B: 鱼精蛋白
- C: 甲苯氢醌
- D: 酚磺乙胺

答案：C

76. 餐后 1~2 小时、睡前或胃部不适时服用的抗酸剂是

- A: 米索前列醇
- B: 铝碳酸镁
- C: 兰索拉唑
- D: 枸橼酸铋钾

答案：B

77. (2017 年真题) 可抑制维生素 K 环氧化酶活性的抗凝血药是 ()

- A: 依诺肝素
- B: 氨甲环酸
- C: 华法林
- D: 达比加群酯

答案：C

78. 主要作用于聚合态的微管，抑制微管解聚

- A: 顺铂
- B: 高三尖杉酯碱
- C: 紫杉醇
- D: 氟尿嘧啶

答案：C

79. 青霉素类用药后发生过敏性休克，属于

- A: I 型变态反应
- B: IV 型变态反应
- C: III 型变态反应
- D: II 型变态反应

答案：A

80. (2016 年真题) 可导致神经毒性（四肢麻木、腱反射消失）的抗肿瘤药是

- A: 紫杉醇
- B: 博来霉素
- C: 柔红霉素
- D: 长春新碱

答案：D

81. 广泛用于各种吸虫药的治疗，还能用于绦虫病的药物是

- A: 乙胺嘧啶
- B: 三苯双脒
- C: 吡喹酮
- D: 甲硝唑

答案：C

82. 甲状腺素

- A: 可导致甲状腺功能低下
- B: 可诱发心绞痛和心肌梗死
- C: 可导致粒细胞缺乏症
- D: 可导致血管神经性水肿、上呼吸道水肿及喉头水肿

答案：B

83. 代谢产物为选择性的甲型和乙型流感病毒神经氨酸酶抑制剂的药物是

- A: 奥司他韦
- B: 干扰素
- C: 阿糖腺苷
- D: 阿昔洛韦

答案：A

84. 糖皮质激素的抗中毒性休克作用是

- A: 抑制巨噬细胞中一氧化氮合成酶
- B: 提高机体对细菌内毒素的耐受力
- C: 抑制巨噬细胞对抗原的吞噬处理
- D: 提高中枢神经系统的兴奋性

答案：B

85. 抑制碳酸酐酶的药物是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 乙酰唑胺
- C: 氨苯蝶啶
- D: 呋塞米

答案：B

86. 属于 I c 类抗心律失常药的是()

- A: 奎尼丁
- B: 普罗帕酮
- C: 胺碘酮

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 普鲁卡因胺

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/866102005220011030>