2024年广西壮族自治区鱼峰区《执业药师之西药学专业二》考试必背200题通关秘籍题库及参考答案（达标题）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.以下药物中，不属于眼用局麻药的是()

A：丁卡因

B：利多卡因

C：阿托品

D：奥布卡因

答案：C

2.下列抗心律失常药中，属于β受体阻断剂的代表药是()。

A：胺碘酮

B：索他洛尔

C：溴苄胺

D：普萘洛尔

答案：D

3.（2015年真题）哮喘急性发作应用平喘药，最适宜的给药途径是（）。

A：吸入给药

B：口服给药

C：肌肉注射

D：静脉滴注

答案：A

4.（2016年真题）属于5α受体还原酶抑制剂的抗良性前列腺增生症的药品是

A：普适秦

B：度他雄胺

C：特拉唑嗪

D：酚妥拉明

答案：B

5.常在用药1周后出现刺激性干咳的是

A：卡托普利

B：氨氯地平

C：哌唑嗪

D：地高辛

答案：A

6.李女士来到药房咨询，主诉最近服用下列药品后体重有所增加，请药师确认可能增加体重的药品是

A：二甲双胍

B：阿司匹林

C：米氮平

D：辛伐他汀

答案：C

7.大剂量碘剂

A：对甲状腺激素代谢无作用，仅能改善甲状腺功能亢进症的症状

B：抑制甲状腺过氧化物酶，从而抑制甲状腺激素的生物合成

C：使甲状腺腺泡上皮萎缩、减少分泌

D: 使甲状腺组织退化、血管减少、腺体缩小变韧

答案：D

8.下列药物中不用于抗心律失常的是

A: 胺碘酮

B: 美西律

C: 比索洛尔

D: 单硝酸异山梨酯

答案：D

9.眼科术后引起的眼内炎应向眼内注射

A: 头孢他啶

B: 阿昔洛韦

C: 利福平

D: 夫西地酸

答案：A

10.茶碱浓度20μg/ml时会出现

A: 呼吸、心跳停止

B: 为有效的治疗浓度

C: 心动过速、心律失常

D: 恶心、呕吐、失眠

答案：C

11.（2021年真题）属于维生素K拮抗剂的抗凝血药物是（）

A: 华法林

B: 氯吡格雷

C: 利伐沙班

D: 依诺肝素

答案：A

12.下列哪个药物没有散瞳作用

A: 托吡卡胺

B: 硫酸阿托品

C: 去氧肾上腺素

D: 毛果芸香碱

答案：D

13.利巴韦林最主要的不良反应是

A: 味觉异常

B: 听力异常

C: 头痛

D: 溶血性贫血

答案：D

14.在体内不易蓄积,适用于老年和肾功能不全患者的胰岛素促泌剂类降糖药是（）

A: 艾塞那肽

B: 罗格列酮

C: 瑞格列奈

D: 利拉鲁肽

答案：C

15.下述不属于抗血小板类药物的是

A: 血栓素A2（TXA2）抑制剂

B: 二磷酸腺苷P2Y12受体激动剂

C：非特异性纤溶酶原激活剂

D：磷酸二酯酶抑制剂

答案：C

16.分泌氮皮质激素的是

A：束状带

B：网状带

C：球状带

D：束状带和网装带

答案：B

17.治疗银屑病药主要作用不包括

A：改善表皮细胞增殖速率

B：促进细胞有丝分裂

C：恢复其正常分化状态

D：作用于皮肤表皮细胞

答案：B

18.为了防止动脉硬化，经药物治疗后，适当增加浓度对人体有益成分的是

A：IDL

B：HDL

C：LDL

D：VLDL

答案：B

19.患者，女，54岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌Ⅱ级，同侧腋下淋巴结1／18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+)。肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

A: 干扰微管蛋白功能，使细胞生长停滞于分裂中期

B: 用于局部晚期或转移性乳腺癌

C: 属于半合成紫杉烷类抗肿瘤药物

D: 基本结构与紫杉醇不相似

答案：D

20.大量用药可致球后视神经炎的药物是

A: 乙胺丁醇

B: 吡嗪酰胺

C: 红霉素

D: 异烟肼

答案：A

21.下列硝酸酯类药物起效最快的是

A: 单硝酸异山梨酯

B: 戊四醇酯

C: 硝酸异山梨酯

D: 硝酸甘油

答案：D

22.滴鼻剂的正确使用方法不包括()

A: 如果正在服用其他药品，需要遵医嘱使用滴鼻剂

B: 如滴鼻液过多流入口腔，可将其吐出

C: 儿童必须在成人监护下使用

D: 使用滴鼻剂时，可以同时使用同类的滴鼻剂加强疗效

答案：D

23.痛风缓解期，抑制内源性尿酸生成的药物是

A：苯溴马隆

B：非布司他

C：碳酸氢钠

D：秋水仙碱

答案：B

24.（2018年真题）可用于治疗铜绿假单胞菌感染的药物是（）

A：头孢唑林

B：头孢呋辛

C：头孢米诺

D：头孢他啶

答案：D

25.属于促凝血因子合成的药物是()

A：鱼精蛋白

B：蛇毒血凝酶

C：卡巴克络

D：甲萘氢醌

答案：D

26.治疗地高辛中毒引起窦性心动过缓的药物是

A：阿托品

B：沙库巴曲缬沙坦

C：胺碘酮

D：阿利吉仑

答案：A

27.壬二酸的抗菌活性和吸收依赖于

A：剂型

B：浓度

C：作用面积

D：pH

答案：D

28.快速静脉滴注可出现低血压、心律失常的是

A：甲萘氢醌

B：蛇毒血凝酶

C：氨基己酸

D：卡巴克络

答案：C

29.常用于引产或催产，亦用于产后出血和子宫复原不全

A：地诺前列酮

B：麦角新碱

C：缩宫素

D：普拉睾酮

答案：C

30.用于治疗焦虑、镇静、催眠、惊厥症、肌紧张性头痛的药物是

A：苯巴比妥

B：地西泮

C：唑吡坦

D：卡马西平

答案：B

31.（2019年真题）同时抑制5-HT及去甲肾上腺素（NE）再摄取而起到抗抑郁作用的药物是（）

A: 帕罗西汀

B: 吗氯贝胺

C: 度洛西汀

D: 马普替林

答案：C

32.患儿，5岁。有咽痛、肌肉酸痛、咳嗽，实验室检查为支原体感染；医师处方红霉素治疗。

A: 与核蛋白70S亚基结合，抑制细菌蛋白质合成

B: 与核蛋白30S亚基结合，抑制细菌蛋白质合成

C: 抑制细菌蛋白质合成全过程

D: 与核蛋白50S亚基结合，抑制细菌蛋白质合成

答案：D

33.促进尿酸排泄的抗痛风代表药物是

A: 扑热息痛

B: 塞来昔布

C: 丙磺舒

D: 别嘌醇

答案：C

34.可诱发或加重支气管哮喘急性发作的药物是()

A: 苯妥英钠

B: 奎尼丁

C: 利多卡因

D: 普萘洛尔

答案：D

35.通过激动胰高血糖素样肽-1 受体降低血糖的药物

A: 二甲双胍

B: 胰岛素皮下注射

C: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

D: 艾塞那肽

答案：D

36.属于III类抗心律失常药的是

A: 奎尼丁

B: 胺碘酮

C: 普罗帕酮

D: 利多卡因

答案：B

37.（2020 年真题）抗血小板药西洛他唑属于

A: 磷酸二酯酶抑制剂

B: 整合素受体阻断剂

C: 二磷酸腺苷 P2Y12 受体阻断剂

D: 维生素 K 拮抗剂

答案：A

38.甲状腺功能亢进的内科治疗宜选用

A: 小剂量碘

B: 甲状腺素

C: 大剂量碘

D: 甲巯咪唑

答案：D

39.属于噻唑烷二酮类胰岛素增敏剂的是

A: 瑞格列奈

B: 沙格列汀

C: 罗格列酮

D: 格列美脲

答案：C

40.（2018年真题）用于治疗疥疮的药物有（）

A: 克霉唑乳膏、克罗米通乳膏、维A酸软膏

B: 林旦乳膏、硫黄乳膏、克罗米通乳膏

C: 硼酸软膏、咪康唑乳膏、特比萘芬软膏

D: 克罗米通乳膏、过氧苯甲酰凝胶、咪康唑软膏

答案：B

41.对女性能促进和维持黄体功能使黄体合成孕激素，对男性能使垂体功能不足者的睾丸产生雄激素，促使睾丸下降和男性第二性征的发育，从妊娠期妇女尿中提取的促性腺激素类药物是

A: 戈那瑞林

B: 绒促性素

C: 溴隐亭

D: 双炔失碳酯

答案：B

42.可用于治疗绦虫感染的药物是

A: 氯硝柳胺

B：联嗪

C：甲硝唑

D：林旦

答案：A

43.抑制真菌中由细胞色素P450介导的14a一甾醇去甲基化，从而抑制真菌细胞膜主要固醇类——麦角固醇的生物合成，损伤真菌细胞膜并改变其通透性，以致细胞内重要物质摄取受影响或流失而使真菌死亡的是

A：伊曲康唑

B：氟胞嘧啶

C：万古霉素

D：两性霉素

答案：A

44.治疗急慢性肾衰竭的首选药物是

A：氨苯蝶啶

B：氢氯噻嗪

C：氯噻酮类

D：呋塞米

答案：D

45.可能引起高铁血红蛋白血症的抗高血压药是

A：阿托普利

B：氨氯地平

C：阿利克仑（阿利吉仑）

D：硝普钠

答案：D

46.属于芳基乙酸类的是

A：吲哚美辛

B：阿司匹林

C：塞来昔布

D：对乙酰氨基酚

答案：A

47.下列钙通道阻滞剂中可用于治疗心律失常的是

A：硝苯地平

B：拉西地平

C：维拉帕米

D：左旋氨氯地平

答案：C

48.（2018年真题）具有长效、平稳、血药浓度无峰值特点的胰岛素/胰岛素类似物是（）

A：精蛋白锌胰岛素注射液

B：预混胰岛素注射液

C：普通胰岛素注射液

D：甘精胰岛素注射液

答案：D

49.抑制DNA回旋酶和拓扑异构酶Ⅳ的抗菌药是()

A：甲硝唑

B：苯唑西林

C：四环素

D：喹诺酮类

答案：D

50.伴有糖尿病肾病的高血压患者应首选的降压药是

A：氨氯地平

B：氯沙坦

C：氢氯噻嗪

D：吲达帕胺

答案：B

51.糖尿病选用

A：丙硫氧嘧啶

B：放射性碘

C：大剂量碘剂

D：格列齐特

答案：D

52.属于抗孕激素药，用于终止早孕的是

A：左炔诺孕酮

B：甲地孕酮

C：米非司酮

D：黄体酮

答案：C

53.可用于治疗肝性脑病的药物是

A：欧车前

B：多库酯钠

C：番泻叶

D：利那洛肽

答案：D

54.可影响胞浆膜通透性，引起细胞内重要物质外漏的药物是

A：环丙沙星

B：多黏菌素

C：庆大霉素

D：特比萘芬

答案：B

55.短效糖皮质激素是

A：氢化可的松

B：甲泼尼龙

C：地塞米松

D：氟氢可的松

答案：A

56.血钾升高至

A：大于6mmol/L

B：大于172μmol/L

C：大于7μmol/L

D：大于265μmol/L

答案：A

57.血浆半衰期较短的治疗阴茎勃起功能障碍的5型磷酸二酯酶抑制剂的是

A：甲睾酮

B：他达拉非

C：西地那非

D: 丙酸睾酮

答案：C

58.异烟肼的作用特点是

A: 结核杆菌不易产生耐药性

B: 对大多数革兰阴性菌有效

C: 只对细胞外的结核杆菌有效

D: 对细胞内外的结核杆菌均有效

答案：D

59.可干扰细菌DNA回旋酶或拓扑异构酶Ⅳ，影响细菌DNA合成的药物是

A: 环丙沙星

B: 替加环素

C: 庆大霉素

D: 多黏菌素

答案：A

60.关于双嘧达莫的描述，不正确的是

A: 抑制血小板、上皮细胞和红细胞摄取周围腺苷

B: 使血小板内环磷酸腺苷（cAMP）减少

C: 常用于肾病综合征的抗凝治疗

D: 使血小板内环磷酸腺苷（cAMP）增多

答案：B

61.患者，女，60岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗。

A：短期口服给药

B：长期口服给药

C：注射与口服并用

D：注射给药

答案：A

62.非麻醉性镇痛药中属于中枢性镇痛药的是

A：吗啡

B：秋水仙碱

C：曲马多

D：布洛芬

答案：C

63.（2016年真题）华法林起效缓慢，深静脉栓塞治疗的初期，需同时联合使用的是

A：依诺肝素

B：维生素B2

C：维生素B1

D：维生素B12

答案：A

64.血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)应避免与()联合应用。

A：噻嗪类利尿剂

B：留钾利尿剂

C：β 受体阻断剂

D：人促红素

答案：B

65.长期服用呋塞米易发生的不良反应是（）

A：低尿酸血症

B：低钾血症

C：高氯血症

D：高钠血症

答案：B

66.心律失常者慎用的治疗浅表真菌感染的药物是

A：制霉菌素

B：咪康唑

C：益康唑

D：两性霉素B

答案：B

67.通过保护胃黏膜起到到抗消化性溃疡目的的药物是

A：硫糖铝

B：西咪替丁

C：碳酸钙

D：奥美拉唑

答案：A

68.长期大量服用维生素E会出现

A：视物模糊、乳腺肿大、类流感样综合征、胃痉挛

B：低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重下降、肝脏肿大、肾脏损害、骨硬化

C：颅内压增高、夜尿增多、毛发干枯或脱落、皮肤干燥或瘙痒、体重减轻

D：头痛、眼花、烦躁、心律失常、妇女经血不止

答案：A

69.由于分子结构上的差异，导致铂类化合物的各自毒性亦有所区别神经毒性较严重的是

A：亚叶酸钙

B：卡铂

C：奥沙利铂

D：顺铂

答案：C

70.目前首选的口服减肥药是

A：奥利司他

B：鲑降钙素

C：阿仑膦酸钠

D：阿法骨化醇

答案：A

71.（2018年真题）可用于降低眼压的药物是（）

A：卡替洛尔

B：利福平

C：阿托品

D：左氧氟沙星

答案：A

72.糖皮质激素对血液系统的影响不包括

A：提高纤维蛋白原浓度

B：使红细胞含量增加

C：减少淋巴细胞

D: 使血小板数量下降

答案：D

73.用于治疗鼓膜未穿孔的急性中耳炎、外耳道炎的药品是()。

A: 高锰酸钾溶液

B: 苯酚溶液

C: 过氧乙酸溶液

D: 酚甘油滴耳液

答案：D

74.属于 β 受体阻断剂的降低眼压药是()。

A: 毛果芸香碱

B: 乙酰唑胺

C: 噻吗洛尔

D: 甘露醇

答案：C

75.下列哪种药物与碳酸钙合用时，易发生高钙血症

A: 噻嗪类利尿剂

B: 阿莫西林

C: 四环素类

D: 氧化镁

答案：A

76.可用于治疗非霍奇金淋巴瘤的单克隆抗体是

A: 英夫利昔单抗

B: 利妥昔单抗

C: 西妥昔单抗

D: 贝伐单抗

答案：B

77.噻嗪类利尿药略增加HCO3-的排泄，是因为其可以抑制

A: 碳酸酐酶

B: 磷酸二酯酶

C: Na+-Cl⁻共转运子

D: Na+-K+-2Cl⁻同向转运子

答案：A

78.四环素联用抗凝药需要

A: 调整抗凝血药的剂量

B: 肝毒性增加

C: 口服吸收减少

D: 增加麦角中毒的风险

答案：A

79.甲状腺素的合成需要()

A: 过氧化物酶

B: 蛋白水解酶

C: 环氧化酶

D: 碳酸酐酶

答案：A

80.阻断脑内多巴胺受体，小剂量抑制延脑催吐化学感受区的多巴胺受体，大剂量时直接抑制呕吐中枢，兼有镇静作用的是

A: 劳拉西泮

B: 氯丙嗪

C: 甲氧氯普胺

D: 帕洛诺司琼

答案：B

81.茶碱浓度42μg/ml时会出现

A: 恶心、呕吐、失眠

B: 为有效的治疗浓度

C: 呼吸、心跳停止

D: 心动过速、心律失常

答案：C

82.糖皮质激素隔日疗法用于()

A: 肾病综合征

B: 湿疹

C: 抑制器官移植急性排斥危象

D: 变态反应性疾病

答案：A

83.属于β受体阻断剂的降低眼压药是()

A: 曲伏前列素

B: 噻吗洛尔

C: 甘露醇

D: 毛果芸香碱

答案：B

84.属于前药，在肝脏水解为阿昔洛韦，生物利用度比阿昔洛韦高3～4.5倍的抗病毒药物是

A: 干扰素

B: 阿糖腺苷

C: 伐昔洛韦

D: 奥司他韦

答案：C

85.作用于前列腺平滑肌，减轻膀胱出口梗阻的是()

A: 坦洛新

B: 吲达帕胺

C: 普适泰

D: 西地那非

答案：A

86.乳果糖禁用于

A: 肝性脑病

B: 妊娠期

C: 急腹症

D: 哺乳期

答案：C

87.头孢拉定

A: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染

B: 口服，肌内注射或静脉注射均可用于全身感染

C: 肾毒性较大

D: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

答案：C

88.（2021年真题）属于阳离子型表面活性剂，可用于治疗咽喉炎的药物是（）e

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/866133110101011030