

四川省巴中市《卫生公共基础知识》医学

（说明：本题库收集历年及近期考试真题，全方面的整理归纳备考公考之用。）

一、单选题

1. 大面积烧伤，渗出的血浆回收易引起（ ）。

- A、休克
- B、感染
- C、肾衰竭
- D、心功能衰竭
- E、呼吸功能衰竭

【参考答案】B

2. 判定肺结核临床类型的主要依据是（ ）。

- A、结核菌素试验
- B、全身中毒症状
- C、肺部体征
- D、胸部 X 线征象

【参考答案】D

3. 女性，47 岁，发现右侧乳房内无痛性肿块 2 个月。体检：右侧乳房外上象限可扪呈径约为 4cm 的肿块，表面不甚光滑，边界不清，质地硬；局部乳房皮肤凹陷呈征”；同侧腋窝可扪及 2 个肿大的淋巴结，可被推动。经活组织病理学检查证实为拟行乳癌改良根治术。乳癌根治术后内分泌治疗的常用药物是（ ）。

- A、促肾上腺皮质激素
- B、绒毛膜促性腺激
- C、己烯雌酚
- D、三苯氧胺
- E、黄体酮

【参考答案】D

4. 地榆善治（ ）。

- A、水火烫伤
- B、胎热不安
- C、手足皲裂
- D、须发早白

【参考答案】A

5. 男，35岁，在全麻下行胆总管切开取石、T管引流术，腹腔放置引流管。术毕返回病房，神志清醒。体检示：脉搏 95 次 / 分钟，血压 125 / 70mmHg 腹腔引流液 100ml。回病房 1 小时后腹腔引流液为 210ml，呈血性；脉搏 110 次 / 分钟，血压 105 / 65mmHg 唇稍干燥。根据该病人的病情，应疑为（ ）。

- A、胆道出血
- B、腹腔内出血
- C、胆瘘
- D、呼吸困难
- E、消化道出血

【参考答案】B

6. 内皮细胞的特性结构是（ ）。

- A、W-P 小体
- B、丰富的紧密连接
- C、丰富的溶酶体
- D、细胞间有 10—20nm 的间隙

【参考答案】A

8. 既可燥湿健脾，又能祛风散寒的的药物是（ ）。

- A、藿香
- B、佩兰
- C、苍术
- D、厚朴

【参考答案】C

9. 该患者最可能的诊断为（ ）。

- A、有排卵性功血
- B、无排卵性功血
- C、黄体功能不足
- D、血液系统疾病
- E、以上均不是

【参考答案】B

10. 芦根具有的功效是（ ）。

- A、除烦、止呕、利尿

- B、除烦、止泻、利尿
- C、泻火、止泻、利尿
- D、泻火、止汗、生津

【参考答案】A

11. 女性，55 岁，发现血压升高 7 年，间断发作心前区疼痛半年。诊断为高血压病、冠心病。一直服用 β_1 受体阻滞剂治疗。今晨购物时，突感胸闷、气急，咳泡沫痰。急诊入院查体：端坐体位，心率 42 次 / 分，双肺满布湿啰音，双下肢无水肿。该病人目前可能的诊断为（ ）。

- A、急性心肌梗死
- B、全心衰竭
- C、急性左心衰
- D、急性支气管炎
- E、心绞痛

【参考答案】C

12. 心肌梗死最常见的部位是（ ）。

- A、左心室侧壁
- B、室间隔后 1/3
- C、右心室前壁
- D、左心室前壁、心尖区和室间隔前 2/3

【参考答案】D

13. 心源性呼吸困难最先出现的是（ ）。

- A、急性肺水肿
- B、夜间阵发性呼吸困难
- C、劳力性呼吸困难
- D、心源性哮喘
- E、端坐呼吸

【参考答案】C

14. 纯母乳喂养应该坚持到生后的（ ）。
15. 胃癌根治术后顽固性呃逆的护理，下列不正确的是（ ）。
16. 国家要求老年人健康管理率要达到（ ）以上。
- A、65%
 - B、75%
 - C、85%
 - D、95%

【参考答案】A

17. 预防肾和输尿管结石形成和增大的最有效的方法是（ ）。
- A、大量饮水
 - B、应用抗生素
 - C、口服维生素 C
 - D、碱化尿液
 - E、以上全是

【参考答案】A

18. 金黄色葡萄球菌感染常引起（ ）。

- A、脓性卡他性炎
- B、出血性炎
- C、脓肿
- D、蜂窝织炎

【参考答案】C

19. 女性，70 岁，因“颌下急性蜂窝织炎”入院。病人颈部明显红肿、疼痛，伴严重全身感染症状，自感心慌、气紧、胸闷，口唇发绀。既往有冠心病及慢性支气管炎历史。入院后予以补液、抗感染治疗。对该并发症首要的处理措施是（ ）。

- A、气管插管
- B、气管切开
- C、大剂量应用皮质激素
- D、舌下含化硝酸甘油
- E、应用支气管解痉剂

【参考答案】A

20. O_2 的弥散系数与 CO_2 的弥散系数相比较（ ）。

- A、基本相同
- B、前者大，因为 O_2 可与血红蛋白结合
- C、前者小，因为 O_2 分子量小
- D、前者小，因为 O_2 的溶解度低

【参考答案】D

21. 腹部损伤的护理，下列哪项不正确（ ）。

- A、严密观察病情变化，至少每半小时测血压、脉搏、呼吸、体温 1 次
- B、给予抗生素，开放性损伤应给破伤风抗毒血清
- C、观察期腹痛严重者，可给予吗啡止痛
- D、非手术治疗期间要求绝对卧床休息
- E、无内脏损伤者可给予流质或半流汁饮食

【参考答案】C

22. 心输出量是指（ ）。

- A、每分钟一侧心室射出的血量
- B、每次心脏搏动一侧心室射出的血量
- C、每分钟左右两侧心室射出的血量
- D、每分钟一侧心房射出的血量

【参考答案】A

23. 颅内压增高使颅内压的调节主要通过（ ）。

- A、脑组织从高压区向低压区部分移位
- B、脑静脉血被排挤到颅腔外
- C、颅腔内脑脊液量的减少
- D、脑血管的自动调节
- E、脑组织被压缩

【参考答案】C

24. 足三里穴位胫在（ ）。

- A、在小腿前外侧，外膝眼下 1 寸

- B、在腘窝正中
- C、在髌骨两侧
- D、在小腿前外侧，犊鼻下 3 寸，距胫骨前缘一横指处

【参考答案】D

25. 佝偻病骨样组织堆积的表现是（ ）。

- A、方颅
- B、乒乓颅
- C、前囟宽大
- D、出牙延迟
- E、睡眠不安

【参考答案】A

26. 参与速发型支气管哮喘的主要免疫炎症细胞为（ ）。

- A、T 淋巴细胞
- B、肥大细胞
- C、中性粒细胞
- D、血小板

【参考答案】B

27. 患者女性，37 岁，已产，医生诊断为宫颈重度糜烂；宫颈 TCT 检查正常，需局部物理治疗。患者询问物理治疗的时间，护士告知最佳时间是（ ）。

- A、月经来潮前 3~7 天
- B、排卵期

- C、无时间限制
- D、确诊后
- E、月经干净后 3~7 天

【参考答案】

28. 脊髓第 10 胸节约平对第几胸椎（ ）。

- A、第 8
- B、第 9
- C、第 6
- D、第 7

【参考答案】D

29. 子宫脱垂是指子宫颈外口达（ ）。

- A、坐骨结节水平以下
- B、坐骨结节水平以上
- C、坐骨棘水平以上
- D、坐骨棘水平以下
- E、骶尾骨以下

【参考答案】D

30. 阈上刺激可引起（ ）。

- A、锋电位
- B、阈电位
- C、负后电位
- D、局部电位

A

31. 婴幼儿腹泻时发生酸碱平衡紊乱的类型是（ ）。

- A、呼吸性酸中毒
- B、代谢性酸中毒
- C、呼吸性碱中毒
- D、代谢性碱中毒
- E、混合性酸中毒

【参考答案】B

32. 受下丘脑 GHRH与 GHRIH的双重调控的是（ ）。

- A、甲状旁腺激素
- B、甲状腺激素
- C、生长激素
- D、糖皮质激素

【参考答案】C

33. 食管癌发病情况是（ ）。

34. 终板电位是（ ）。

- A、动作电位
- B、局部电位
- C、阈电位
- D、静息电位

【参考答案】B

35. 新生儿，女，日龄 1 周。母亲在换尿布时，发现其尿布上有

()。

- A、血尿
- B、下消化道出血
- C、假月经
- D、肛裂
- E、痔疮

【参考答案】C

36. 食积气滞应首选的药物是 ()。

37. 休克病人出现酸中毒，按病理变化规律出现在 ()。

- A、微循环收缩期
- B、微循环扩张期
- C、休克抑制期
- D、微循环衰竭期
- E、DIC 期

【参考答案】D

38. 重症肌无力患者体内有 ()。

- A、抗核抗体
- B、抗 TSH 受体的抗体
- C、RF
- D、抗乙酰胆碱受体的自身抗体

【参考答案】D

女性，47 岁，发现右侧乳房内无痛性肿块 2 个月。体检：右侧乳房外上象限可扪呈径约为 4cm 的肿块，表面不甚光滑，边界不清，质地硬；局部乳房皮肤凹陷呈征”；同侧腋窝可扪及 2 个肿大的淋巴结，可被推动。经活组织病理学检查证实为拟行乳癌改良根治术。乳癌根治术后，预防皮下积液的主要措施是（ ）。

A 半卧位 B、高蛋白饮食 C、患肢制动 D、切口用沙袋压迫 E、皮办下置管引流

【参考答案】

40. 国家要求 2 型糖尿病患者血糖控制率要达到（ ）以上。

- A、 30%
- B、 35%
- C、 40%
- D、 45%

【参考答案】C

41. 某女，28 岁，孕 36 周，产前检查，宫底为宽软不规则的胎臀，胎背在腹壁左侧偏前，头已入盆。该孕妇胎方位可能是（ ）。

42. 心指数是指在空腹、安静条件下的（ ）。

- A、 心排量/体表面积
- B、 心排量/体重
- C、 每搏心输出量/心排量
- D、 心排量/心室充盈血量

A

43. 闭合性胸外伤后出现严重皮下气肿和极度呼吸困难首先考虑为（ ）。

- A、肋骨骨折
- B、肺挫伤
- C、创伤性窒息
- D、张力性气胸
- E、血胸

【参考答案】D

44. 正常人氧的运送形式下列哪项是正确的（ ）。

- A、血浆中物理溶解的氧、氧与血红蛋白结合的运送形式
- B、高压状态下吸入氧、氧与血红蛋白结合的运送形式
- C、以上都是
- D、以上都不是

【参考答案】A

45. 肘关节脱位的标志性体征是（ ）。

- A、活动受限
- B、反常活动
- C、关节肿胀
- D、肘后关节失常
- E、鹰嘴固定压痛

【参考答案】D

下列哪一项关于弥散性血管内凝血（DIC）的说法是正确的（ ）。

- A、以凝血和纤溶功能异常为特征
- B、以上都是
- C、依据临床表现和实验室检查综合确定诊断
- D、出血和微血栓形成同时存在

【参考答案】B

47. 最常见的良性骨肿瘤为（ ）。

- A、骨软骨瘤
- B、骨巨细胞瘤
- C、软骨瘤
- D、骨瘤
- E、骨化性纤维瘤

【参考答案】A

48. 既能凉血止血，又能收敛止血的药物是（ ）。

- A、大蓟
- B、白及
- C、侧柏叶
- D、仙鹤草

【参考答案】C

49. 患者，男性，45岁，在参观朋友新居时出现流鼻涕、打喷嚏，继而出现明显喘憋。查呼气音延长，满肺广泛哮鸣音，最可能的原

)。

- A、喉头水肿
- B、急性支气管炎
- C、慢性阻塞性肺气肿
- D、支气管哮喘
- E、急性肺水肿

【参考答案】D

50. 慢性肺源性心脏病发病的主要因素，下列哪项不正确（ ）。

- A、气道梗阻
- B、血黏度增加
- C、肺动脉高压
- D、低氧血症及高碳酸血症

【参考答案】A

二、多选题

51. 宜冲服的药物是（ ）。

- A、矿物药
- B、胶类药
- C、汁液性药
- D、贵重药

【参考答案】CD

52. 下列有关胰腺炎的治疗要点，正确的是（ ）。

- A、有肠麻痹、严重腹胀的患者不宜给阿托品

- B、有呕吐者可适当进食以补充营养
- C、为预防感染可酌情使用抗生素
- D、西咪替丁能减少胃酸分泌从而减少，胰腺分泌的刺激
- E、疼痛剧烈者可用吗啡止痛

【参考答案】ACD

53. 既能平肝潜阳，又能息风止痉的药物是（ ）。

- A、羚羊角
- B、石决明
- C、天麻
- D、钩藤

【参考答案】ACD

54. 急性腹膜炎护理诊断是（ ）。

- A、体液不足
- B、疼痛
- C、体温升高
- D、焦虑
- E、缺乏保健知识

【参考答案】ABCD

55. 煎药器具最宜选用（ ）。

56. 恶性骨肿瘤的 X 线表现特点是（ ）。

- A、病灶不规则
- B、密度均匀

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/867045040001006161>