

2024 河北省古冶区《执业药师之西药学专业二》资格考试题库大全带答案（培优 A 卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 对耐氯喹的恶性疟虫株，首选

- A: 静脉滴注奎宁
- B: 氯喹+伯氨喹
- C: 乙胺嘧啶+磺胺药
- D: 咯萘啶或甲氟喹

答案：D

2. 属于促血小板生成药的是

- A: 艾曲泊帕乙醇胺
- B: 甲萘氢醌
- C: 氨甲环酸
- D: 酚磺乙胺

答案：A

3. 属于还原酶抑制剂的是()

- A: 度他雄胺
- B: 坦洛新
- C: 他达拉非
- D: 西地那非

答案：A

4. 属于人体必需、人体不能合成或合成速度不能满足人体需要

- A: 赖氨酸
- B: 复方氨基酸(18AA)
- C: 精氨酸
- D: 复方氨基酸注射液(3AA)

答案：A

5. 可用于治疗伤寒的药物是

- A: 青霉素类
- B: 氨基糖苷类
- C: 四环素类
- D: 氟喹诺酮类

答案：D

6. 下列哪种疼痛不用吗啡治疗

- A: 胆绞痛及肾绞痛
- B: 癌性剧痛
- C: 急性锐痛
- D: 神经压迫性疼痛

答案：D

7. (2019 年真题) 若无禁忌，冠心病或缺血性脑卒中患者均应长期使用的药物是 ()

- A: 氯吡格雷
- B: 阿司匹林
- C: 肝素
- D: 依诺肝素

答案：B

8. 基因重组产品，与天然内源性红细胞生成素作用相似的是()

- A: 尿激酶
- B: 叶酸
- C: 链激酶
- D: 重组人促红素

答案：D

9. 下列对铜绿假单胞菌作用最强的抗菌药物是

- A: 头孢曲松
- B: 头孢噻肟
- C: 头孢哌酮
- D: 头孢甲肟

答案：C

10. 下列药物除哪项外都属于钙拮抗剂

- A: 溴苄铵
- B: 维拉帕米
- C: 地尔硫
- D: 硝苯地平

答案：A

11. 新生儿出血宜选用

- A: 维生素 K1
- B: 肝素
- C: 香豆素类
- D: 维生素 B12

答案：A

12. 格列本脲的作用特点是

- A: 增强胰岛素的作用
- B: 提高靶细胞对胰岛素的敏感性
- C: 抑制胰高血糖素的分泌
- D: 刺激胰岛细胞分泌胰岛素，增加体内的胰岛素水平

答案：D

13. 壬二酸的抗菌活性和吸收依赖于

- A: pH
- B: 作用面积
- C: 浓度
- D: 剂型

答案：A

14. 属于电解质补充药，可用于低钾血症和洋地黄中毒引起的心律失常的药物是

- A: 门冬氨酸钾镁
- B: 双环醇
- C: 多烯磷脂酰胆碱
- D: 异甘草酸镁

答案：A

15. 下列对外用糖皮质激素的叙述，不正确的是

- A: 氟轻松是强效外用糖皮质激素
- B: 糠酸莫米松是中效外用糖皮质激素
- C: 醋酸氢化可的松是弱效外用糖皮质激素
- D: 丁酸氢化可的松是中效外用糖皮质激素

答案：B

16. 可能导致牙龈增生的药物是

- A: 拉西地平
- B: 依诺肝素
- C: 普萘洛尔
- D: 普伐他汀

答案：A

17. 有耳毒性的药物是

- A: 螺内酯
- B: 乙酰唑胺
- C: 呋塞米
- D: 氢氯噻嗪

答案：C

18. 通过促进组织对葡萄糖的摄取和利用发挥作用()

- A: 格列本脲
- B: 艾塞那肽
- C: 二甲双胍
- D: 阿卡波糖

答案：C

19. 治疗侵袭性念珠菌病首选()

- A: 氟康唑
- B: 氟胞嘧啶
- C: 灰黄霉素
- D: 伏立康唑

答案：A

20. 患者男性，29 岁，阴茎头部出现下疳两个月就诊。有不洁性接触史。临床诊断为梅毒。立即给予青霉素注射治疗，十分钟后患者出现胸闷，全身瘙痒、面部发麻，查体：血压 85/60mmHg，脉率 110 次/分。

- A: 过敏反应
- B: 吉海反应
- C: 特异质反应
- D: 反跳现象

答案：A

21. 肝素的抗凝作用特点是

- A: 体内、体外均有效
- B: 作用缓慢
- C: 必须有维生素 K 辅助
- D: 仅在体内有效

答案：A

22. 甲羟孕酮口服用于功能性闭经的用法用量是

- A: 口服，一次 10~20mg，每 4~8 小时一次，连用 2~3 日；血止后每隔 3 日递减 1/3 剂量，直至维持量每日 100mg，连续用药至血止后 21 日停药
- B: 一日 30mg，连服 6 个月
- C: 口服一日 4~8mg，连服 5~10 日
- D: 于月经后半周期(撤退性出血的第 16~25 日)开始口服，一次 10mg，一日 1 次，连用 10~14 日，酌情应用 3~6 个周期

答案：C

23. 用青霉素治疗梅毒、钩端螺旋体病时能出现寒战、咽痛、心率加快等症状,其原因可能是大量病原体被杀灭后出现的全身性反应,这种反应称为()

- A: 赫氏反应
- B: 青霉素脑病
- C: 金鸡纳反应
- D: 瑞夷综合征

答案: A

24. 高血压合并冠心病不宜选用()

- A: 普萘洛尔
- B: 肼屈嗪
- C: 氢氯噻嗪
- D: 胍乙啶

答案: D

25. 奎尼丁对心肌细胞膜的作用主要是()

- A: 抑制 Ca
- B: 促进 Ca
- C: 抑制 Na
- D: 促进 K

答案: C

26. 与 PABA 竞争细菌二氢叶酸合成酶而发挥作用的是

- A: 氨基糖苷类
- B: 磺胺类
- C: 喹诺酮类
- D: 青霉素类

答案：B

27. 丙戊酸钠的严重毒性是

- A: 再生障碍性贫血
- B: 口干、皮肤干燥
- C: 抑制呼吸
- D: 肝功能损害

答案：D

28. 维生素 B1 缺乏时引起()

- A: 坏血病
- B: 角膜软化症
- C: 成人佝偻病
- D: 脚气病

答案：D

29. 服药后尿、唾液、汗液、痰液、泪液等排泄物均可显橘红色的药物是()

- A: 吡嗪酰胺
- B: 利福平
- C: 乙胺丁醇
- D: 链霉素

答案：B

30. 可引起胃肠道出血的是()

- A: 呋塞米
- B: 氨苯蝶啶
- C: 螺内酯

D: 氢氯噻嗪

答案: A

31. 下列哪种药物与碳酸钙合用时易发高钙血症()

A: 氧化镁

B: 四环素

C: 噻嗪类利尿药

D: 阿莫西林

答案: C

32. 合用伊立替康可减弱作用效果的是

A: 依托泊苷

B: 顺铂

C: 琥珀胆碱

D: 米库氯铵

答案: D

33. 丙烯胺类抗真菌药()

A: 特比萘芬

B: 阿莫罗芬

C: 氟康唑

D: 两性霉素

答案: A

34. 主要用于治疗皮肤真菌感染，可抑制角鲨烯环氧酶活性，属于丙烯胺类的抗真菌药物是

A: 阿莫罗芬

B: 联苯苄唑

C: 制霉菌素

D: 特比萘芬

答案: D

35. 乳酶生是

A: 生乳剂

B: 干燥活乳酸杆菌制剂

C: 抗酸药

D: 胃肠解痉药

答案: B

36. 下列关于镇痛药物的禁忌证，错误的是

A: 心源性哮喘禁用吗啡

B: 颅脑损伤患者禁用羟考酮

C: 多痰患者禁用可待因

D: 室上性心动过速禁用哌替啶

答案: A

37. 下列说法正确的是

A: 沙美特罗适用于缓解支气管痉挛的急性症状

B: 异丙托溴铵口服可提高疗效

C: 长效 β_2 受体激动剂不适合初始用于快速恶化的急性哮喘发作

D: 氨茶碱可与青霉素合用

答案: C

38. 抗高血压药对预防脑卒中的强度依次为()

A: ACEI>钙通道阻滞药(CCB)> β 受体阻断药>利尿药>ARB

B: 钙通道阻滞药(CCB)>利尿药>ACEI>ARB> β 受体阻断药

C: ACEI>钙通道阻滞药 (CCB)>ARB>利尿药> β 受体阻断药

D: 钙通道阻滞药 (CCB)>ACEI>利尿药> β 受体阻断药>ARB

答案: B

39. 基于甲状旁腺激素研发出的促进骨形成的药是

A: 特立帕肽

B: 依普黄酮

C: 唑来膦酸

D: 雷洛昔芬

答案: A

40. 患者，女性，40 岁，甲状腺肿大，伴有心悸、多汗、烦躁、消瘦等症状。诊断：甲状腺功能亢进症。

A: 大剂量碘剂

B: 丙硫氧嘧啶

C: 格列齐特

D: 放射性碘

答案: B

41. 氨基糖苷类的主要排泄途径是

A: 主要经肾脏排泄

B: 主要经呼吸道排泄

C: 主要经肝脏清除

D: 经肝、肾双途径清除

答案: A

42. 近期末用过唑类抗真菌药且临床情况稳定的念珠菌(光滑和克柔念珠菌除外)感染，首选()治疗

- A: 卡泊芬净
- B: 伏立康唑
- C: 氟康唑
- D: 氟胞嘧啶

答案：C

43. 关于 PDE5 抑制剂的代谢动力学，错误的是

- A: 伐地那非对 PDE1 和 PDE6 的选择性是西地那非的 4 倍
- B: 他达拉非代谢物少部分从粪便，绝大部分经肾排泄
- C: 他达拉非的吸收不受油脂性食物的影响
- D: 伐地那非对 PDE5 的选择性是西地那非和他达拉非的 10 倍

答案：B

44. 患者女,32 岁,孕 2 周既往有癫痫病史长期服用卡马西平治疗为防止引起新生儿出血,该患者妊娠晚期应当补充的维生素是()

- A: 维生素 K
- B: 叶酸
- C: 维生素 B12
- D: 维生素 D

答案：A

45. 属于前列腺素 FP 受体激动剂的是

- A: 1%碘甘油
- B: 9%硼酸冰片滴耳液
- C: 四环素
- D: 曲伏前列素

答案：D

46. 属于 II 类抗心律失常药 ()

- A: 普萘洛尔
- B: 胺碘酮
- C: 利多卡因
- D: 奎尼丁

答案: A

47. 布地奈德口服给药的效能约为皮质醇的

- A: 100 倍
- B: 40 倍
- C: 25 倍
- D: 15 倍

答案: C

48. 长期服用糖皮质激素不产生下列哪种副作用

- A: 溃疡或出血穿孔
- B: 满月脸
- C: 骨质疏松
- D: 高血钾

答案: D

49. 直接舒张小动脉平滑肌的药物是

- A: 哌唑嗪
- B: 肼屈嗪
- C: 可乐定
- D: 利血平

答案: B

50. ACEI 与()联用，除可增强降压效果外，还可减少后者引起的高肾素血症以及对血尿酸及血糖的不良影响。

- A: 人促红素
- B: 噻嗪类利尿剂
- C: β 受体阻断剂
- D: 留钾利尿剂

答案：B

51. 溶栓药的使用禁忌证不包括

- A: 活动性内脏出血
- B: 1 年内有缺血性脑卒中或脑血管事件
- C: 月经期间
- D: 既往有出血性脑卒中史

答案：C

52. (2016 年真题) 可用于习惯性流产的药品是

- A: 地屈孕酮
- B: 依普黄酮
- C: 他莫昔芬
- D: 戊酸雌二醇

答案：A

53. 可用维生素 B12 治疗的疾病是

- A: 慢性失血性贫血
- B: 再生障碍性贫血
- C: 神经炎
- D: 缺铁性贫血

答案：C

54. 特比萘芬临床上作为()的首选药

- A: 着色芽生菌病
- B: 孢子丝菌病
- C: 曲霉病
- D: 皮肤癣菌病

答案: D

55. 对甲氧西林耐药的葡萄球菌引起的感染有效的抗生素为

- A: 阿莫西林
- B: 氨曲南
- C: 万古霉素
- D: 哌拉西林

答案: C

56. 可增加溶血性尿毒症的发生危险的是

- A: 维生素 C
- B: 红霉素
- C: 氯丙嗪
- D: 他莫昔芬

答案: D

57. 可影响胞浆膜通透性，引起细胞内重要物质外漏的药物是

- A: 多黏菌素
- B: 环丙沙星
- C: 庆大霉素
- D: 特比萘芬

答案: A

58. 哌拉西林

- A: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染
- B: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- C: 肾毒性较大
- D: 口服，肌肉注射或静脉注射均可用于全身感染

答案：A

59. 用于肾病的氨基酸制剂的是

- A: 赖氨酸注射液
- B: 复方氨基酸注射液（9AA）
- C: 复方氨基酸注射液（18AA）
- D: 复方氨基酸注射液（6AA）

答案：B

60. 下列属于二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断药的是()

- A: 双嘧达莫
- B: 阿司匹林
- C: 氯吡格雷
- D: 阿替普酶

答案：C

61. 属于 α_1 受体阻断剂治疗良性前列腺增生症的是

- A: 他达拉非
- B: 度他雄胺
- C: 坦洛新
- D: 西地那非

答案：C

62. 糖皮质激素禁用于低血钾患者是因为

- A: 抑制蛋白质合成
- B: 促进胃酸分泌
- C: 水钠潴留
- D: 抑制免疫功能只抗炎不抗菌

答案：C

63. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1 期）伴出血。13C 呼气试验：Hp（+）。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次 / 日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次 / 日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次 / 日；注射用蛇毒血凝酶 1KU，静脉注射，1 次 / 日；替米沙坦 40mg，口服，1 次 / 日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次 / 日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次 / 日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次 / 日。

- A: 美托洛尔
- B: 胶体果胶铋胶囊
- C: 替米沙坦
- D: 埃索美拉唑钠

答案：B

64. 下列属于非选择性 β 受体阻断药的是()

- A: 美托洛尔
- B: 阿替洛尔
- C: 普萘洛尔
- D: 比索洛尔

答案：C

65. 属于 I B 类抗心律失常药

A: 普萘洛尔

B: 奎尼丁

C: 利多卡因

D: 胺碘酮

答案：C

66. 茶碱浓度 $20 \mu\text{g/ml}$ 时会出现

A: 为有效的治疗浓度

B: 恶心、呕吐、失眠

C: 心动过速、心律失常

D: 呼吸、心跳停止

答案：C

67. 属于长效 β_2 受体激动剂的是

A: 异丙托溴铵

B: 福莫特罗

C: 特布他林

D: 噻托溴铵

答案：B

68. 奥美拉唑治疗消化性溃疡病的机制是()

A: 抑制胃壁细胞的 H

B: 阻断 H

C: 抗幽门螺杆菌

D: 阻断 CTZ 的 D

答案：A

69. 下列属于非选择性 β 受体阻断剂的是

- A: 阿替洛尔
- B: 美托洛尔
- C: 比索洛尔
- D: 普萘洛尔

答案：D

70. 患者已经使用利尿剂治疗高血压，医生欲开始使用福辛普利，应该

- A: 开始用福辛普利前停用利尿剂 5~7 日
- B: 开始用福辛普利前停用利尿剂 2~3 日
- C: 直接换用福辛普利即可
- D: 直接加用福辛普利即可

答案：B

71. 作用于芳香化酶的抗肿瘤药物是

- A: 顺铂
- B: 阿那曲唑
- C: 依托泊苷
- D: 紫杉醇

答案：B

72. (2015 年真题) 易导致牙齿黄染的药品是 ()。

- A: 多西环素
- B: 庆大霉素
- C: 加替沙星
- D: 头孢哌酮

答案：A

73. 甲状腺危象宜选用

- A: 普萘洛尔
- B: 甲状腺片
- C: 硫脲类+大剂量碘
- D: 硫脲类

答案：C

74. (2015 年真题) 服用时必须保持坐位或立位、空腹、服后 30 分钟内不宜进食和卧床的药品是 ()。

- A: 雷洛昔芬
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 依普黄酮
- D: 依降钙素

答案：B

75. 具有低毒，可用于对青霉素类、头孢菌素类过敏的患者的药物是 ()

- A: 克拉维酸
- B: 亚胺培南
- C: 氨曲南
- D: 阿莫西林

答案：C

76. 属于 5-HT₃ 受体阻断剂的止吐药物是

- A: 甲地孕酮
- B: 格雷司琼
- C: 甲氧氯普胺

D: 阿瑞吡坦

答案: B

77. 对 G

A: 第二代头孢菌素

B: 第四代头孢菌素

C: 第三代头孢菌素

D: 第一代头孢菌素

答案: B

78. 对革兰阳性菌作用弱，而对革兰阴性菌作用强的药物是

A: 第四代头孢菌素

B: 第三代头孢菌素

C: 第一代头孢菌素

D: 第二代头孢菌素

答案: B

79. 下列哪类药物属于繁殖期杀菌药()

A: 多黏菌素 B

B: 磺胺类

C: 氯霉素类

D: 青霉素类

答案: D

80. 将乙胺丁醇与链霉素合用治疗结核病的目的是

A: 有利于药物进入结核感染病灶

B: 阻止或延迟结核杆菌对链霉素产生耐药性

C: 延迟肾脏排泄链霉素

D: 延长链霉素作用时间

答案: B

81. 关于硫黄软膏治疗疥疮的用法，错误的是

- A: 儿童可使用 5% 的软膏
- B: 用药期间应勤用热水洗澡
- C: 对顽固患者必需 3 个疗程方能根治
- D: 密切接触者应同时接受治疗

答案: B

82. 容易发生双硫仑样反应的药物包括()

- A: 青霉素
- B: 链霉素
- C: 阿莫西林
- D: 头孢唑林

答案: D

83. 可导致视神经炎的抗结核药是

- A: 吡嗪酰胺
- B: 利福平
- C: 乙胺丁醇
- D: 利福喷丁

答案: C

84. 某患儿高烧就医，诊断为重症流感，医生对患儿进行治疗的同时，建议与患儿有密切接触的家属预防服用奥司他韦。关于奥司他韦预防用药的说法，正确的建（）

- A: 应于密切接触流感患的 2 天以内预防服用，每日两次，每次 75mg

B: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 150mg

C: 应于密切接触流感患儿的 3 天以内预防服用，每日两次，每次 150mg

D: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 75mg

答案：D

85. (2019 年真题) 患者，女，孕 8 周，诊断为“甲状腺功能减退症”，给予左甲状腺素钠片治疗。对该患者的用药指导，错误的是 ()

A: 服用左甲状腺素钠片期间如出现心悸、多汗或体重下降，应及时就诊

B: 左甲状腺素钠极少通过胎盘，治疗剂量下对胎儿无不良影响

C: 应于早餐后将一日剂量左甲状腺素钠片一次性用温水送服

D: 孕期甲减可能对胎儿造成不良影响，服药期间应监测甲功

答案：C

86. 羟基脲选择性作用于肿瘤细胞

A: M 期

B: S 期

C: G0 期

D: G1 期

答案：B

87. (2016 年真题) 属于碳青霉烯类

A: 氨曲南

B: 亚胺培南

C: 头孢美唑

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 头孢吡肟

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/867150143046010024>