

2024年陕西宝鸡市第二人民医院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、神经元兴奋时，首先产生动作电位的部位为（ ）。

- A. 树突
- B. 胞体
- C. 轴突
- D. 轴突始段
- E. 树突始段

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2、贫血时病人皮肤及黏膜苍白，较为可靠的检查部位是（ ）。

- A. 面颊、皮肤及上腭黏膜
- B. 手背皮肤及口腔黏膜
- C. 耳轮皮肤
- D. 颈部皮肤及舌面
- E. 睑结膜、指甲及口唇

【正确答案】

E

【答案解析】

贫血时病人皮肤及黏膜苍白，较为可靠的检查部位是睑结膜、指甲及口唇，其余部位因受肤色等因素影响而不是太可靠。

3、血浆中能与铁结合的转铁蛋白称（ ）。

- A. 未饱和铁结合力
- B. 转铁蛋白饱和度
- C. 铁蛋白
- D. 转铁蛋白
- E. 总铁结合力

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

4、在妊娠期间子宫肌瘤容易发生的变性是（ ）。

- A. 玻璃样变
- B. 囊性变
- C. 红色变
- D. 肉瘤变
- E. 钙化

【正确答案】

C

【答案解析】

子宫肌瘤是女性生殖器官最常见的良性肿瘤，由平滑肌和结缔组织组成。肌瘤变性有五种，其中红色样变是一种特殊类型的肌瘤坏死，多见于单一较大的壁间肌瘤，常发生于妊娠或产褥期，可能与局部组织缺血、梗死、淤血、血栓阻塞，而致局部组织出血、溶血有关，使血液渗入瘤体，肉眼见肌瘤红色，似生牛肉状，完全失去原旋涡状结构。而子宫肌瘤囊性变、子宫肌瘤玻璃样变、子宫肌瘤恶性变、钙化与产褥无特定时间关系。

5、关于丁型肝炎(HD)和丁型肝炎病毒(HDV)的描述，错误的是()。

- A. HDV为缺陷型病毒，其核心含有单股负链环状RNA和核蛋白(HDAg)
- B. HDV衣壳为嗜肝DNA病毒科病毒的衣壳
- C. 诊断HD或HDV感染依据检测血清中HDV RNA和抗-HDIgM及IgG，而游离HDAg仅存在于肝细胞内，不能从血清中查出
- D. HDV的感染形式是与嗜肝病毒科(如HBV)重叠感染(superinfection)或同时感染(coinfection)
- E. HD与乙型肝炎传播途径相似，接种乙肝疫苗可预防HDV感染与传播

【正确答案】

C

【答案解析】

丁型肝炎的特异性诊断方法为从肝脏和血清检测HDAg或HDV-RNA，或从血清检测抗-HD、抗-HD IgM。

6、下列哪项是足月儿生后第1h内的呼吸频率?()

- A. 20~30/min
- B. 40~50/min
- C. 60~80/min
- D. 80~100/min
- E. 100~120/min

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

7、哪项是成熟红细胞中能量的主要来源?()

- A. 糖酵解
- B. 糖异生作用
- C. 糖有氧氧化
- D. 脂肪酸氧化
- E. 氨基酸分解代谢

【正确答案】

A

【答案解析】

成熟红细胞中无细胞器结构，不能进行糖的有氧氧化功能，其主要功能方式为糖酵解。

8、什么年龄多数婴儿动脉导管在解剖上关闭()。

- A. 3个月
- B. 5个月
- C. 7个月
- D. 9个月
- E. 11个月

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

9、黄某2001年10月因医疗事故受到吊销医师执业证书的行政处罚，2002年9月向当地卫生行政部门申请重新注册。卫生行政部门经过审查决定

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/867201140164006044>