

护理考试试题题库及答案（各科）

护士考试试题题库及答案(各科)

1.细胞外液中的主要阳离子是（ A ）

A. 钠 B.钾 C.镁 D.钙

2.下列哪项是等渗性缺水的特点（ D ）

A.循环血量增多

B.细胞外高渗状态

C.细胞外低渗状态

D.水与钠等比例丧失

3.中度低渗性缺水血清钠值（ C ）

A. 130mmol/L

B. 110mmol/L

C. 120mmol/L

D. 128mmol/L

3.下列哪项是高渗性缺水的特点（ A ）

A.失水多于失钠

B.失钠多于失水

C.水潴留

D.血浆渗透压下降

4.水中毒治疗原则哪项正确（ A ）

A.严重时静脉输注高渗盐水

B.减少水和钠的继续丧失

C.鼓励病人饮水

D.静脉补充非电解质溶液

5.血清 pH 正常值（ B ）

A. 7.35~7.4

B. 7.35~7.45

C. 7.25~7.45

D. 7.3~7.45~

6.第一间隙容纳体液成分（ A ）

A.细胞内液

B.血浆

C.组织间液

D.腹腔液

7.正常成人体内过剩的钠钾主要经过下列哪项排出体外（ D ）

A.汗水

B.呼吸道蒸发

C.粪便

D.尿液

8.外科中最常见的缺水类型（ A ）

A.急性缺水

B.慢性缺水

C.继发性缺水

D.原发性缺水

9.下列哪项是等渗性缺水处理原则（ C ）

A.5% 葡萄糖溶液

B.10% 葡萄糖溶液

C.平衡盐溶液

D.5% 葡萄糖氯化钠溶液

10.关于高渗性缺水的中度缺水表现的描述，正确的是（ D ）

A.躁狂

B.幻觉

C.谵妄

D.乏力，尿少

11.水潴留性低钠血症又称（ C ）

A.高渗性缺水

B.低渗性缺水

C.水中毒

D.等渗性缺水

12. 关于低钾血症下列说法哪项错误 (D)

- A. 常发生碱中毒
- B. 患者有肠麻痹、腹胀
- C. 心电图 T 波低平、出现 U 波
- D. 血管收缩

13. 高钾血症比低钾血症更危险的原因是 (D)

- A. 肌肉无力、软瘫
- B. 尿闭
- C. 呼吸肌无力影响呼吸
- D. 心搏骤停
- E. 酸中毒

14. 下列哪项为低钾血症病因 (D)

- A. 急性肾衰
- B. 代谢性酸中毒
- C. 严重挤压伤
- D. 长期禁食

15. 属于低钾血症最早的临床表现是 (C)

- A. 心功能异常
- B. 代谢性碱中毒
- C. 肌无力
- D. 消化功能障碍

16. 下列哪项易使心脏骤停于舒张期 (D)

- A. 低钙血症
- B. 低镁血症
- C. 低钾血症
- D. 高钾血症

17. 高钙血症主要见于下列哪项疾病 (D)

- A. 肾上腺功能不全
- B. 肢端肥大症
- C. 骨转移癌

D. 甲状旁腺功能亢进

18. 外科最常见的酸碱平衡失调是 (D)

A. 呼吸性碱中毒

B. 呼吸性酸中毒

C. 代谢性碱中毒

D. 代谢性酸中毒

19. 常合并高钾血症的代谢失衡 (A)

A. 代谢性和呼吸性酸中毒

B. 呼吸性碱中毒

C. 高钙血症

D. 代谢性碱中毒

20. 代谢性酸中毒临床上最突出的症状是 (B)

A. 呼吸浅慢, 呼气时有烂苹果味

B. 呼吸深快, 呼气时有酮味

C. 呼吸浅快, 呼气时有酮味

D. 呼吸深慢, 呼气时有酮味

21. 代谢性碱中毒常常伴发 (C)

A. 低钠血症

B. 高钠血症

C. 低钾血症

D. 高钾血症

22. 代谢性酸中毒血气分析主要依据 (A)

A. pH 值和 $[\text{HCO}_3^-]$ 明显 \downarrow ; PaCO_2

正常

2

正常

B. pH 值和 $[\text{HCO}_3^-]$ 明显 \uparrow ; PaCO_2

正常

2

正常

C. pH 值 ↓ PaCO

2 ↑; [HCO

3

-] 正常

D. pH 值 ↑ PaCO

2 和 [HCO

3

-] ↓

23. 代谢性碱中毒是由于 (C)

A. 肺泡通气过度的 PaCO

2 ↓ B. 肺泡通气及换气减弱的 PaCO

2

↑

C. 体内 H⁺ 丢失

D. 体内酸性物质产生过多

24. 关于呼吸性酸中毒的叙述哪项正确 (C)

A. 肺泡通气过度

B. 体内 CO

2

排出过多

C. 肺泡通气及换气减弱

D. 体内 HCO

3

-增多

25. 休克治疗过程中下列哪项监测最重要 (D)

A. 昏迷程度

B. 血压数值

C. 出汗多少

D. 尿量变化

E. 体温

26. 抗休克的最根本措施是 (D)

- A. 止血
- B. 通畅呼吸道
- C. 减少耗氧
- D. 补充血容量

27. 外科休克中最为常见 (B)

- A. 低血容量性休克和心源性休克
- B. 低血容量性休克和感染性休克
- C. 过敏性休克和感染性休克
- D. 心源性休克和神经性休克

28. 休克病人死亡的主要因素 (D)

- A. 肺间质水肿
- B. 血压下降
- C. 尿量减少
- D. MODF

29. 感染性休克常继发于哪种细菌为主的感染 (A)

- A. 革兰阴性杆菌
- B. 革兰阳性球菌
- C. 变形杆菌
- D. 衣原体

30. 创伤性休克是由于 (D)

- A. 急性大量失血
- B. 胆道化脓性感染
- C. 青霉素过敏
- D. 严重创伤

31. 休克病人的血压与脉压差 (A)

- A. 收缩压 $<90\text{mmHg}$, 脉压差 $<20\text{mmHg}$
- B. 收缩压 $<95\text{mmHg}$, 脉压差 $<20\text{mmHg}$
- C. 收缩压 $<90\text{mmHg}$, 脉压差 $>20\text{mmHg}$
- D. 收缩压 $<80\text{mmHg}$, 脉压差 $<20\text{mmHg}$

32. 休克护理中下列哪项不正确 (C)

- A. 下肢抬高 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$, 头部微抬
- B. 常需开放两路输液
- C. 四肢冰冷时用热水袋改善末梢循环
- D. 常规吸氧, 流量 $6 \sim 8\text{L}/\text{min}$
- E. 最好有中心静脉压监测

33. 病人烦躁不安、面色苍白、皮肤湿冷, 脉率 $100 \text{ 次}/\text{min}$, 血压 $13/11\text{kPa}$, 尿量 $10\text{ml}/\text{h}$, 治疗上首先应给 (C)

- A. 血管扩张药
- B. 50% 葡萄糖液
- C. 输液
- D. 5% 碳酸氢钠

$>8\text{kPa}$, 吸入纯氧后仍无改善, 应考虑 (D)

34. 休克病人 PaCO_2

2

- A. 肺间质水肿
- B. 肺泡萎陷
- C. 局限肺不张
- D. ARDS

35. 休克保暖时切忌 (D)

- A. 盖棉被
- B. 加盖毛毯
- C. 将室温调至 20°C 左右为宜
- D. 用热水袋或电热毯

36. ICU 是下列哪项的主要治疗场所 (C)

- A. 疼痛治疗学
- B. 麻醉治疗学
- C. 重症监测治疗学
- D. 临床麻醉学

37. 静脉麻醉药氯胺酮使用较大剂量时应注意 (D)

- A. 观察尿量
- B. 观察体温
- C. 观察皮肤颜色
- D. 对循环和呼吸的抑制

38. 常用局麻酯类药是引起少数病人发生过敏反应的过敏原，如

(A)

- A. 普鲁卡因
- B. 利多卡因
- C. 布比卡因
- D. 罗哌卡因

39. 局麻药加入下列哪种药能增强阻滞效能并减轻局麻药的毒性反

应 (A)

- A. 肾上腺素
- B. 度冷丁
- C. 安定
- D. 吗啡

40. 术前应用阿托品主要作用 (D)

- A. 抑制病人情绪激动
- B. 抗焦虑及遗忘
- C. 镇痛及镇静
- D. 抑制唾液腺，呼吸道腺体

41. 甲状腺手术位 (D)

- A. 头低斜坡位
- B. 头垫高,有利于放松颈部肌肉
- C. 坐位
- D. 轻度头高斜坡位,肩部垫高,头后仰,颈部伸直

42. 脊柱手术的体位 (B)

- A. 坐位
- B. 俯卧位
- C. 头高斜坡位

D. 侧卧位

43. 局麻药局部用药必须遵循的原则 (D)

A. 高浓度、小剂量

B. 低浓度、小剂量

C. 低浓度、大剂量

D. 最小有效剂量和最低有效浓度

44. 椎管内麻醉后常规体位 (B)

A. 平卧 8 小时

B. 去枕平卧 6~8 小时

C. 侧卧 6~8 小时

D. 俯卧 6 小时

45. 硬膜外麻醉最危险的并发症 (D)

A. 导管误入血管

B. 导管折断

C. 硬膜外间隙出血

D. 全脊髓麻醉

46. 全身麻醉中循环系统最常见并发症 (A)

A. 高血压

B. 低血压

C. 室性心律失常

D. 心搏停止

47. 表示动脉血浆中物理溶解的 O

2

分子所产生的分压是哪项 (A)

A. PaO

2 B. PaCO

2

C. SaO

2

D. BB

48. 临床判断呼吸性酸碱紊乱的唯一指标 (C)

A. BE

B. AG

C. PaCO₂

2

D. pH

49. SaO₂

2

的高低取决于 (D)

A. 血浆酸碱度

B. 动脉血氧分压

C. 阴离子间隙

D. 血红蛋白质量

50. 对于成人低氧血症者, 目前较公认的应用氧治疗标准是 (A)

A. PaO₂

$2 < 8.0 \text{ kPa}$ B. PaO₂

2

$< 6.65 \text{ kPa}$

C. PaO₂

$2 < 7.32 \text{ Kp}$ D. PaO₂

2

$< 8.65 \text{ kPa}$

51. 手术前一般准备中哪项是预防切口感染的重要环节 (C)

A. 充足的休息

B. 术前置胃管

C. 手术区皮肤准备

D. 胃肠道准备

52. 急性心肌梗死病人已无心绞痛者择期手术所需时间 (D)

A. 3 个月以上

B. 一年以上

C. 10 个月以上

D. 6 个月以上

53. 关于备皮，下列不妥的是（ D ）

A. 剃毛刀片锐利

B. 剃毛后检查有无割痕

C. 绷紧皮肤

D. 逆行剃除毛发

54. 颅脑手术后，无休克或昏迷时的体位（ A ）

A. 头高脚低斜坡卧位

B. 高半坐卧位

C. 低半坐卧位

D. 斜坡卧位

55. 术后 5~7 天拆线的手术部位（ D ）

A. 胸部和上腹部手术

B. 臀部和背部手术

C. 颈部和面部手术

D. 下腹部和会阴部手术

56. 减张缝线拆线时间（ B ）

A. 10 天

B. 14 天

C. 15 天

D. 18 天

57. 外科手术热体温一般不超过（ A ）

A. 38℃

B. 38.5℃

C. 39℃

D. 37.5℃

58. 外科术后若 3~6 天仍持续发热，则提示（ A ）

A. 感染

B. 营养不良

C. 出血

D. 血压较低

59. 麻醉镇痛后的常见反应 (C)

A. 发热

B. 腹胀

C. 恶心、呕吐

D. 体温升高

60. 外科术后切口感染常发生于术后 (B)

A. 2~3 天

B. 3~4 天

C. 4~5 天

D. 5~6 天

61. 手术后尿路感染常继发于下列哪种情况 (C)

A. 术后出血

B. 切口感染

C. 尿潴留

D. 肺不张

62. 术后深静脉血栓形成病人护理, 下列不妥的是 (D)

A. 平卧位

B. 抬高患肢

C. 制动

D. 局部按摩

63. T 型引流管属哪类引流物 (D)

A. 乳胶片引流条

B. 纱布引流条

C. 烟卷式引流条

D. 管状引流管

64. 用 70% 乙醇消毒 2~3 次的手术区域 (D)

A. 会阴部

B. 面部皮肤

C. 婴儿

D. 供皮区

65. 肠内营养治疗时最常见的并发症 (D)

A. 喂养管阻塞

B. 高血糖

C. 吸入性肺炎

D. 胃肠道并发症

66. 肠内营养治疗时胃肠道并发症中最常见的是 (D)

A. 呕吐

B. 腹胀

C. 便秘

D. 腹泻

67. 长期 TPN 时, 可能出现缺乏下列物质 (D)

A. 葡萄糖

B. 氨基酸

C. 脂肪

D. 微量元素

68. 气性坏疽的临床特点是 (D)

A. 厌氧菌感染

B. 产生大量不溶性气体

C. 细菌产生卵磷脂酶

D. 12 ~ 24 小时引起全身情况迅速化

69. 健康的肉芽组织特点 (D)

A. 肉芽水肿

B. 多呈淡粉红色

C. 质地松软

D. 色泽新鲜呈粉红

70. 全身麻醉患者清醒前最重要的护理是 (D)

A. 切口观察

B. 注意保暖

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/868000122073007002>