

同等学力申硕-临床病理学-系统病理学-心血管系统疾病-心血管系统 1(X 型题)

[多选题]1. 急性心肌梗死溶栓治疗，常用的溶栓剂有

- A. rt-PA
- B. 阿司匹林（乙酰水杨酸）
- C. 尿激酶
- D. 链激酶
- E. 肝素

（江南博哥） 正确答案：ACD

[多选题]2. 以下哪种情况考虑心肌梗塞

- A. 恶心，呕吐伴血压下降
- B. 以前无心脏病史突然发生心力衰竭
- C. 快速房颤
- D. 不明原因的右上腹痛或恶心呕吐
- E. 不明原因的休克

正确答案：ABCE

[多选题]3. 哪些病变可出现脑栓死并发症

- A. 扩张型心肌病
- B. 右房黏液瘤
- C. 急性心肌梗死
- D. 急性心肌炎
- E. 二尖瓣关闭不全

正确答案：ACE

[多选题]4. 心电图 II、III、aVF、V8、V9 导联运动后出现 ST 段水平下降，最可能涉及的冠状动脉有

- A. 右冠状动脉
- B. 左前降支
- C. 左回旋支
- D. 左主干
- E. 对角支

正确答案：AC

[多选题]5. ST 段广泛压低见于哪些疾病

- A. 急性心肌炎
- B. 心肌病
- C. 高血压病
- D. 亚急性心肌炎
- E. 慢性心包炎

正确答案：ABCDE

[多选题]6. ST 段抬高可见于下列哪些疾病

- A. 急性心肌梗死
- B. 急性心包炎
- C. 过早复极综合征
- D. 陈旧性心梗室壁瘤形成
- E. 扩张型心肌病

**正确答案：** ABCD

[多选题]7. 心肌梗死后慢性心力衰竭可延长病人寿命的药物是

- A. 血管紧张素转换酶抑制剂
- B. 钙拮抗剂
- C.  $\beta$ 受体阻滞剂
- D. 利尿剂
- E. 洋地黄

**正确答案：** AC

[多选题]8. 无脉搏性电活动常见于以下哪些疾病

- A. 严重心脏病的终末表现
- B. 高血压病
- C. 心脏骤停的电击治疗后
- D. 心包压塞
- E. 急性心肌梗死伴心源性休克

**正确答案：** ACD

[多选题]9. 主动脉夹层造成内膜撕裂的主要因素有

- A. 主动脉中层囊性坏死
- B. 主动脉中层肌肉退行性变
- C. 血压的高度
- D. 血胆固醇含量
- E. 主动脉内膜斑块不稳定性

**正确答案：** ABCE

[多选题]10. 肺炎球菌肺炎病理改变分期为

- A. 充血期
- B. 红肝变期
- C. 灰肝变期
- D. 机化期
- E. 消散期

**正确答案：** ABCE

[多选题]11. 慢性阻塞性肺病（COPD）包括

- A. 慢性支气管炎、肺气肿、肺间质纤维化
- B. 伴有气流阻塞的慢性支气管炎
- C. 伴有气流阻塞的肺气肿

- D. 弥漫性泛细支气管炎
- E. 支气管哮喘，支气管舒张试验阳性者

**正确答案：**BC

[多选题]12. 下列哪些疾病与 Hp 感染关系密切

- A. 慢性胃炎
- B. 消化性溃疡
- C. 反流性食管炎
- D. 胃癌
- E. MALT 淋巴瘤

**正确答案：**ABDE

[多选题]13. 急性胰腺炎病因包括

- A. 胆道蛔虫病
- B. 高钙血症
- C. 十二指肠球部溃疡无并发症
- D. 使用糖皮质激素
- E. ERCP 检查

**正确答案：**ABDE

[多选题]14. 青年肾病综合征患者常见的病因是

- A. 过敏性紫癜肾炎
- B. 肾淀粉样变
- C. 狼疮性肾炎
- D. 骨髓瘤性肾病
- E. 乙型肝炎病毒相关肾炎

**正确答案：**ACE

[多选题]15. 易导致血尿的药物有

- A. 糖皮质激素
- B. 环磷酰胺
- C. 氮芥
- D. 磺胺
- E. 吲哚美辛

**正确答案：**BDE

[多选题]16. 自身免疫性甲状腺病 (AITD) 包括

- A. Graves 病
- B. 桥本病
- C. Plummer 病
- D. 亚急性肉芽肿性甲状腺炎
- E. 特发性黏液性水肿

**正确答案：**ABE

[多选题]17. 发生急性溶血性输血反应是因为

- A. Rh 血型不合
- B. 少见稀有血型不合
- C. 红细胞亚型
- D. 受血者红细胞有缺陷
- E. ABO 血型不合

**正确答案：** ADE

[多选题]18. 动眼神经损害体征有

- A. 上睑下垂
- B. 眼球外展不能
- C. 眼球上视不能
- D. 眼球内收不能
- E. 视力减退

**正确答案：** ACD

[多选题]19. 风湿性心脏病联合瓣膜病患者，心功能处于代偿期，应进行的检查和治疗有

- A. 检查有无风湿活动
- B. 注意防止上呼吸道感染
- C. 应用洋地黄制剂防止心功能不全发生
- D. 避免体力劳动
- E. 应用利尿剂减轻心脏负担

**正确答案：** ABD

[多选题]20. 房间隔缺损，可见下列哪些心电图表现

- A. 左室肥厚
- B. 房室传导阻滞
- C. 不全或完全右束支传导阻滞
- D. 左束支传导阻滞
- E. ST-T 改变

**正确答案：** BCE

[多选题]21. 漏出性胸腔积液的特点

- A. 清澈透亮
- B. 比重小于 1.018
- C. 胸水总蛋白定量  $>30\text{g/L}$
- D. 胸液/血清 LDH 小于 0.5
- E. 有核细胞数小于  $100/\mu\text{l}$

**正确答案：** ABDE

[多选题]22. 下列哪些符合 A 型胃炎诊断

- A. 胃酸增多

- B. 血清胃泌素降低
- C. 抗壁细胞抗体阳性
- D. 贫血
- E. 抗内因子抗体阳性

**正确答案：** CDE

[多选题]23. 慢性肾功能衰竭的主要病理生理改变是

- A. 水、电解质平衡失调
- B. 蛋白质代谢产物潴留
- C. 代谢性酸中毒
- D. 高尿酸血症
- E. 糖耐量减低

**正确答案：** ABCDE

[多选题]24. 支持高功能甲状腺腺瘤的是

- A. 甲状腺扫描热结节，周围甲状腺组织受抑制
- B. T<sub>3</sub>增高，T<sub>4</sub>正常
- C. T<sub>4</sub>增高，T<sub>3</sub>正常
- D. TSH增高
- E. TSH增高，T<sub>3</sub>增高

**正确答案：** AB

[多选题]25. 下列哪些提示血管内溶血

- A. 血清游离胆红素增高
- B. 血红蛋白尿
- C. 含铁血黄素尿
- D. 尿中尿胆原增高
- E. 脾大

**正确答案：** BC

[多选题]26. 传染病发生流行的基本条件是

- A. 传染源
- B. 传播途径
- C. 易感人群
- D. 已免疫的人群
- E. 预防接种

**正确答案：** ABC

[多选题]27. 面神经炎的临床表现是

- A. 任何年龄均可发病
- B. 起病突然
- C. 一侧鼻唇沟浅，同侧闭眼有力
- D. 急性期乳突前方可有压痛

E. 一侧鼻唇沟浅，同侧闭眼无力

**正确答案：** ABDE

[多选题]28. 有关癫痫的下列描述，哪些是正确的

- A. 终生不愈
- B. 抗癫痫药宜从最小有效剂量开始
- C. 用药后定期检查肝肾功能
- D. 单一药物无效或控制不好时才联合用药
- E. 原发性癫痫伴脑电图异常的遗传率高

**正确答案：** BCDE

[多选题]29. RAS 对血压的影响机制

- A. 外周血管阻力增加
- B. 促去甲肾上腺素分泌
- C. 促醛固酮分泌
- D. 促甲状腺激素分泌
- E. 促肾上腺皮质激素分泌

**正确答案：** ABC

[多选题]30. 引起急性心肌梗死的原因有

- A. 冠脉内血栓形成
- B. 休克
- C. 脱水
- D. 妊娠
- E. 严重心律失常

**正确答案：** ABCE

[多选题]31. 下列哪些抗心律失常药物可以引起心室有效不应期延长

- A. 丙吡胺
- B. 美西律
- C. 索他洛尔
- D. 胺碘酮
- E. 利多卡因

**正确答案：** ACD

[多选题]32. 下列室上性心动过速治疗的组合中，哪些项正确

- A. 合并冠心病心绞痛—普萘洛尔静脉注射
- B. 合并心肌病心衰者—胺碘酮静脉注射
- C. 合并洋地黄中毒—电复律
- D. 合并休克—普鲁卡因酰胺静脉注射
- E. 合并预激综合征—维拉帕米静脉注射

**正确答案：** AB

[多选题]33. 肥厚性心肌病（梗阻型），能增强其收缩期喷射性杂音的因素是

- A. 吸入亚硝酸异戊酯或口含硝酸甘油
- B. 增强心肌收缩力，增大压力阶差，如服用洋地黄
- C. 减少静脉回心血量，如站立位、呼气动作
- D.  $\beta$  受体阻滞剂
- E. 合心爽

**正确答案：** ABC

[多选题]34. 心律失常的治疗组合中，下列哪些是错误的

- A. III度房室传导阻滞伴短阵室性心动过速—同步直流电复律
- B. 伴有严重血流动力学障碍的室速—心内膜心室起搏
- C. 频发多源室性早搏成对出现或 RonT—利多卡因静脉注射
- D. 窦性心动过缓伴室性早搏—阿托品
- E. 阵发性室上性心动过速伴心力衰竭—维拉帕米静脉注射

**正确答案：** ABE

[多选题]35. 下列哪些药物在心肌梗死后二级预防中对总病死率具有有利影响

- A. 索他洛尔
- B. 辛伐他汀
- C. 肝素
- D. 依那普利
- E. 硝酸甘油

**正确答案：** BD

[多选题]36. 心绞痛的病因有

- A. 冠状动脉粥样硬化性狭窄
- B. 冠状动脉痉挛
- C. 主动脉瓣严重关闭不全
- D. 肺栓塞
- E. 电解质紊乱

**正确答案：** ABC

[多选题]37. 高血压病发病机制

- A. 遗传因素
- B. 交感神经活动增高
- C. RAS 激活
- D. 血管内皮功能异常
- E. 胰岛素抵抗

**正确答案：** ABCDE

[多选题]38. 浆液性心包积液病因有

- A. 非特异性
- B. 病毒感染
- C. 低蛋白血症

- D. 充血性心力衰竭
- E. 放射治疗后

**正确答案：**ABCDE

**参考解析：**所列的5种病因均可引起浆液性心包积液。非特异性心包炎的病因不明，可能与病毒感染有关；放射治疗后的心包炎是属于反应性的；低蛋白血症和充血性心力衰竭的心包积液一般是属于漏出性的。

[多选题]39. 二尖瓣狭窄患者常见的并发症有

- A. 房颤
- B. 血栓栓塞
- C. 感染性心内膜炎
- D. 肺部感染
- E. 急性肺水肿

**正确答案：**ABDE

[多选题]40. 下列哪些是扩张型心肌病的临床表现

- A. 栓塞
- B. 心脏压塞
- C. 心衰
- D. 心律失常
- E. 猝死

**正确答案：**ACDE

[多选题]41. 原发性心肌病分为

- A. 扩张型心肌病
- B. 肥厚型心肌病
- C. 限制型心肌病
- D. 未定型心肌病
- E. 混合性心肌病

**正确答案：**ABC

[多选题]42. 急性心包炎所致心脏压塞的临床表现有

- A. 奇脉
- B. 心率加快
- C. 心排量降低
- D. 静脉压显著增高
- E. 外周动脉舒张压上升

**正确答案：**ABCD

[多选题]43. 继发性高血压，发病机制中哪些正确

- A. 慢性肾小球肾炎所致的高血压主要与水钠潴留及血容量增加有关
- B. 肾血管性高血压在继发性高血压中属不常见的一种
- C. 原发性醛固酮增多症仅少数病例可发展为重度或恶性高血压



- D. 嗜铬细胞瘤在继发性高血压中是较少的一种
- E. 对 40 岁以上的高血压者应着重考虑继发性高血压的可能

**正确答案：** ABC

[多选题]44. 下列哪些情况适于安置人工心脏起搏器

- A. 心室颤动
- B. 心动过缓-心动过速综合征
- C. 完全性房室传导阻滞引起阿-斯综合征发作
- D. 窦房传导阻滞引起严重心动过缓
- E. 反复发作的颈动脉窦性晕厥和心室停顿

**正确答案：** BCDE

[多选题]45. 有关原发性高血压的并发症，下列哪些正确

- A. 心、脑、肾等器官是主要受累脏器
- B. 脑卒中的发病率比心肌梗死高 5 倍左右
- C. 恶性高血压以脑并发症最为突出
- D. 眼底病变与高血压的严重程度直接有关
- E. 高血压脑病症状出现可能与脑水肿有关

**正确答案：** ABDE

[多选题]46. 下列哪些是心脏压塞的体征

- A. 肺部大量湿性啰音
- B. 休克
- C. 颈静脉曲张
- D. 心率减慢
- E. 心音低远

**正确答案：** BCE

[多选题]47. 关于心脏复苏，以下哪些是正确的

- A. 房颤是心跳骤停的一种类型
- B. 心脏复苏时，首选心内注射给药
- C. 心脏复苏用药，首选去甲肾上腺素
- D. 一旦确诊为心脏骤停，首先立即尝试捶击复律，其次清理呼吸道
- E. 电除颤是治疗室颤最有效的方法

**正确答案：** DE

[多选题]48. 哪些疾病可出现二尖瓣区舒张期隆隆样杂音

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 左房粘液瘤
- C. 扩张型心肌病
- D. 重度贫血
- E. 肺动脉狭窄

**正确答案：** ABCD

[多选题]49. 下述哪些疾病属于原发性心肌病

- A. 克山病
- B. 扩张型心肌病
- C. 孤立性心肌炎
- D. 病毒性心肌炎
- E. 限制型心肌病

**正确答案:** ABE

[多选题]50. S-T 段的抬高主要见于

- A. 心肌缺血
- B. 急性心肌梗死
- C. 急性心肌炎
- D. 急性心包炎
- E. 变异型心绞痛

**正确答案:** BDE

[多选题]51. 下列哪些是使用洋地黄的禁忌证

- A. 预激综合征伴房颤或扑动
- B. 阵发性室上性心动过速
- C. 肥厚梗阻型心肌病而无心房颤动或明显心衰
- D. 快速房颤伴心衰
- E. II 或高度 AVB

**正确答案:** ACE

[多选题]52. 左心功能不全常出现

- A. 劳力性呼吸困难
- B. 咳嗽、咳痰
- C. 咳粉红色泡沫痰
- D. 下肢水肿
- E. 疲乏，无力

**正确答案:** ABCE

[多选题]53. 下列哪些是二尖瓣狭窄的症状

- A. 呼吸困难
- B. 心绞痛
- C. 咯血
- D. 声嘶
- E. 咳嗽、咳痰

**正确答案:** ACDE

[多选题]54. 胰岛素抵抗引起高血压的机制有

- A. 降低血压对食物盐摄入的敏感性
- B. 增加肾脏对钠与水的重吸收

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/868037067074006130>