

北京住院医师内科 I 阶段《风湿免疫科测试题》模拟卷

姓名: _____ 年级: _____ 学号: _____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题: 关于类风湿因子的叙述, 错误的说法是 ()
A. RF 属于自身抗体
B. RF 的数量常与 RA 的严重程度成正比
C. 类风湿因子分 gM-RF、IgG-RF 和 IgA-RF
D. 临床常规检测的是 IgM-RA
E. 所有 RA 患者 RF 均阳性
- 单项选择题: 类风湿关节炎的主要表现是多发性和对称性增生性滑膜炎, 导致此炎症反应的原因是 ()
A. 血循环中的 RF
B. 存在于关节的 RF
C. 关节中的 IL-1
D. 关节中的 TGF- β
E. EB 病毒
- 单项选择题: 对类风湿性关节炎更具诊断意义的检查项目是 ()
A. ASK
B. 类风湿因子
C. 抗透明酯酸酶
D. ASO
E. 抗磷脂抗体
- 单项选择题: 类风湿性关节炎的常见关节畸形有 ()
A. 近端指间关节梭形肿胀, 尺侧腕伸肌萎缩, 手腕向桡侧旋转、偏移, 手指向尺侧代偿性移位, 形成指掌尺侧偏移
B. 掌指关节强直畸形
C. 肘、膝、踝关节脱位
D. 远端指间关节严重屈曲, 近端指间关节过伸呈钮孔花样畸形
E. 远端指间关节过伸, 近端指关节屈曲畸形, 形成鹅颈样畸形
- 单项选择题: 女, 36 岁, 指关节、腕关节肿痛半年, 晨僵约 1h, 血沉 36mm/h, X 线示双手指间关节软组织肿胀, 关节两端骨质疏松。此时应定为类风湿性关节炎的 ()
A. I 期
B. II 早期
C. II 晚期
D. III 期
E. IV 期
- 单项选择题: 下列有关糖皮质激素治疗类风湿性关节炎的说法哪一项是正确的 ()
A. 糖皮质激素具有强有力的抗炎作用, 在类风湿性关节炎治疗中常规使用

- B. 糖皮质激素常规用量每日每公斤体重 1-2mg
C. 应用糖皮质激素能阻止病情进展，减轻关节破坏
D. 糖皮质激素副作用较大，不宜长期使用
E. 严重血管炎时可采用大剂量长疗程泼尼松治疗
- 7、单项选择题：血清阴性脊柱关节病的名字由来是指血清中（ ） A. ASO 阴性
B. RF 阴性
C. ANA 阴性
D. CRP 阴性
E. 抗 dsDNA 抗体阴性
- 8、单项选择题：女性，20 岁，发热，体温达 38.8°C、伴有干咳，双手及足多关节肿痛，无晨僵，化验血 WBC $3.3 \times 10^9/L$ ，HGB70g/L，RF (+)，ANA1: 80，应诊断为（ ） A. 痛风性关节炎
B. 类风湿关节炎
C. 混合性结缔组织病
D. 系统性红斑狼疮
E. EB 病毒感染
- 9、单项选择题：对于 SLE 下述哪项正确（ ） A. 表现为肾病综合征者多为选择性蛋白尿
B. 90%~100%病人光镜、电镜和免疫荧光检查肾有病变
C. 1 / 3 病人肾受损
D. 90%病人死于慢性肾衰竭
E. 很少引起急性肾衰竭
- 10、单项选择题：关于类风湿关节炎的描述，哪项不正确（ ） A. 慢性病
B. 全身性疾病
C. 自身免疫性疾病
D. 风湿病
E. 治疗的主要目的是缓解疼痛
- 11、单项选择题：强的松治疗类风湿性关节炎，一般每日剂量不超过（ ） A. 10mg
B. 20mg
C. 30mg
D. 40mg
E. 60mg
- 12、单项选择题：下列抗体中，不属于抗核抗体谱的是（ ） A. 抗磷脂抗体
B. 抗单链 DNA 抗体
C. 抗双链 DNA 抗体
D. 抗 RNP 抗体
E. 抗 JO-1 抗体
- 13、单项选择题：下述哪项不是系统性硬化病的特征性表现（ ） A. 面部皮肤病变
B. 手指皮肤病变
C. 反流性食管炎
D. 急性肾衰
E. 面部皮疹
- 14、单项选择题：对于腰背痛腰椎活动受限患者诊断 AS，正确的是（ ） A. 伴 HLAB27 阳性
B. 伴骶髂关节炎 III 级

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/868076125073006063>