

(新) 急救相关知识考试题库

第一部分 单选题(200 题)

1、急性腹痛患者，既往有节律性上腹痛病史，此次发病前暴饮暴食后，突然出现
腹上区剧烈疼痛，腹膜刺激征明显，x 线显示膈下游离气体，此患者可能为 0

- A、急性胃肠炎
- B、上消化道穿孔
- C、肠梗阻
- D、肠系膜动脉血栓
- E、消化道溃疡

【答案】： B

2、下列不属于院前急救原则的是 0

- A、先施救后排险
- B、先重伤后轻伤
- C、先固定后搬运
- D、急救与呼救并重

【答案】： A

3、药品冰箱温度应维持在什么范围?0

- A、2-6℃
- B、2-8℃
- C、3-8℃
- D、4-6℃

【答案】： B

4、患者，男性，50 岁。因车祸致胸腹部剧痛 2 小时入院，查体：
BP80/48mmHg P120 次/分，脉搏细速，R30 次/分，氧饱和度 78%。神志清，左侧呼吸音消失。全腹肌

紧张，压痛、反跳痛明显，移动性浊音(4)，骨盆分离征(+)。拟为“多发伤 1 多发肋骨骨折，左侧血气胸；2 腹部闭合伤，肝破裂；3 骨盆骨折，后腹膜血肿”入院。患

者突然发生意识丧失，心率 150 次/分，血压 66/45mmHg，应立即 0

- A、加快输液
- B、留置深静脉，输血，准备手术
- C、立即转送急诊监护室
- D、床边手术
- E、留置尿管，记录进出量

【答案】： B

5、气管插管时看到的第一个标记物是 0

- A、声门
- B、会厌
- C、切牙
- D、悬雍垂

【答案】： D

6、补充液体

- B、治疗原发病
- C、改善通气
- D、使用激素
- E、提高吸氧浓度

【答案】： C

7、患者，男性，30 岁。 一小时前 5 米高处坠落，由同事送至医院，根据创伤机制

能量来源分类，海创伤能量成分为 0

- A、热力学能量
- B、电力学能量
- C、机械能量(

√)

D、化学能量

E、放射学能量

【答案】： C

8、糖尿病酮症酸中毒的表现错误的是 0

A、酮体生成过多

B、水肿

C、治疗前，血钾偏高或正常

D、携氧功能障碍

【答案】： B

9、开放性腹部损伤中，致伤物有入口、出口的是 0

A、贯通伤

B、盲管伤

C、挤压伤

D、穿透伤

E、扭挫伤

【答案】： B

10、血红蛋白低于或等于?时，应嘱患者卧床休息，活动时动作要缓慢，避免突然体

位改变()

A、30g/L

B、40g/L

C、60g/L

D、80g/L

E、100g/L

【答案】： C

11、随时有猝死危险的心律失常是 0

A、阵发性室性心动过速

B、阵发性室上性心动过速

C、工度房室传导阻滞

D、

度房室传导阻滞

E、室性期前收缩呈二联律

【答案】： A

12、对成人进行胸外心脏按压时，双手应该 0

A、双手掌根重叠

B、双手指重叠

C、掌心紧贴胸壁

D、手指紧贴胸壁

E、掌根压胸壁

【答案】： A

13、下列判断心肺复苏有效的指标中，应除外 0

A、瞳孔由大变小

B、每次按压可触及颈动脉搏动

C、出现周身毛孔收缩

D、出现睫毛反射

E、面色由发绀转为红润

【答案】： C

14、左心衰最严重的表现是 0

A、心悸、气短

B、咳嗽咳痰增多

C、肺水肿

D、夜间阵发性呼吸困难

E、心律失常

【答案】： C

15、艾滋病的主要传播途径是 0

- A、饮食传播
- B、母婴传播
- C、蚊虫叮咬
- D、血液传播
- E、性接触传播

【答案】： E

16、中年女性，45 岁。炎热夏天，天气闷热，在外面连续工作 5 小时，由于大量出汗

导致失水、失钠等引起的周围循环灌注不足属于 0

- A、热衰竭
- B、热射病
- C、热痉挛
- D、日射病

【答案】： A

17、急性肠梗阻易导致 0

- A、高血钙
- B、低血钙
- C、高血钾
- D、低血钾
- E、高渗性脱水

【答案】： D

18、高渗昏迷患者输液 4h 应输入总量的()

- A 、 1/3
- B、 1/2
- C 、 2/3
- D、 1/4
- E、 3/4

【答案】： A

19、有关骨折急救处理，下列哪项错误)

A、

首先应止血及包扎伤口

B、无夹板时，可用树枝、木棍(板)、步枪等作临时固定支架

C、可将伤员上肢缚于胸壁侧面，下肢两腿绑在一起固定

D、脊椎骨折患者不可采取手法复位

E、搬动脊椎骨折患者时，应采取一人抱肩，一人抬腿的方法

【答案】： E

20、电动吸引器吸痰每次插入导管吸引不超过 0

A、5s

B、10s

C、15s

D 、20s

E 、25s

【答案】： C

21、火灾急救处理“三防”是指 0

A、防休克、防中毒、防窒息

B、防窒息、防跳楼、防奔跑

C、防休克、防感染、防中毒

D、防休克、防窒息、防感染

【答案】： D

22、下列止血方法中，最后在万不得已的情况下选用的是 0

A、指压止血

B、加垫屈肢止血

C、填塞止血

D、止血带止血

E、穴道止血

【答案】： D

23、下列哪一项是多发伤的临床特点)

A、创伤后全身反应较轻，死亡率不高

B、较少发生休克

- C、低氧血症发生率高
- D、多发伤等同于多处伤
- E、不易发生漏诊和误诊

【答案】： C

24、气道异物梗阻患者胸部冲击法用力的部位在患者的 0

- A、胸骨上部
- B、胸骨中部
- C、胸骨下部
- D、剑突部

【答案】： B

25、哪一项是担架转送伤病员的护理要求 0

- A、不用顾忌体位
- B、满足患者一切需求
- C、不用病情观察
- D、一般侧卧位
- E、注意舒适护理

【答案】： E

26、用氧安全的重点是做好“四防”，其内容不包括 0

- A、防震
- B、防火
- C、防热
- D、防油
- E、防移动

【答案】： E

27、中度有机磷农药中毒病人的血胆碱酯酶活性为 0

- A、70%~50%
- B、50%~30%
- C、30%~29%
- D、<20%
- E、80%~70%

【答案】： B

28、患者，男性，55岁。参加2小时会议后，到洗手间返回会议室途中突然晕倒，

意识不清。如果有3人在现场，其最佳分工是)

A、1人拨打“120”电话，第2人按压人中，第3人高声呼喊患者

B、1人判断患者心搏骤停，第2人拨打“120”电话，第3人立即进行胸外按压

C、1人拨打“120”电话，第2人判断患者意识，第3人置患者于舒适体位

D、1人拨打“120”电话，第2人判断患者意识，第3人给患者人工呼吸

E、1人呼喊患者、判断呼吸和脉搏，第2人拨打“120”电话，第3人呼救

【答案】： B

29、有机磷农药吸收后浓度最高的脏器是 0

A、心

B、脑

C、肾

D、肝

E、肺

【答案】： D

30、患者，男性，49岁。冠心病史5年，以“胸闷、剧烈胸痛半小时，伴大汗”为

主诉来诊，进入抢救室后，心电监护示波显示 “RS

波群消失，代之以大小不等、形态各异的颤动波，频率为 300 次/分”。此时应立即采取的最恰当的急救措施是

)

- A、按压人中，同时立即给予气管插管
- B、应用单相波除颤器连续除颤 3 次
- C、应用双相波除颤器进行除颤，能量 150J
- D、立即给予气管插管，胸外按压
- E、立即建立静脉通路，给予肾上腺素 0.5~1mg 静脉注射

【答案】： C

31、一氧化碳中毒，最先受累的脏器是 0

- A、心脏
- B、骨骼肌
- C、胃肠道
- D、肾脏
- E、脑组织

【答案】： E

32、男，12 岁，因溺水出现心脏骤停，心电监护示一直线，有双人参与抢救，除如

下哪种抢救措施外，其余措施均可采取 0

- A、胸外按压
- B、人工呼吸
- C、电除颤
- D、心脏起搏

【答案】： D

33、女性，49 岁，多年胃溃疡，近 1 个月胃区疼痛，发病前饱食并饮酒，饭后 12 分钟

突然腹痛，剧如刀割，腹呈板状，来源急诊下一步简单有效的检查方法是 0

A、腹部 X 线检查

B、纤维胃镜

C、腹腔冲洗

D、磁共振

E、B 超

【答案】： A

34、抢救溺水病人的第一步是 0

- A、倒出呼吸道内及胃内的积水
- B、立即进行口对口人工呼吸
- C、胸外心脏
- D、迅速清除口鼻内泥沙污泥
- E、应用抗生素预防感染

【答案】： D

35、患者男性，46 岁。诊断为“上消化道出血”收住院，为明确出血原因，首选的
检查方法是)

- A、大便隐血试验
- B、X 线钡剂造影
- C、内镜检查
- D、血常规检查
- E、B 超检查

【答案】： C

36、在对未建立高级气道的心跳呼吸骤停患者进行 CR 时，应进行 0 次人工通气。

- A 、 1
- B 、 2
- C 、 3
- D、 4
- E 、 5

【答案】： B

37、休克时正确的补液原则是 0

- A、 补液“宁多勿少”
- B、需多少补多少
- C、补充丧失的部分液体和当天继续丧失的液体
- D、失多少补多少

E、如血压正常不必补液

【答案】： B

38、男性，50岁，车祸后6小时入院，神志淡漠，四肢冰冷，血压9.33/6.67KPa(70/50mmHg)诊断为0

- A、轻度低血容量性休克
- B、中度低血容量性休克
- C、重度低血容量性休克
- D、中度感染性休克
- E、重度感染性休克

【答案】： B

39、抢救触电病人应立即采取的措施是)

- A、切断电源
- B、处理电灼伤
- C、吸氧
- D、心肺复苏

【答案】： A

40、EC手法E的作用是0

- A、触摸颈动脉
- B、按压颈部
- C、固定面罩
- D、开放气道

【答案】： D

41、急救药品和各种抢救设备做到“五定”不包括0

- A、定点安置
- B、定人保管
- C、定期消毒灭菌
- D、定期检查维修
- E、定期使用

【答案】： E

42、有机磷农药中毒最早出现的临床表现是 0

- A、平滑肌痉挛和腺体分泌增加
- B、全身肌肉发生强直性痉挛
- C、头痛、头晕、乏力
- D、共济失调
- E、谵妄、意识障碍

【答案】： A

43、危重症患者家属最主要的心理需求为 0

- A、病情保障与获取信息
- B、照顾患者
- C、接近患者
- D、获得支持
- E、自身舒适

【答案】： A

44、现场急救电击伤最首要的措施是 0

- A、切断电源
- B、胸外心脏按压
- C、包扎创面
- D、预防感染
- E、TAT

【答案】： A

45、胸部多根多处肋骨骨折的治疗要点 0

- A、保持呼吸道通畅
- B、鼓励患者咳嗽排痰
- C、卧床休息
- D、给精神安慰
- E、制止胸壁的浮动，纠正呼吸障碍预防外伤性湿肺发生

【答案】： E

46、口服补液盐液体的张力为 0

- A、1/5 张
- B、1/4 张
- C、1/3 张
- D、1/2 张
- E、2/3 张

【答案】： E

47、无脉性心脏停跳息者两次心跳检查之间应 0

- A、先给预约 5 组(或者约 2 分钟)心肺复苏
- B、行 12 导心电图检查
- C、建立深静脉通道
- D、准备电除颤
- E、持续胸外心脏按压

【答案】： A

48、息者，男性，35 岁，车祸外伤后输入大量库存血后，出现心率缓慢、手足抽搐，

血压下降，伤口渗血，出现以上症状的有关因素是 0

- A、高血钾
- B、低血钾
- C、高血钙
- D、低血钙
- E、低血钠

【答案】： D

49、以下说法中哪一条可能不正确()

A、肺脏在正常时含有足够的氧，在呼吸停止后能防止严重的血氧不饱和达 30 秒

左右；

B、单纯施行胸外心脏按压的患者存活率明显高于未接受 CPR

者；

C、在 SCA 导致心搏骤停早期，即使不通气，单纯胸外心脏按压可能也足以维持机

体基本的通气要求；

D、双人实行 CPR 时，应按照 15:2 的按压通气比进行。

E、双人实行 CPR 时，应按照 30:2 的按压通气比进行。

【答案】： D

50、李先生，56 岁，因“右心表”来院急诊，在休息状态下也心悸、呼吸困难，请问

李先生现在的心功能分级为 0

A、1 级

B、I II 级

C、III级

D、IV 级

E、V 级

【答案】： D

51、一工厂突发火灾，数十伤员转运到急诊科，此时分诊护士的首要任务是 0

A、迅速检伤，按照病情危重程度分类

B、做好常规来诊患者的解释工作

C、发现危重患者立即投入抢救中

D、配合治疗区护士共同参与抢救

E、准备与来诊家属沟通

【答案】： A

52、心脏骤停首选的治疗措施是 0

A、心肺复苏

B、安置起搏器

C、开通静脉输液

D、通畅呼吸道

E、高浓度吸氧

【答案】： A

53、急性镇静安眠药中毒时，可选用)药物促进苏醒，同时还有拮抗呼吸抑制作用。

()

- A、美蓝
- B、VK1
- C、解碘定
- D、阿托品
- E、纳络酮

【答案】： E

54、患者，女，23岁。因路人发现晕倒在地而送来急诊，体检：神志恍惚，瞳孔缩小，呼出气无特殊气味，心率120次/分，律齐，BP90/60mmHg，上臂可见多处注射针眼、
该患者最有可能的诊断是 0

- A、有机磷中毒
- B、鸦片类中毒
- C、乙醇中毒
- D、口服地西泮中毒
- E、以上都不是

【答案】： B

55、纠正重症酸中毒时，根据二氧化碳结合力和FH值应给予 0

- A、甘露醇
- B、碳酸氢钠
- C、葡萄糖
- D、氯化钠
- E、转化糖

【答案】： B

56、高血压脑出血的主要发病机制是 0

- A、小动脉壁受损出血
- B、微动脉瘤的形成与破裂
- C、脑淀粉样血管病
- D、脑软化后出血
- E、脑动脉结构异常

【答案】： B

57、诊断心跳骤停的简捷依据是 0

- A、血压测不到
- B、神志突然消失
- C、呼吸突然停止
- D、大动脉搏动消失

【答案】： D

58、头颈部创伤的伤者开通气道的方法为 0

- A、仰头举颏法
- B、抬颌法
- C、仰头抬颈法
- D、压额抬颌法

【答案】： B

59、属于骨折早期并发症的是 0

- A、血管神经损伤
- B、关节僵硬
- C、创伤性关节炎
- D、缺血性肌挛缩
- E、延迟愈合

【答案】： A

60、在使用球囊-面罩通气时，可尽量减少空气进入患者胃内的做法是 0

- A、增加通气频率，减少通气量
- B、减少每分钟通气次数
- C、尽可能延长每次通气时间
- D、用尽全力给予最大量的通气
- E、通气量能使患者胸廓明显隆起即可

【答案】： E

61、成年人颅内压的正常值为 0

- A、70-200mmH₂O
- B、80-210mmH₂O
- C、90-190mmH₂O
- D、60-180mmHg
- E、70-150mmHg

【答案】： A

62、腹部检查下列哪项错误 0

- A、振水音见于幽门梗阻
- B、肋下扪及肝脏提示肝大
- C、脾脏正常时不能扪及
- D、肠鸣音消失可见于肠麻痹
- E、腹主动脉搏动正常人可触到

【答案】： B

63、患者，男性，52岁。因车祸致胸腹联合伤，左侧多发性肋骨骨折(连枷)伴大量血气胸；脾破裂伴腹腔内出血。神志清，BP75/46mmHg
R38次/分，心率126次/分，

律齐，医护人员到达现场后首先要对患者进行哪一项伤情评估 0

- A、意识状态
- B、气道和呼吸情况
- C、进行化验检查

D、 循环情况

E、 仔细的胸部检查

【答案】： B

64、非同步电复律用于治疗 0

- A、心室扑动
- B、室性心动过速
- C、心房扑动
- D、室上性心动过速
- E、心房颤动

【答案】： A

65、患者，女性，35 岁。因头部外伤报诊为”脑挫裂伤”急诊入院。接诊时发现， 患者神志不清，口鼻腔出血且分泌物多，口唇发绀，呼吸困难。该患者目前最确切的首要护理诊断是 0

- A、有窒息的危险
- B、气体交换受损
- C、有受伤的危险
- D、有感染的危险
- E、有脑疝的危险

【答案】： A

66、气管插管留置的时间一般最多为 ()h

- A、48
- B、12
- C、72
- D、24

【答案】： C

67、一男性患者，55 岁，来诊诊断为广泛前壁心肌梗死，突然发生抽搐，意识不清，血压测不到，心电监护导联呈形态、振幅各异的不规则波动，频率为 310 次/分， QRS 波群消失。应立即采取的最恰当的急救措施为)

A、按压人中，同时立即给予气管插管

B、应用单项波除颤器：连续除颤 3 次，能量 200J, 300J

和 360J

C、应用单项波除颤器：除颤 1 次，能量 360J

D、应打双项波除颤器：除颤 2 次，能量 150J

E、立即给了肾上腺素 1mg 静脉注射

【答案】： C

68、休克的临床表现有 0

A、脉搏细弱

B、大汗淋漓

C、口唇发绀

D、血压下降

E、以上都是

【答案】： E

69、现场急救中，口对口人工呼吸的吹气频率较适宜的是()

A、12~14 次/分

B、14~16 次/分

C、16~18 次/分

D、18~20 次/分

E、20~22 次/分

【答案】： B

70、急性 CO 中度中毒时，血液 HbCo 浓度为)

A、10-30%

B、30-50%

C、>50%

D、50-70%

E、70%以上

【答案】： B

71、以下均属于致命性心律失常，除外的是 0

A、心室扑动

B、室性心动过速

C、

心室颤动

D、心房颤动

E、心室率小于 45 次/分的心动过缓

【答案】： D

72、急性颅内压增高病人典型的生命体征表现是 0

A、脉快，呼吸急促

B、脉快，血压降低

C、脉快，血压高

D、脉慢，呼吸慢

E、脉慢，血压低

【答案】： D

73、患者有规律呼吸几次后，突然停止呼吸，间隔一个短时间后又开始呼吸，周而

复始。此种呼吸和呼吸暂停交替出现的现象称为 0

A、潮式呼吸(陈施呼吸)

B、深度呼吸(库斯莫呼吸)

C、叹息呼吸

D、间断呼吸(毕奥呼吸)

E、蝉鸣式呼吸

【答案】： D

74、患者，女性，58 岁，慢性支气管炎病史 10 年，慢阻肺病史 5 年。护士在夜间查房时发现患者剧烈咳嗽后突感上胸刺痛、胸闷、呼吸困难，不能平卧，查体：左侧 胸廓膨隆、呼吸运动减弱、叩诊呈鼓音，听诊左肺呼吸音明显减弱，应考虑为 0

A、肺梗死

B、急性心肌梗塞

C、自发性气胸

D、支气管哮喘

E、胸腔积液

【答案】： C

75、最简单、有效的临时止血方法为 0

- A、加压包扎止血法
- B、指压止血法
- C、屈肢加垫止血法
- D、填塞止血法

【答案】： A

76、对清除肠内毒物有积极意义的洗胃时限是 0

- A、食物中毒 3 小时内
- B、食物中毒 4 小时内
- C、食物中毒 6 小时内
- D、食物中毒 8 小时内
- E、食物中毒 10 小时内

【答案】： C

77、如果一次注入洗胃液过多会引起 0

- A、胃内压升高引起反射性心跳加快
- B、胃内压降低引起反射性心跳廉停
- G、胃内压升高毒物吸收增加
- D、胃内压降低毒物吸收增加

【答案】： C

78、关于损伤的现场急救，下列描述正确的是 0

- A、对休克息者首要措施是立即送医院抢救
- B、对于发现有心排骤停的伤员应首先将其移出现场，然后进行 COR
- C、作详细的全身检查
- D、尽快解决各种呼吸道阻塞，维持呼吸道通畅
- E、发现有活动性出血的伤口应现场进行清创术

【答案】： D

79、急性有机磷农药中毒出现肺水肿，首选的急救药物为 0

- A、马啡
- B、肾上腺素
- C、甘露醇
- D、阿托品

【答案】： D

80、遇到血氧饱和度监测故障时，首先应该 0

- A、检查血氧饱和度探头是否脱落
- B、用设备模拟血氧饱和度波形、脉搏的显示情况
- C、检查血氧饱和度导联线接头和机器的接口连接是否错位

【答案】： A

81、环状软骨弓上缘之间与颈部正中线交界处。环甲膜穿刺点是)

- A、甲状软骨下缘与环状软骨弓上缘之间与颈部正中线交界处。
- B、甲状软骨下缘与环状软骨弓上缘交界处。
- C、甲状软骨下缘与颈部正中线交界处。
- D、甲状软骨下缘与软骨弓上缘之间与颈部正中线交界处。
- E、环状软骨弓上缘之间与颈部正中线交界处。

【答案】： A

82、患者，男性，49 岁。既往有高血压、脑出血史，现脑出血术后 16 天出院，突发 高热，由家人送至急诊科。患者神志不清，在对患者进行气道及呼吸评估时，患者

突然面色青紫。如果你是分诊护士，首先要做的是 0

- A、立即将患者送入抢救室
- B、给予人工呼吸
- C、呼叫医生
- D、尽快结束初级评估
- E、测量血氧饱和度

【答案】： A

83、II型呼吸衰竭是指动脉血气显示 0

- A、仅有缺氧
- B、仅有二氧化碳潴留
- C、仅有二氧化碳降低
- D、既有缺氧，又有二氧化碳降低
- E、既有缺氧，又有二氧化碳潴留

【答案】： E

84、患者心脏骤停，开始抢救时间为心脏骤停 4-6 分钟进行，心肺复苏成功率是多少。()

- A、60%
- B、10%
- C、4%
- D、50%

【答案】： B

85、气道异物梗阻腹部冲击法用力的方向为 0

- A、向内向上
- B、向内向下
- C、向外向上
- D、向外向下

【答案】： A

86、严重创伤性休克后，首先应预防的是 0

- A、感染
- B、输血并发症
- C、急性心力衰竭
- D、肠麻痹
- E、急性呼吸窘迫综合征

【答案】： A

87、中毒时最首要的处理是 0

A、对症治疗

B、

使用抗生素

C、立即终止接触毒药

D、使用特效解毒药

E、清除进入人体的毒药

【答案】： C

88、急性有磷农药中毒机制是 0

A、抑制酶活性

B、缺氧

C、局部腐蚀刺激作用

D、竞争受体

E、麻醉作用

【答案】： A

89、男，50岁，高血压病多年，近日活动后出现呼吸困难伴左胸痛，

咳嗽频繁，咳

出为粉红色泡沫样血痰，可能疾病为 0

A、大叶性肺炎

B、急性左心衰

C、右心衰竭

D、支气管扩张

E、自发性气胸

【答案】： B

90、复苏应注意哪些并发症，不正确的是 0

A、脑功能衰竭

B、ARDS

C、肺部感染

D、应激性溃疡

E、血气胸

【答案】： A

91、关于心肺复苏，错误的是？0

A、频率 100-120 次/分

B、

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/868101030063006077>