

2021 医院感染试题库及答案

试题 1

消毒灭菌管理

一、正误判断题（错误者请改正）

1. 消毒是指清除或杀灭传播媒介上病原微生物使其达到无 害化处理。
理。
2. 进入人体无菌组织、器官、腔隙，或接触人体破损皮肤、破损黏膜、组织的诊疗器械、器具和物品应达到灭菌水平。
3. 使用中的消毒剂细菌含量，皮肤粘膜消毒剂 $<10\text{cfu/ml}$ 、其它消毒剂 $<100\text{cfu/ml}$ ，不得检出致病性微生物。
- 4•乙醇类消毒剂有效浓度为 75% ，用于皮肤粘膜消毒时，取 75% 乙醇（体积分数）擦拭消毒两遍，作用 3 分钟;用于浸泡消毒时作用至少 10 分钟以上。
5. 碘类消毒剂有效浓度 0.5% — 2% ，主要用于注射穿刺或 手术部位的皮肤消毒。
6. 戊二醛有效浓度 2% ，原则上仅于部分器械和内镜的消毒。
7. 含氯消毒剂根据物品种类和消毒要求不同， 采取相应的浓度与方法，常用的方法擦拭法和浸泡法，使用时须现配现用。
8. 医院引进和使用的一次性使用医疗用品和消毒药械， 须符合国家规定的准入要求、由医院统一招标、集中采购，在有效期内、标识齐全、包装合格，任何科室和个人不得私自采购。

9. 一次性使用医疗用品应存放于阴凉干燥、通风良好的货架上，距地面≥20CM，距墙壁≥5CM，距屋顶≥50CM。

10. 医务人员使用前应检查一次性医疗用品有效期和包装情况，使用中发生热原反应、感染或其他情况，应及时留样送检，详细记录并立即报告。

二、选择题

1. 手术器械、腹腔镜、膀胱镜、导尿管、口腔科牙钻、输液器械、输血器按医用物品的危险度应属于哪一类（）

A. 高度危险用品 B. 中度危险用品 C. 低危险用品 D. 一般医疗用品

2. 使用中消毒液浓度监测的频率：2%戊二醛和含氯消毒为（）。

A. 每日，每日 B. 每日，每周 C. 每周，每日 D. 每周，每周

3. 下列消毒剂中属于高水平消毒剂的有（）。

A. 戊二醛 B. 络合碘 C. 新洁尔灭 D. 乙醇 E. 碘酊

4. 手术器械、腹腔镜、膀胱镜、导尿管、口腔科牙钻、输液器械、输血器选择哪一水平的消毒灭菌方法（）

A. 灭菌 B. 高水平消毒 C. 中水平消毒 D. 低水平消毒

5. 使用化学消毒剂必须掌握的知识包括（）

A. 了解消毒剂的性能 B. 了解消毒剂的使用方法 C. 了解影响灭菌或消毒效果的因素等 D. 配制时注意有效浓度 E. 按规定定期监测

参考答案：

判断题 1-10 全对。

选择题 1. A 2. C 3. A 4. A 5. ABCDE

医务人员手卫生

一、 判断题（错误者请改正）

1. 卫生手消毒是指医务人员用速干手消毒剂搓揉双手，以减少手部暂居菌的过程。
2. 当手部无血液或其他体液等肉眼可见的污染时，可使用速干手消毒剂消毒替代洗手。
3. 不同患者手术之间、手套破损或手被污染时，不仅需换手套还应进行手卫生。
4. 卫生洗手的主要作用，就是去除手部皮肤活动污垢、碎屑和部分致病菌。
5. 外科手消毒的目的在于清除或者杀灭手部暂居菌和减少常居菌。

二、 选择题

1. 医务人员直接为传染病患者进行检查、治疗、护理后，或接触患者血液、体液和分泌物以及被传染性致病微生物污染的物品后，应（）
A. 先洗手，然后进行卫生手消毒 B. 用肥皂（皂液）和流动水洗手
C. 进行卫生手消毒
2. 医务人员在何种情况下应进行手卫生？（）

A 接触患者前后 B 接触患者分泌物后 C 接触患者使用的物品后 D
处理清洁物品前 E 脱手套后

3. 卫生手消毒后，细菌菌落数合格标准：（）

A. $\leq 5\text{cfu/cm}^2$ B. $\leq 10\text{cfu/cm}^2$ C.

$\leq 15\text{cfu/cm}^2$ D. $<$

200cfu/cm^2

4. 外科手消毒后，细菌菌落数合格标准：（）

A. $<5\text{cfu/cm}^2$ B. $<10\text{cfu/cm}^2$ C. $<15\text{cfu/cm}^2$ D. $<$

200cfu/cm^2

5. 接触患者之前，手部没有肉眼可见的污染时，医务人员应：

（）

A、使用速干手消毒剂消毒双手。

B、必须用肥皂（皂液）和流动水洗手

C、先用肥皂（皂液）和流动水洗手，再用速干手消毒剂消毒
双手。

6. 关于手卫生的作用，包括（）。

A、预防患者发生医院感染 B、阻断微生物在不同患者之间的交叉传染

C、预防潜在病原体对医院环境的污染

D、帮助医务人员预防职业性感染疾病，如 HCV 和 HIV 等。

E、以上都是。

7. 医务人员在直接接触患者前后、对患者实施诊疗护理操作 前后、接触患者体液或者分泌物后、摘掉手套后、接触患者使用

过的物品后以及从患者的污染部位转到清洁部位实施操作时 ()

A 不用实施手卫生 B 都应当实施手卫生 C 没必要实施手卫生 D 以上都不对

8•世界卫生组织提出的世界手卫生日为每年的 () 。

A 10 月 5 日 B 10 月 15 日 C 5 月 5 日 D 5 月 15 日

9. 有关手卫生，说法错误的是 () 。

A 手卫生控制医院感染最简单、最有效、最方便、最经济的方法。

B 外科手消毒是外科手术前医务人员用肥皂 (皂液) 和流动水洗手，再用手消毒剂清除或者杀灭手部暂居菌和减少常居菌的过程。

C 手卫生过程中六步搓揉法认真揉搓双手至少 15 秒。

D 洗手的最主要的目的是保护医务人员自身不受病原微生物的污染。

10. 关于皮肤暂居菌的描述正确的是 () 。

A 机械清洗容易被去除。

B 通过直接接触病人或被污染的环境表面获得。

C 存活时间较短，会自行消亡。

D 具有致病性，与医院感染有很大关系。

E 不具有致病性，与医院感染没有很大关系。

11. 医务人员手卫生指征描述不正确的是 ? ()

A 给病人做查体前不需进行手卫生

- B 从同一病人身体污染部位移动到清洁部位时不需进行手 卫生
- C 从同一病人身体清洁部位移动到污染部位时不需进行手 卫生
- D 接触病人用品后不需进行手卫生
- E 给病人鼻饲前不需进行手卫生

12. 有关手卫生下列说法正确的（ ）。

- A 手部有血液或其他体液等肉眼可见的污染时，应洗手。
- B 若手部没有肉眼可见污染时宜使用速干手消毒剂消毒双 手代替洗手。
- C 接触患者的血液、体液和分泌物后， 应先洗手，然后卫
生手消毒。
- D 直接为传染病患者进行检查、治疗、护理或处理传染患 者污物
之后，应先洗手，然后卫生手消毒。
- E 接触患者的体液以及被传染性致病微生物污染的物品后 洗手就
可以了。

13. 关于手卫生设施的配备正确的是（ ）。

- A 手卫生设施的设置应方便医务人员的使用。用于洗手与 手消毒
的设施包括洗手池、 水龙头、流动水、清洁剂、干手用品、 手消毒剂
等。
- B 重点部门应当采用非手触式水龙头。
- C 应尽量使用皂液洗手，重复使用的盛装皂液的容器应每周

清洁与消毒。

D 配备干手物品或者设施，避免造成二次污染。

E 科室内可以设公用擦手毛巾方便医务人员。

14. 关于戴手套的描述正确的是 ()。

A 进行侵入性操作时戴手套前应进行手卫生。

B 进行侵入性操作时应当戴无菌手套。

C 摘手套后应当洗手。

D 戴手套能代替洗手。

E 若不是无菌操作不同病人之间可以不换手套。

15. 外科手消毒应遵循的原则，以下错误的是 ()。

A 不用洗手，消毒手就行。

B 不同患者手术之间，不需进行洗手，仅需手消毒。

C 手套破损或手被污染时，不需要洗手，不需手消毒，仅换手套。

D 不同患者手术之间、手套破损或手被污染时，应重新进行 外科
洗手与手消毒。

E 外科手消毒应遵循先洗手，后消毒原则。

参考答案：

选择题：1-5 全正确。

选择题：1. A 2. ABCDE 3. B 4. A 5. A 6. E 7. B 8. C 9. D

10. ABD 11. ABDE

12. ABCD 13. ABCD 14. ABC 15. ABC

职业安全防护与职业暴露处置

一、判断题

1. 血源性病原体是指存在于血液和某些体液中能引起人体疾病的病原微生物，例如乙型肝炎病毒（HBV）、丙型肝炎病毒（HCV）和艾滋病病毒（HIV）、梅毒螺旋体等。
2. 安全注射就是不伤及注射执行者和注射接受者，也不对社会造成危害的注射。
3. 职业暴露就是易感工作人员在未实施相应有效预防措施的情况下接触传染（暴露）源。
4. PEP 是指在接触可能感染血源性病原体的血液或其他体液之后，应立即采取的一整套预防控制措施，包括应急处理、对接触源的评价、对接触者的评价和接触后的预防措施、咨询与随访等。
5. 标准预防是基于认为患者的血液、体液、排泄物中含有感染因子，接触患者这些物质要采取隔离防护措施，既防止患者将病原体传播给医务人员，也防止医务人员将病原体传播给患者的理念，针对医院所有患者和医务人员采取的一组预防感染措施。
6. 职业安全防护就是医务人员在执业过程中，采取各种防护措施，避免直接接触有害物质和或血源性病原体，免受其损害或侵入机体，维护健康的活动，其核心是标准预防。
7. 个人防护用品是指用于保护医务人员避免接触感染性因子的各种屏障用品，包括口罩、手套、护目镜、防护面罩、防水

围裙、隔离衣、防护服等。

8. 锐器伤的.处置流程一般包括：近心端侧挤压伤口排除污血、流动水冲洗，用 0.5% 碘伏或 70% 酒精消毒伤口（包或不包 扎伤口）、填写职业暴露报告表上报有关职能部门，以及对暴露 源和暴露者评估、检测与预防用药和随访观察等。

9. 标准预防是针对医院所有患者和医务人员采取的一组预防感染措施。包括手卫生，根据预期可能的暴露选用手套、隔离 衣、口罩、护目镜或防护面屏，以及安全注射。也包括穿戴合适 的防护用品处理患者环境中污染的物品与医疗器械。

10. 医务人员工作期间应严格遵循标准预防原则和无菌操作规程，认真执行《医务人员手卫生规范》，正确使用防护用品。

二、选择题

1. 标准预防是针对医院所有患者和医务人员采取的一组预防感染措施。包括()

- A. 手卫生
- B. 个人防护用品的使用
- C. 安全注射
- D. 穿戴 PPE 正确处理患者环境中污染的物品与医疗器械
- E. 感染性废物规范处理

2. 下列哪些情况应使用护目镜或防护面罩 ：()

A. 在进行诊疗、护理操作，可能发生患者血液、体液、分泌物等喷溅时。

B. 近距离接触经飞沫传播的传染病患者时。

C. 为呼吸道传染病患者进行气管切开、气管插管等近距离操作，可能发生患者血液、体液、分泌物喷溅时，应使用全面型防护面罩。

D. 在治疗室加药时 E. 铺无菌治疗盘时

3. 关于安全注射论述正确的是()

A. 安全注射不伤及接受者和提供者，也不对社会构成危害

B. 注射前 30 分钟应停止室内清扫活动，避免不必要的人员走动。

C. 严格执行“一人一针一管一用”原则要求。

D. 盛装皮肤消毒非一次性使用的消毒剂容器应密闭保存，每周更换两次。

E. 抽出的药液放置时间超过 24 小时不得使用。

4. 戴医用防护口罩的注意事项是什么？()

A. 不应一只手提鼻夹。

B. 医用外科口罩只能一次性使用。

C. 口罩潮湿后应及时更换。

D. 每次佩戴医用防护口罩进入工作区域前应检查其密合性。

E. 口罩受到患者血液、体液污染后，应及时更换。

5. 医务人员的隔离防护措施包括()

A. 接触隔离患者的血液、体液、分泌物、排泄物等物质时，应戴手套。

B. 离开隔离病室前，接触污染物品后应摘除手套，洗手和 / 或手消毒。

C. 手上有伤口时应戴双层手套。

D. 进入隔离病室，从事可能污染工作服的操作时， 应穿隔离衣。

E. 一次性隔离衣用后按医疗废物管理要求进行处置。

参考答案

判断题：1 — 10 全对

选择题；1. ABCD 2. ABC 3. ABCD 4. ABCDE 5. ABCDE

一次性使用医疗用品管理

判断题

1. 使用的一次性使用医疗用品和消毒药械， 须符合国家规定的准入要求、集中采购，质量合格、标识齐全、包装合格、在有效期内。

2. 一次性使用医疗用品的存放要求：存放于阴凉干燥、通风良好的货架上，距地面》20CM ，距墙壁》5CM ，距屋顶》50CM 。

3•科室领回的一次性使用医疗用品应存放于医疗用品存放 柜内，其存放柜内外环境应清洁、阴凉干燥，通风良好 ；受条件限制时，可以分类分柜或分类分层相对定位存放。

4. 一次性医疗用品使用前，应检查有效期和包装情况，使用 中发生热原反应、感染等情况，应及时留样送检并立即报告。

5. 一次性使用医疗用品严禁重复使用，使用后的应按《医疗

卫生机构医疗废物管理办法》进行处理。

6•科室领取的一次性医疗用品入库临时存放，为方便摆放，应拆除中包装保持最小包装。

7.进入治疗室备用的一次性使用医疗用品应达到最小包装，应用量及时补充。

1-5、7, 对。6 错。

MDRO 感染防控管理

一、判断题

1. 多重耐药菌（MDRO）主要是指对临床使用的3类或3类以上抗菌药物同时呈现耐药的细菌。

2. 细菌对抗菌药物产生耐药性是因可以产生药物灭活酶或钝化酶。

3. 关于隔离标志的姿色，黄色为空气传播隔离，粉色为飞沫传播隔离，蓝色为接触传播隔离。

4. 对感染或携带MDR/PDR-PA或MDR/PDR-AB的病人，医疗器械、设备应该专用或一用一消毒。

5. 医务人员对患者实施诊疗护理操作时，应当将高度疑似或确诊为多重耐药菌感染患者或定植患者安排在最后进行。

6. 提倡使用或更改抗菌药物前应采集标本作病原学检查，接受抗菌药物治疗的住院病人病原学检查送检率不低于30%。

7. 不同种类的感染性疾病患者应分室安置；每间病室不应超过4人，病床间距应不少于1.1m。

8. 多重耐药菌感染
患者在转送检查或转科前，应先通知检查
科室或转入科室医务人员采取防护措施。

9•隔离的实施应遵循标准预防和基于疾病传播途径的预防 的原则。

10. 多重耐药菌感染患者对不能专用的担架、轮椅和床旁心电图机等医疗器械、器具，应每次使用后进行擦拭消毒。

二、选择题

1. 下列不属于多重耐药菌的是()

- A. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA)
- B. 耐万古霉素肠球菌(VRE)
- C. 产超广谱 B⁻内酰胺酶 (ESBLs)
- D. 沙门氏菌

2•隔离病室应有隔离标志，空气传播、飞沫传播、接触传播的隔离标志分别为()

- A. 粉色、黄色、蓝色 B. 粉色、蓝色、黄色
- C. 黄色、粉色、蓝色 D. 蓝色、粉色、黄色

3. 下列哪项不是控制 MRSA 的主要措施()。

- A. 严格手卫生 B. 隔离 MRSA 携带者
- C. 戴手套 D. 穿鞋套

4. 常见的多重耐药菌主要包括：（）

A. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA） B. VRE C. CRE D. 产
ESBLs 菌 E. 以上均是

5. 预防控制多重耐药菌感染的主要措施：（）

- A. 手卫生与无菌技术操作管理 B. 实施隔离防护措施
C. 认真落实环境和设备的清洁消毒 D. 合理应用抗菌药物 E.

以上均是

6. 关于多重耐药菌感染患者隔离措施描述不正确的是：（）

- A. 尽量选择单间隔离 B. 首选将同类多重耐药菌感染或定植

的患者安置在同一房间

- C. 多重耐药菌感染或定植患者转仍之前应当通知接诊的科室，采取相应的隔离措施 D. 没有条件实施单间隔离时，可以进行床旁隔离。

7. 多重耐药菌感染感染的危险因素主要包括：（）

- A. 老年 B. 免疫功能低下 C. 接受各种侵入性操作如导尿 D.

多次或长期住院

- E. 近期(90天内)接受3种或以上抗菌药物 F. 既往有多重耐药菌感染或定植史

- G. 以上全是

8. 多重耐药菌医院感染的主要危害：（）

- A. 延长住院时间 B. 增加医疗费用 C. 死亡率提升 D. 抗菌药物不良反应风险增多

- E. 以上都是。

9. 对感染或携带 MRSA 或泛耐药鲍曼不动杆菌的病人，医

疗器械、设备应该专用或：（）

A. 一用一消毒 B. 每天消毒两次 C. 每两天消毒 D. 每周消毒

10. 关于 MDRO 监测与防护论述，不正确的是：()

A. 常用的监测指标包括 MDRO 感染/定植现患率、发病率 等

B. 对检出的 MDRO 应区分是感染、污染或定植

C. 无论是感染、污染或定植，均须采取隔离防护措施

D. 污染或定植的 MDRO 患者可不必采取隔离防护措施 医院感染

暴发报告与处置

一、判断题

1. 医院感染暴发是指医疗机构或其科室的患者中， 短时间内发生 3 例以上同种同源感染病例的现象。

2. 疑似医院感染暴发是指在医疗机构或其科室的患者中， 短时间内出现 3 例以上临床症候群相似、怀疑有共同感染源的感染 病例；或者 3 例以上怀疑有共同感染源或感染途径的感染病例现 象。

3. 发现 5 例以上疑似医院感染暴发或 3 例以上医院感染暴 发，应于 12 小时内报告辖区县级卫生行政主管部门和疾病预防 控制中心。

4. 发生 10 例以上的医院感染暴发； 或发生特殊病原体或新 发病原体的医院感染； 可能造成重大公共影响或者严重后果的医 院感染时，应按照国家《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工 作规范(试行)》要求，应在 2 小时内报告辖区县级卫生行政主管

部门和疾病预防控制中心。

二、选择题

1. 医院发生以下哪些情形时，需要 2 小时内上报县级卫生行政主管部门和疾控部门()

- A. 发生新发病原体的医院感染
- B. 发生 10 例以上医院感染暴发
- C. 发生肺炭疽医院感染病例
- D. 发生可能造成重大公共影响或者严重后果的医院感染

2. 医院发生以下哪些情形时，需要 12 小时内上报县级卫生行政主管部门和疾控部门()

- A. 发生 5 例疑似医院感染暴发或 3 例以上医院感染暴发。
- B. 发生 10 例以上医院感染暴发。
- C. 发生肺炭疽医院感染病例。
- D. 发生可能造成重大公共影响或者严重后果的医院感染。

3. 关于医院感染暴发报告与处置表述正确的是 ()

- A. 医院发生医院感染暴发时，应及时采取有效处置措施，控制感染源，切断传播途径，实施医疗救治。
- B. 医院感染暴发报告范围，包括医院感染暴发和疑似医院感染暴发。
- C. 医院法人代表为医院感染暴发报告管理第一责任人。

D. 发生特殊病原体的医院感染，应在 2 小时内上报所在地县级卫生行政部门和疾控中心

试题 2

单项选择

1、 传染性非典型肺炎列入 《传染病防治法》法定管理的（B） 传染病

A 甲类 B 乙类 C 丙类 D 未分类

2、 在我国最常见的艾滋病传播途径是 （B）

A 性传播 B 静脉吸毒 C 输血 D 母婴传播

3、 有关部门、医疗卫生机构应当对传染病做到 （ABCD） ，
切断传播途径，防止扩散。

A 早发现 B 早报告 C 早隔离 D 早治疗 E 早转运

4、 国家对传染病防治的方针是 （D） 。

A 预防为主 B 防治结合、分类管理 C 依靠科学、依靠群众 D 以上

三项

5、 《中华人民共和国传染病防治法》规定的法定管理的传 染病
有多少种？（C）

A35B28C38D40

6、 拒绝隔离治疗或者隔离期未满擅自脱离隔离治疗的，可 以由
公安部门协助治疗单位采取 （D） 。

A 处罚措施 B 强制措施 C 行政拘留 D 强制隔离治疗措施

7、 有关重大传染病的概念不包括 （B）

A 甲类传染病 B 乙类传染病 C 罕见的或已消灭的传染病 D

新出现传染病的疑似病例

8、 医疗机构应当实行传染病(B)制度，对传染病病人或者疑似传染病病人，应当引导至相对隔离的分诊点进行初诊。

A 隔离、消毒 B 预检、分诊 C 分类、隔离 D 定点、隔离

9、 《消毒管理办法》自何时实施？(B)

A2002 年 1 月 1 日起实施 B2002 年 7 月 1 日起施行 C2002

年 9 月 1 日起实施 D2003 年 1 月 1 日起实施

10、 医疗卫生机构使用的进入人体组织或无菌器官的医疗用品必须达到什么要求？(A)

A 灭菌要求 B 消毒要求 C 清洁要求 D 卫生要求

11、 凡是医疗卫生机构使用的接触皮肤、粘膜的器械和用品必须达到什么要求？(B)

A 无菌要求 B 消毒要求 C 清洁要求 D 卫生要求

12、 《消毒管理办法》规定，医疗卫生机构使用后的一次性医疗用品如何处理。(C)

A 消毒后放入垃圾中倒掉 B 卖给回收单位或个人 C 应当及时进行无害化处理 D 毁形后卖掉

13、 《消毒管理办法》规定，运送传染病病人及其污染物品的车辆、工具应如何处理？(A)

A 必须随时进行消毒处理 B 必须进行消毒处理 C 必须随时进行清洁处理 D 必须随时进行灭菌处理

14、 《消毒管理办法》规定，各种注射、穿刺、采血器具 的使

用要求是什么?(B)

A 用后灭菌 B 应当一人一用一灭菌 C 当一人一用一消毒 D 应当一人一用一换针头

15、 以下(C)不属于物理消毒法。

A 煮沸 B 高压蒸气 C 优氯净 D 紫外线

16、 甲型流感是由什么引起的(B):

A 冠状病毒 B 一种新的甲型病毒 C 猪链球菌 D 一种甲型病毒

17、 转诊传染病病人或疑似传染病病人时，应当按照当地卫生行政部门的规定使(A)

A 专用车 B 救护车 C 面包车 D 大卡车

18、 关于处理高危物品和中危物品灭菌灭活方法正确的有(D)

A134℃ 138℃ 8min B134℃ 138℃ 18min

C134℃ 138℃ 38min D 浸泡于 1mol/L 氢氧化钠溶液作用 1h，再 121℃ 60min

二、多项选择题

1、 下列哪些疾病是甲类传染病(AD)

A 鼠疫 B 传染性非典型肺炎 C 炭疽中的肺炭疽 D 霍乱 E 人感染高致病性禽流感

2、 乙型肝炎的传播途径有(ABC)

A 医源性传播 B 性接触传播 C 母婴垂直传播 D 经媒介生物传播 E 一般接触传播

3、 已知引起手足口病的最常见肠道病毒包括下列哪些 (AD)

A 肠道病毒 71 型(EV71)B 柯萨奇病毒 B 组的 16 型 (CoxB16)

C 肠道病毒 78 型(EV78)D 柯萨奇病毒 A 组的 16 型 (CoxA16)E 肠道病毒 171 型(EV171)

4、 下列可以灭活肠道病毒的有(CDE)

A75% 酒精 B 植物消毒剂 C 紫外线及干燥敏感 D 过氧乙酸

E 碘酒

5、 下列可用于结核分枝杆菌消毒的消毒剂有 (ACE)

A 碘伏 B 醋酸氯己定 D 苯扎氯铵 E 过氧乙酸

6、 构成传染病的流行过程，必须具备的三个环节是(ACD) O

A 传染源 B 自然环境 C 传播途径 D 易感人群 E 社会环境

7、 对呼吸道等特殊传染病病人或者疑似病人，医疗机构应当依法采取(ABCDE)

A 隔离 B 控制传播 C 对病人的陪同人员和其他密切接触人员采取医学观察

D 其他必要的预防措施 E 对粪便进行无害化处理

8、 引起手足口病的肠道病毒可经胃肠道传播，也可经呼吸道传播，即可通过以下途径等造成传播。 (ABCDE)

A 粪-口 B 飞沫、咳嗽、打喷嚏等 C 接触患者口鼻分泌物、 皮肤或粘膜疱疹液

D 被污染的手及物品 E 以上都对

9、手足口病的传染源是（AB）

A 隐性感染者 B 患者 C 动物 D 食物 E 水

三、判断题

1、对乙类传染病中的传染性非典型肺炎，炭疽中的肺炭疽 和人感染高致病性禽流感需要采取甲类传染病的预防，控制措施。（V）

2、 性传播是世界范围内艾滋病主要传播途径之一。（V）

3、通过吸入被甲型流感病毒污染的空气和接触被甲型流感 病毒污染的物品、器具感染。（V）

4、甲型流感纳入《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病，并采取甲类传染病的预防、控制措施。（X）

5、在突发事件中需要接受隔离治疗、 医学观察措施的病人、 疑似病人和传染病病人密切接触者， 应当配合卫生部门或者有关 机构采取医学措施。（V）

6、传染病暴发、流行时，国务院卫生行政部门和省级政府卫生行政部门负责向社会公布传染病疫情信息。（V）

7、保护性隔离措施：是指为预防高度易感病人受到来自其 他病人、医务人员、探视者及病区环境中各种致病微生物的感染， 而采取的隔离措施。（V）

8、消毒是指杀灭或清除传播媒介物上一切微生物，使其达 到无活微生物存在的过程。（X）

9、灭菌是指杀灭或清除传播媒介物上的病原微生物，使其

达到无害化的过程。(X)

10、医务人员在诊疗、护理每一位病例后，均应认真洗手或对双手消毒，或更换使用一次性手套。(V)

11、对传染病菌种、毒种和传染病检测样本的采集、保藏、携带、运输和使用可不实行分类管理，建立健全严格的管理制度。

(X)

12、任何单位和个人发现传染病病人或者疑似传染病病人时，应当及时向附近的疾病预防控制机构或者医疗机构报告。(V)

四、简答题

1、 医疗机构发现甲类传染病时，应当及时采取哪些措施？

答：应当及时采取下列措施：

(1)对病人、病原携带者，予以隔离治疗，隔离期限根据医学检查结果确定。

(2)对疑似病人，确诊前在指定场所单独隔离治疗。

(3)对医疗机构内的病人、病原携带者、疑似病人的密切接触者，在指定场所进行医学观察和采取其他必要的预防措施。拒绝隔离治疗或者隔离期未满擅自脱离隔离治疗的，可以由公安机关协助医疗机构采取强制隔离治疗措施。

2、 新发现的传染病包括哪些？

答：(1)过去早已存在的疾病，但当时未认识是传染病，现今才确定为传染病。如消化性溃疡、胃炎、胃淋巴瘤由幽门螺杆菌引起。

(2) 早已知道为传染病，当时未发现其病原体，近年由于诊断技术提高发现其相应病原体。如丙肝、戊肝、流行性出血热。

(3) 过去确实不存在、新近才出现的如艾滋病 (AIDS)

(4) 已知传染病的病原体，由于变异出现新症状或症状加重及病原学诊断发生变化，如霍乱弧菌 0139、SARS、禽流感

试题 3

一、单项选择题(共 6 题)

1、 接触传染病患者后刷洗双手，正确的顺序是 (A)

A 前臂，腕部，手背，手掌，手指，指缝，指甲

B 手指，指缝，手背，手掌，腕部，前臂，

C 前臂，腕部，指甲，指缝，手背，手掌

D 手掌，腕部，手指，前臂，指甲，指缝

2、 护生，赵某，在进行戴无菌手套的练习，老师应给予纠正的操作是(C)

A 戴手套前先洗手、戴口罩和工作帽

B 核对标签上的手套号码和灭菌日期

C 戴上手套的右手持另一手套的内面戴上左手

D 戴上手套的双手置腰部水平以上

3、 可通过直接接触患者或被污染的物体表面时获得，随时通过手传播，与医院感染密切相关的是。 (A)

A 暂居菌

B 常驻菌

C 病毒

D 支原体

4、控制医院感染最简单、最有效、最方便、最经济的方法是：（C）

A 环境消毒

B 合理使用抗菌素

C 洗手

D 隔离传染病人

5、手消毒效果应达到的要求：卫生手消毒监测的细菌数应（A）

A $\leq 10\text{cfu/cm}^2$

B $\leq 5\text{cfu/cm}^2$

C $\leq 15\text{cfu/cm}^2$

D $\leq 8\text{cfu/cm}^2$

6、手消毒效果应达到的要求：外科手消毒监测的细菌数应（B）

A $\leq 10\text{cfu/cm}^2$

B $< 5\text{cfu/cm}^2$

C $< 15\text{cfu/cm}^2$

D $< 8\text{cfu/cm}^2$

二、多项选择（共 10 题）

1、关于皮肤暂居菌的描述正确的是 (ABCD)

- A 机械清洗容易被去除
- B 通过直接接触病人或被污染的环境表面获得
- C 存活时间较短，会自行消亡
- D 具有致病性，与医院感染有很大关系
- E 不具有致病性，与医院感染没有很大关系

2、下列哪些情况医务人员应认真洗手（ABCDE）

- A 接触病人前后
- B 进行无菌操作前后
- C 进行介入治疗前后
- D 进入或离开隔离病房、ICU、母婴室、新生儿病房、烧伤病房、感染性疾病病房等重点部门
- E 戴口罩和穿脱隔离衣前后

3、手卫生包括(ABC)

- A 洗手
- B 卫生手消毒
- C 外科手消毒
- D 消毒剂泡手
- E 手消毒剂使用

4、手消毒指征(ABCE)

- A 进入和离开隔离病房、穿脱隔离衣前后
- B 接触特殊感染病原体后

C 接触血液、体液和被污染的物品后

D 接触消毒物品后

E 无菌操作前

5、 关于手卫生设施的配备正确的是 （ABCE）

A 水池应方便医务人员使用，重点部门应当采用非手触式水龙头
开关

B 尽量使用皂液洗手，使用的固体肥皂应保持干燥

C 干手物品或者设施应当避免造成二次污染

D 科室内可以设公用擦手毛巾方便医务人员

E 科室内擦手毛巾应一人一巾

6、 关于戴手套的描述正确的是 （ABC）

A 进行侵入性操作时应当戴无菌手套

B 戴手套前应当洗手

C 摘手套后应当洗手

D 若不是无菌操作不同病人之间可以不换手套

E 戴手套前不用洗手

7、 医务人员在下列哪些情况下应当洗手 ？ （ABDE）

A 直接接触病人前后

B 接触特殊易感病人前

C 从同一病人身体一个部位移动到另一部位时

D 接触不同病人之间

E 摘手套后

8、关于六步洗手法正确的描述是 (BCD)

- A 流动水洗手时可采用
- B 洗手的每步顺序不必有先后
- C 认真揉搓双手至少 15 秒
- D 应注意清洗指背、指尖和指缝
- E 洗手的每步顺序必须有先后

9、 什么情况下必须先用流动水冲净双手，然后再使用手消毒剂消毒双手？

(ABC)

- A 手被感染性物质污染时
- B 处理传染病病人污染物之后
- C 直接为传染病病人进行检查、治疗、护理时
- D 为病人进行身体检查前
- E 接触特殊易感病人前

10、 医务人员在下列哪些情况下必须洗手 ？ (ABCDE)

- A 穿脱隔离衣前后
- B 处理清洁、无菌物品之前，处理污染物品之后
- C 进行无菌操作前后
- D 当医务人员的手被病人的血液、体液污染
- E 戴口罩和穿脱隔离衣前后

三、填空题(共 28 题)

1、医务人员用速干手消毒剂揉搓双手，以减少手部暂居菌 的过

程,称卫生手消毒。2、手卫生为医务人员洗手、卫生手消毒

和外科手消毒的总称。

3、 卫生手消毒 为医务人员用速干手消毒剂揉搓双手， 以减少手部暂居菌的过程。

4、 暂居菌寄居在皮肤表层，常规洗手容易被清除的微生物。 直接接触患者或被

污染的物体表面时可获得， 可随时通过手传播， 与医院感染 密切相关。

5、 免冲洗手消毒剂主要用于外科手消毒，消毒后不需用水 冲洗的手消毒剂。包

括水剂、凝胶和泡沫型。

6、 医疗机构应制定并落实手卫生管理制度，配备有效、便捷的手卫生设施。

7、 医疗机构应定期开展手卫生的全员培训，医务人员应掌握手卫生知识和正确的手卫生方法，保障洗手与手消毒的效果。

8、 医疗机构应加强对医务人员手卫生工作的指导与监督， 提高医务人员手卫生的依从性。

9、 手消毒效果应达到如下相应要求：

a) 卫生手消毒，监测的细菌菌落总数应 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$ 。

b) 外科手消毒，监测的细菌菌落总数应 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$ 。

10、 手术室、产房、导管室、层流洁净病房、骨髓移植病房、器官移植病房、重症监护病房、新生儿室、母婴室、血液透析病房、烧

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/875012323301011300>