北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科试题预测》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：女孩，9岁，外伤致肱骨中下1/3骨折，来院检查时发现有垂腕，垂指畸形。该患儿选择哪种治疗方法痛苦小且稳妥（　）。A.立即切开复位，内固定，同时探查并修复受损神经

B.骨牵引治疗

C.手法复位，夹板固定

D.手法复位，石膏管型固定

E.手法复位，悬垂石膏固定并观察2个月，若无恢复，再行手术治疗

2、单项选择题：下述关于发育性髋关节脱位的症状和体征，不正确的是（　）。A.Trendelenburg试验在婴幼儿往往阳性

B.Ortolani试验常被用作3周以内患儿的检查

C.股三角空虚会阴部增宽

D.Allis征只适用于单侧发病

E.双侧髋脱位时呈摇摆步态

3、单项选择题：诊断骨髓瘤时，下列哪项是错误的（　）。A.尿中本周（Bence-Jones）蛋白阳性，血沉高达100mm/h

B.常为多发性，偶见单发，多出现病理骨折

C.X线片示圆形凿型溶骨性缺损，周围无反应性新骨

D.多见于青少年

E.骨髓穿刺可确定诊断

4、单项选择题：下列哪项不是矫正6岁以内先天性马蹄内翻足的手术（　）。A.跖腱膜切断术

B.跟腱延长术

C.踝关节融合术

D.足内侧痉挛组织松解术

E.肌腱移位术

5、单项选择题：男性患者，20岁，半年前曾患左股骨急性化脓性骨髓炎，经治疗后好转，但局部有窦道形成，常有少许稀黄色脓汁流出，近4日窦道口闭合，但出现高热，局部压痛明显，并有红肿，X线片示有死骨存留，而且包壳形成充分，应立即（　）。A.瘘道切除，一期缝合

B.骨钻孔手术

C.死骨摘除，植骨术

D.切开引流

E.窦道搔刮术

6、单项选择题：女性，3岁，半小时前下车时不慎滑倒，其母用力提拉该女孩左手，随后患儿哭闹，左手拒拿食物及玩具。体查：左肘外侧有轻度压痛，未见畸形及肿胀，X线摄片未发现阳性征象。该患儿最可能的诊断为（　）。A.肱骨髁上骨折

B.桡骨小头半脱位

C.肱骨髁间骨折

D.肘关节扭伤

E.肘部肌肉肌腱损伤

7、单项选择题：骨盆骨折由于解剖位置的关系，易于出现并发伤，以下描述错误的是（　）。A.骨盆壁与多处静脉丛相邻，骨折后可伴有这些静脉的出血

B.骶管内为马尾，骶骨骨折可损伤骶神经

C.坐骨神经从闭孔穿出时，可因耻骨骨折而伤及

D.坐骨支骨折可刺破直肠形成开放骨折

E.后尿道损伤多为耻骨骨折引起

8、单项选择题：女性，12岁，背痛伴低热8个月。体格检查：轻度贫血，胸腰部后凸畸形，有压痛，拾物试验（+）。首选检查是（　）。A.血沉

B.碱性磷酸酶

C.摄胸腰段X线片

D.血常规

E.类风湿因子

9、单项选择题：膝关节处于半屈曲位，伤力来自胫骨上段前方，可造成（　）。A.膝关节内侧副韧带损伤

B.膝关节外侧副韧带损伤

C.膝关节前交叉韧带损伤

D.膝关节后交叉韧带损伤

E.膝关节半月板损伤

10、单项选择题：在下列各项中，哪项不是骨折切开复位的指征（　）。A.骨折合并血管、神经损伤，需手术探查

B.骨折断端有软组织嵌入，手法整复失败

C.关节内的骨折，关节面移位超过2㎜

D.通过手法整复，仍不能达到解剖复位

E.多处骨折，为减少并发症

11、单项选择题：早期诊断化脓性关节炎，最有确诊价值的检查是（　）。A.X线照片

B.血沉

C.血培养

D.血细胞计数及分类

E.关节穿刺及关节液检查

12、单项选择题：”浮髌征”阳性，见于膝关节（　）。A.少量积液

B.中等量积液

C.大量积液

D.滑膜增生

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/875130314023011201