

2024 年广西壮族自治区马山县《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题王牌题库含答案（轻巧夺冠）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下列药物属于肾素抑制剂的是()

- A: 硝苯地平
- B: 普萘洛尔
- C: 卡托普利
- D: 阿利克仑

答案：D

2. 在动物骨髓造血组织中含量较多，有促进白细胞增生及抗放射线作用的是

- A: 丙酸诺龙
- B: 小檗胺
- C: 维生素 B4
- D: 鲨肝醇

答案：D

3. 患者。女,43 岁,左乳浸润性导管癌术后放、化疗 3 年后复发左肺门、左锁骨上、左腋窝淋巴结转移现采用卡培他滨+多西他赛行复发后第一周期化疗化疗后第 2 日,患者出现重度恶心、呕吐,根据化疗药物致吐分级,宜选用的对症治疗药物是 ()

- A: 昂丹司琼
- B: 地塞米松

C: 甲氧氯普胺

D: 奥美拉唑

答案: A

4. 促进微管的装配，抑制其解聚

A: 他莫昔芬

B: 羟喜树碱

C: 长春碱

D: 紫杉醇

答案: D

5. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。

医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次/日。

A: 甲氧氯普胺

B: 胰酶

C: 多潘立酮

D: 莫沙必利

答案: B

6. 临床常用于治疗结核病的药物是

A: 链霉素

B: 甲硝唑

C: 两性霉素 B

D: 阿奇霉素

答案: A

7. 5-羟色胺再摄取抑制剂与单胺氧化酶制剂合用，出现不安、肌阵挛、多汗、震颤、腹泻、高热、抽搐和精神错乱等不良反应，严重者可导致死亡的现象称为

- A: 锥体外系反应
- B: 5-HT 综合征
- C: 戒断反应
- D: “宿醉”现象

答案：B

8. 四环素联用红霉素使

- A: 调整抗凝血药的剂量
- B: 口服吸收减少
- C: 增加麦角中毒的风险
- D: 肝毒性增加

答案：D

9. 关于聚乙二醇 4000 治疗便秘的说法，错误的是

- A: 疗程不宜过长
- B: 作用机制为刺激肠道分泌，增加粪便含水量以软化粪便
- C: 肠梗阻患者禁用
- D: 适用人群为成人及 8 岁以上儿童

答案：B

10. 复方氨基酸注射液（6AA）与等量 10%葡萄糖注射液稀释后缓慢静脉滴注，滴速为

- A: 不超过 15 滴 / 分
- B: 不超过 40 滴 / 分

C: 滴速 20~30 滴 / 分

D: 滴速 80~100 滴 / 分

答案: B

11. 下列保肝药中属于必需磷脂类的是

A: 复方甘草酸苷

B: 联苯双酯

C: 多烯磷脂酰胆碱

D: 甘草酸二铵

答案: C

12. 判断华法林维持量是否足够，需观察的时间是

A: 5~7 日

B: 12~15 日

C: 2~3 日

D: 8~10 日

答案: A

13. 氯霉素的抗菌作用机制是

A: 抑制二氢叶酸合成酶，影响叶酸的合成

B: 改变细菌胞浆膜通透性，使重要的营养物质外漏

C: 与细菌核糖体 50S 亚基结合，抑制肽酰基转移酶的活性，从而阻止肽链延伸，是蛋白质合成受阻

D: 阻止氨基酰-tRNA 与细菌核糖体 30S 亚基结合，影响蛋白质的合成

答案: C

14. 对革兰阳性菌、革兰阴性菌、厌氧菌等的作用均很强的头孢类药物是

- A: 第二代头孢菌素
- B: 第四代头孢菌素
- C: 第三代头孢菌素
- D: 第一代头孢菌素

答案：B

15. 与顺铂联合应用可致严重肾毒性的药物是

- A: 阿糖胞苷
- B: 氟尿嘧啶
- C: 甲氨蝶呤
- D: 利妥昔单抗

答案：D

16. 对 G

- A: 第一代头孢菌素
- B: 第四代头孢菌素
- C: 第三代头孢菌素
- D: 第二代头孢菌素

答案：A

17. 对 α 受体和 β 受体均有强大的激动作用的是

- A: 多巴胺
- B: 肾上腺素
- C: 可乐定
- D: 去甲肾上腺素

答案：B

18. 使用强心苷的心力衰竭患者，不宜选用的药品是

- A: 氯化钙
- B: 果糖
- C: 硫酸镁
- D: 氯化钾

答案：A

19. 可引起肺间质纤维化的抗心律失常药物是()

- A: 美托洛尔
- B: 地尔硫
- C: 胺碘酮
- D: 维拉帕米

答案：C

20. 可以降低血尿酸水平，但升高尿尿酸水平而导致肾结石的抗痛风药是

- A: 别嘌醇
- B: 秋水仙碱
- C: 呋塞米
- D: 丙磺舒

答案：D

21. 在体内主要经 CYP3A4 代谢的质子泵抑制剂是

- A: 兰索拉唑
- B: 米索前列醇
- C: 枸橼酸铋钾
- D: 铝碳酸镁

答案：A

22. (2016 年真题) 那于 GLP-1 受体激动剂的是

- A: 艾塞那肽
- B: 二甲双胍
- C: 那格列奈
- D: 阿卡波糖

答案: A

23. 氟尿嘧啶的前体药物，对结肠和直肠癌疗效较高

- A: 羟喜树碱
- B: 卡莫氟
- C: 来曲唑
- D: 甲氨蝶呤

答案: B

24. (2021 年真题) 患者，女，27 岁，孕 34 周。诊断为轻度便秘，宜选用的药物是 ()

- A: 蓖麻油
- B: 乳果糖
- C: 普芦卡必利
- D: 硫酸镁

答案: B

25. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、茶碱治疗。

- A: 依诺沙星可抑制茶碱代谢
- B: 左氧氟沙星与茶碱相互作用较小
- C: 可使用大环内酯类药物如红霉素
- D: 可使用头孢类口服剂型，与氨茶碱无明显药物相互作用

答案：C

26. 属于超短效胰岛素/胰岛素类似物的是

- A: 甘精胰岛素
- B: 门冬胰岛素
- C: 普通胰岛素
- D: 精蛋白锌胰岛素

答案：B

27. 外用的增色素药分为 4 类，不包括

- A: 肾上腺皮质激素类
- B: 补骨脂素及其衍生物
- C: 重金属元素及其化合物
- D: 煤焦油类

答案：D

28. 考来替泊的降脂作用机制主要是

- A: 增加脂蛋白酶活性
- B: 阻滞胆汁酸在肠道的重吸收
- C: 抑制脂肪分解
- D: 抑制细胞对 LDL 的修饰

答案：B

29. 临床上用于治疗躁狂症的是

- A: 苯妥英钠
- B: 卡巴西平
- C: 硫酸镁
- D: 苯巴比妥

答案：B

30. 外科皮肤伤口或肢体溃疡的局部治疗宜选用

- A: 阿霉素
- B: 聚甲酚磺醛
- C: 地屈孕酮
- D: 环磷酰胺

答案：B

31. 可升高红细胞，用于肾性或非肾性贫血的药品是（）。

- A: 维生素 B
- B: 人血白蛋白
- C: 硫酸亚铁
- D: 重组人促红素

答案：D

32. 噻嗪类利尿药略增加 HCO_3^- 的排泄，是因为其可以抑制

- A: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子
- B: 磷酸二酯酶
- C: Na^+-Cl^- 共转运子
- D: 碳酸酐酶

答案：D

33. （2019 年真题）用于治疗水肿性疾病，当起始治疗剂量未达到满意的治疗效果时，可追加剂量，每日最大剂量可达 600mg，但一般应控制在 100mg 以内的利尿剂是（）

- A: 呋塞米
- B: 托拉塞米

C: 依他尼酸

D: 布美他尼

答案: A

34. 患者，女，24 岁，妊娠 2 个月，因肺炎住院治疗，应禁用的抗菌药物是

A: 头孢哌酮

B: 阿莫西林

C: 环丙沙星

D: 青霉素 G

答案: C

35. 患儿，男，7 岁。长期偏食。近 1 个月面色渐苍白，自诉全身无力。体检：肝肋下 4cm，脾肋下 1cm。血常规：Hb70g / L，RBC 3.0×10^{12} / L，Ret2. 0%，WBC、Plt 均正常，MCV74fl，MCH26pg，MCHC30%，考虑为缺铁性贫血。

A: 网织红细胞计数

B: 血清铁蛋白

C: 血小板数量

D: 血红蛋白测定

答案: C

36. 下述不属于抗病毒药物禁忌证的是()

A: 糖尿病、高血压患者禁用

B: 严重中性粒细胞减少者禁用更昔洛韦

C: 相应药物过敏者禁用

D: 妊娠期妇女禁用利巴韦林

答案: A

37. (2016 年真题) 患者，男，56 岁。有高血压病史 4 年。体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。监测他汀类药所致肌毒性的临床指标是

- A: 尿淀粉酶
- B: 肌酸激酶
- C: 碱性磷酸酶
- D: 乳酸脱氢酶

答案：B

38. 地高辛的中毒血清浓度为 ()

- A: >50ng/ml
- B: >5ng/ml
- C: >20ng/ml
- D: >2ng/ml

答案：D

39. 丙烯胺类抗真菌药 ()

- A: 氟康唑
- B: 阿莫罗芬
- C: 两性霉素
- D: 特比萘芬

答案：D

40. 属于抗雌激素类的是

- A: 甲地孕酮
- B: 己烯雌酚
- C: 他莫昔芬

D: 睾酮

答案: C

41. 米诺环素属于

A: 氨基糖苷类

B: 酰胺醇类

C: β -内酰胺类

D: 四环素类

答案: D

42. 适宜餐前整片(粒)吞服，不可咀嚼或压碎的抑酸剂是()。

A: 乳酸菌素

B: 前列地尔

C: 泮托拉唑

D: 雷尼替丁

答案: C

43. 可用于治疗绦虫感染的药物是

A: 林旦

B: 氯硝柳胺

C: 联苯

D: 甲硝唑

答案: B

44. 下述药物中不可用于治疗疥疮的是()

A: 过氧苯甲酰

B: 硫黄软膏

C: 林旦霜

D: 苯甲酸苄酯

答案：A

45. 氯霉素属于

A: 氨基糖苷类

B: 酰胺醇类

C: β -内酰胺类

D: 四环素类

答案：B

46. (2018 年真题) 不属于减鼻充血药的是 ()

A: 伪麻黄碱

B: 色甘酸钠

C: 羟甲唑啉

D: 麻黄碱

答案：B

47. 患儿，女，8 岁。长期发热，伴有精神不振、头痛、胸闷气短等症状，诊断为草绿色链球菌引起的心内膜炎。

A: 四环素

B: 头孢菌素类

C: 喹诺酮类

D: 氨基糖苷类

答案：D

48. 预防急性肾功能衰竭可选用

A: 乙酰唑胺

B: 氢氯噻嗪

C: 螺内酯

D: 呋塞米

答案：D

49. 作用于 DNA 拓扑异构酶 II 的抗肿瘤药物是

A: 紫杉醇

B: 顺铂

C: 依托泊苷

D: 来曲唑

答案：C

50. (2020 年真题) 替罗非班的作用机制是

A: 阻断血小板糖蛋白 IIb/IIIa 受体

B: 抑制凝血因子 X

C: 拮抗维生素 K

D: 抑制凝血酶

答案：A

51. 作用较慢，首日剂量可增加至常规剂量 2~3 倍的利尿药物是

A: 乙酰唑胺

B: 氢氯噻嗪

C: 呋塞米

D: 螺内酯

答案：D

52. 可引起女性男性化、男性乳房胀痛的是

A: 非那雄胺

B: 普适泰

C: 十一酸睾酮

D: 哌唑嗪

答案: C

53. 为避免继发真菌感染，使用后应立即漱口的药物是

A: 羧甲司坦口服液

B: 沙丁胺醇气雾剂

C: 布地奈德福莫特罗吸入剂

D: 孟鲁司特片

答案: C

54. 用药过程中需要监护甲状腺功能的是()

A: 硝普钠

B: 氯沙坦

C: 哌唑嗪

D: 胺碘酮

答案: D

55. (2018 年真题) 不能用于曲霉菌感染的抗真菌药是 ()

A: 两性霉素 B

B: 卡泊芬净

C: 伏立康唑

D: 氟康唑

答案: D

56. 最常见不良反应为干咳，严重不良反应为血管神经性水肿的是

A: 氨氯地平

B: 卡托普利

C: 地高辛

D: 哌唑嗪

答案: B

57. 头孢拉定()

A: 肾毒性大

B: 口服，肌肉注射或静脉注射均可用于全身感染

C: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染

D: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

答案: A

58. 可能导致牙龈出血的药物是

A: 拉西地平

B: 依诺肝素

C: 普伐他汀

D: 普萘洛尔

答案: B

59. 主要抑制排卵的长效口服避孕药是

A: 庚酸炔诺酮

B: 丙酸睾丸素

C: 炔诺酮

D: 苯丙酸诺龙

答案: A

60. 属于雌激素类退乳药的是()

A: 睾酮

B: 他莫昔芬

C: 己烯雌酚

D: 甲羟孕酮

答案: C

61. 大剂量糖皮质激素冲击疗法用于()

A: 抑制器官移植急性排斥危象

B: 湿疹

C: 变态反应性疾病

D: 肾病综合征

答案: A

62. 可使双膦酸盐的吸收下降，服用双膦酸盐后 2 小时内避免食用的是

A: 高钙食品

B: 萘普生

C: 沙利度胺

D: 抗血管生成药

答案: A

63. 用于治疗急、慢性支气管炎及各种刺激引起的刺激性干咳。片剂一次 20~40mg，一日 3 次的药物是

A: 苯丙哌林

B: 地塞米松

C: 可待因

D: 右美沙芬

答案: A

64. 沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下, 请结合问题作答。

。

- A: 患者，男，47 岁，诊断为高血压，生活方式干预无效，随机血压 155/95mmHg
- B: 患者，男，47 岁，慢性心力衰竭，LVEF=35%，血压 120/65mmHg
- C: 患者，男，47 岁，诊断为难治性高血压，使用依那普利、氯氯噻嗪、氨氯地平治疗仍未达标
- D: 患者，男，47 岁，慢性心力衰竭伴高钾血症（血 K⁺5

答案：B

65. 属于胆固醇吸收抑制剂的是（）。

- A: 阿昔莫司
- B: 依折麦布
- C: 非诺贝特
- D: 阿托伐他汀

答案：B

66. 连续使用应间隔 4h 以上，这种药物是

- A: 酚甘油滴耳液
- B: 羟甲唑啉滴鼻液
- C: 赛洛唑啉滴鼻液
- D: 麻黄碱滴鼻液

答案：D

67. 属于嘌呤核苷合成酶抑制剂的是

- A: 长春瑞滨
- B: 甲氨蝶呤
- C: 巯嘌呤
- D: 吉西他滨

答案：C

68. 物质代谢过程中催化"一碳单位"转移反应的辅酶组成成分是

- A: 叶酸
- B: 维生素 A
- C: 维生素 B
- D: 维生素

答案：A

69. (2019 年真题) 易产生耐药性，极少单独用药，临床常与两性霉素 B 合用的抗真菌药物是 ()

- A: 氟康唑
- B: 特比萘芬
- C: 卡泊芬净
- D: 氟胞嘧啶

答案：D

70. 对急需抗凝处理的患者，以下哪种方案最优 ()

- A: 华法林
- B: 肝素
- C: 华法林+低分子量肝素
- D: 低分子量肝素

答案：C

71. 一 60 岁男性患者呈典型的“面具脸”、“慌张步态”及“小字症”表现，确诊为帕金森症，但患者同时又患有青光眼，所以该患者不要

- A: 培高利特
- B: 左旋多巴

C: 溴隐亭

D: 卡比多巴

答案: C

72. 干扰肿瘤细胞转录过程和阻止 RNA 合成的抗肿瘤药是

A: 博来霉素

B: 多柔比星

C: 紫杉醇

D: 氟胞嘧啶

答案: B

73. 下述药物中不属于消毒防腐药的是

A: 戊二醛

B: 过氧乙酸

C: 氨茶碱

D: 硼酸

答案: C

74. 肝素的抗凝作用特点是()

A: 体内、外均有效

B: 仅在体内有效

C: 必须有维生素 K 辅助

D: 作用缓慢

答案: A

75. 乙胺丁醇的抗结核杆菌作用原理是

A: 抑制蛋白质合成

B: 与锌离子络合、影响戊糖代谢

C: 抑制 RNA 多聚酶

D: 抑制分枝菌酸合成

答案：B

76. 多柔比星与 β 受体阻滞药合用，可能()

A: 增加心脏毒性

B: 易产生沉淀

C: 导致坏死性结肠炎

D: 增加肝毒性

答案：A

77. 属于 5-HT₅ 受体阻断剂的止吐药是()。

A: 托烷司琼

B: 阿瑞吡坦

C: 维生素 B

D: 甲氧氯普胺

答案：A

78. 门冬酰胺酶能抑制蛋白质的合成，使细胞停止于()，从而降低其对甲氨蝶呤的敏感性，限制甲氨蝶呤的骨髓毒性

A: G

B: G

C: M 期

D: G

答案：D

79. 某患者因疾病在夜间有咳嗽症状，该患者可选择的药物是

A: 可待因

- B: 右美沙芬
- C: 喷托维林
- D: 苯丙哌林

答案：B

80. 氢氯噻嗪降血压的作用机制主要是

- A: 抑制醛固酮分泌
- B: 排钠，使细胞内 Na
- C: 降低血浆肾素活性
- D: 排钠利尿，造成体内 Na

答案：B

81. 口服难吸收，用于治疗溃疡性结肠炎的药物()

- A: 磺胺嘧啶
- B: 磺胺米隆
- C: 磺胺甲噁唑
- D: 柳氮磺吡啶

答案：D

82. 以下属于胰高糖素样肽-1 受体激动剂的是

- A: 利拉鲁肽
- B: 吡格列酮
- C: 瑞格列奈
- D: 二甲双胍

答案：A

83. (2019 年真题) β -内酰胺酶抑制剂的抑酶活性由强到弱的顺序是
()

- A: 他唑巴坦>舒巴坦>克拉维酸
- B: 他唑巴坦>克拉维酸>舒巴坦
- C: 舒巴坦>他唑巴坦>克拉维酸
- D: 舒巴坦>克拉维酸>他唑巴坦

答案：B

84.（2017 年真题）易发生超敏反应，用药前常规给予地塞米松、苯海拉明和西咪替丁肿瘤病是（）

- A: 注射用柔红霉素
- B: 紫杉醇注射液
- C: 注射用硫酸长春新碱
- D: 注射用盐酸博来霉素

答案：B

85.（2015 年真题）属于润滑性泻药的是（）。

- A: 聚乙二醇 4000
- B: 甘油（开塞露）
- C: 酚酞
- D: 乳果糖

答案：B

86.（2018 年真题）具有长效、平稳、血药浓度无峰值特点的胰岛素/胰岛素类似物是（）

- A: 精蛋白锌胰岛素注射液
- B: 预混胰岛素注射液
- C: 甘精胰岛素注射液
- D: 普通胰岛素注射液

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/875212212122012033>