

2024 年广西壮族自治区七星区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题王牌题库【】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 热应激时液体丢失所致的以有效循环血容量不足为特征的临床综合征是

- A: 热衰竭
- B: 热射病
- C: 休克
- D: 热痉挛

答案：A

2. 属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的是

- A: 吗氯贝胺
- B: 文拉法辛
- C: 阿米替林
- D: 氟西汀

答案：D

3. （2015 年真题）患者，男，64 岁，身高 174cm，体重 92kg。既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，临床处方，阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

- A: 阿司匹林肠溶片
- B: 曲美他嗪片

C: 氨氯地平片

D: 特拉唑嗪片

答案: D

4. 患者，女，35 岁，临床诊断为高甘油三酯血症，用非诺贝特微粒型胶囊调节血脂治疗，下列给药正确的用法与用量为

A: 0.2gqd

B: 0.5gtid

C: 0.5gqd

D: 0.1gtid

答案: A

5. (2019 年真题) 患者，女，56 岁，身高 156cm，体重 61kg。空腹血糖 7.8mmol/L，餐后血糖 11.2mmol/L，糖化血红蛋白 6.7%。

A: 阿卡波糖片

B: 瑞格列奈片

C: 格列美脲片

D: 二甲双胍片

答案: C

6. (2016 年真题) 患者，女，55 岁，诊断为类风湿性关节炎，既往有十二指肠溃疡病史。医生给予甲氨蝶呤+柳氮磺吡啶治疗。甲氨蝶呤用法用量正确的是 ()。

A: 7.5mg tid

B: 7.5mg qw

C: 7.5mg qod

D: 75mg qd

答案: B

7.（2018 年真题）举重运动员使用后，可短时间内急速降低体重，因此需按兴奋剂管理的药物是（）

- A: 呋塞米
- B: 硝苯地平
- C: 普萘洛尔
- D: 缬沙坦

答案：A

8. 格列齐特片的适宜服药时间是

- A: 餐中
- B: 餐后
- C: 清晨
- D: 餐前

答案：D

9. 可用红霉素的敏感性预测自身敏感性的药物是

- A: 头孢洛林
- B: 阿莫西林
- C: 替考拉宁
- D: 克拉霉素

答案：D

10. 用药错误定义为药物在临床使用全过程中出现的、任何可以防范的用药不当。临床用药的过程一般是指开写处方、转抄医嘱、药师调剂发药、护士或患者给药以及监测用药结果等。

- A: 药品位置凌乱
- B: 患者自行选购药品

C: 药品包装外观相似

D: 新手值班

答案: C

11. 患者，男，40 岁，体重 70kg，因咳痰伴发热入院，诊断为肺炎，欲给予左氧氟沙星片实施治疗。该药说明书提示：肌酐清除率低于 50ml / min 时需要调整给药方案。该患者入院时行肾功能检查：血肌酐 (Cr) 130 μ mol / L。医师给出的治疗方案是

A: 经验剂量的 1 / 2

B: 延长给药间隔时间

C: 经验剂量的 3 / 4

D: 不需要调整给药方案

答案: D

12. 下列关于烫伤救治措施的说法，正确的是

A: 烫伤患者的镇痛、镇静药物首选氯丙嗪

B: 创面及时外涂甲紫溶液预防感染

C: 可用清洁塑料薄膜覆盖创面，以防创面感染

D: I 度烫伤可冷敷后外涂烧伤膏

答案: D

13. 就餐前 15~30 分钟给药的是

A: 胰岛素

B: 阿卡波糖

C: 瑞格列奈

D: 二甲双胍

答案: A

14. 患者，女，46 岁，高血压病史 3 年，2 年前出现关节晨僵、手关节及膝关节疼痛，诊断为类风湿关节炎。半年前症状加重，采用了联合用药方案：患者用药如下：

- A：羟氯喹片
- B：双氯芬酸钠缓释片
- C：甲氨蝶呤片
- D：氨氯地平片

答案：A

15. 用质量调整生命年或伤残调整生命年为衡量指标，分析患者生活质量的提升与医疗成本的关系。该药物经济学评价方法是

- A：成本-效益分析
- B：最小成本分析
- C：成本-效果分析
- D：成本-效用分析

答案：D

16. 患者，女，30 岁。患先兆子痫，以硫酸镁治疗，适宜的给药途径是

- A：静脉注射
- B：直肠给药
- C：口服给药
- D：吸入给药

答案：A

17. 钙制剂+维生素 D+双膦酸盐用于治疗

- A：妇女绝经后骨质疏松症
- B：原发性骨质疏松症
- C：老年性骨质疏松症

D: 抗癫痫药所致的骨质疏松症

答案：C

18. 妊娠期妇女不宜选用药物是

A: 青霉素

B: 氯化钾

C: 维生素 A

D: 华法林

答案：D

19. 高血压合并心力衰竭者慎用下列哪种药物

A: 氢氯噻嗪

B: 哌唑嗪

C: 普萘洛尔

D: 卡托普利

答案：C

20. 美金刚的作用机制为

A: 抑制胆碱酯酶

B: 脑循环改善剂

C: 钙离子拮抗剂

D: 抑制 N-甲基天冬氨酸受体

答案：B

21. 以下中毒病例中，临床应用特殊试剂能够明确诊断的是

A: 苯巴比妥

B: 奋乃静

C: 丙咪嗪

D: 硝西泮

答案: D

22. 患者，女，16 岁，近两日因排尿困难就医。经医生询问，患者有尿急、尿频、尿痛、排尿不适、下腹痛等症状，且尿液比平时浑浊且有异味，医生测量体温为 37.4℃，确诊为尿路感染。

A: 青霉素

B: 复方磺胺甲噁唑

C: 氨苄西林

D: 头孢噻肟

答案: A

23. 预激综合征伴房颤患者，控制心室率时须慎用的药物为

A: 胺碘酮

B: 利伐沙班

C: 硝苯地平

D: 去乙酰毛花苷

答案: D

24. 患者，男，32 岁，患有肠易激综合征（IBS），常排便较急，一般每日 3~5 次，可有黏液，但无脓血，近期服用吗氯贝胺控制抑郁症。针对该患者，不宜使用的 IBS 治疗药物是

A: 山莨菪碱

B: 利福昔明

C: 地芬诺酯

D: 蒙脱石散

答案: C

25. 常用抗消化性溃疡药的合理应用餐后服用吸收缓慢，可于早、晚餐前及睡前服用的是（）

- A: 吉法酯
- B: 质子泵抑制剂
- C: 瑞巴派特
- D: 替普瑞酮

答案：C

26. 在医生的指导下使用已证明对胚胎与胎儿无害的药物，即

- A: 可用可不用的药物应尽量不用或少用
- B: 用药必须有明确的指征和适应证
- C: 选用对胎儿危害较小的药物
- D: 禁止用试验性药

答案：B

27. 患者，男，54 岁，患冠心病 3 年，长期服用阿司匹林。近几天肢体多处出现瘀斑，故前来就诊。实验室检查：PLT $70 \times 10^9/L$ 。下列药物中不会引起血小板减少的药物是

- A: 碳酸锂
- B: 氯霉素
- C: 噻氯匹定
- D: 阿司匹林

答案：A

28. （2019 年真题）湿疹患者的实验室检查结果常会出现

- A: 淋巴细胞减少
- B: 淋巴细胞增多
- C: 中性粒细胞减少

D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：D

29. 患者,男,21 岁因过敏性鼻炎就诊。关于过敏性鼻炎药物治疗及用药教育的说法,错误的是()

A: 治疗过敏性鼻炎使用口服糖皮质激素,首选地塞米松

B: 过敏性鼻炎患者应尽量避免接触已知的过敏原

C: 过敏性鼻炎的典型症状和感冒症状相似,应注意鉴别

D: 治疗过敏性鼻炎可局部使用糖皮质激素鼻喷剂

答案：A

30. 患者,男,43 岁,患有家族性痛风,既往有磺胺类药物过敏史患者在服药 7 天后,疼痛症状完全缓解。为了保证患者能够规律治疗,药师在回访后推荐患者在此次痛风急性发作 2 周后应开始服用的药物是

A: 碳酸氢钠

B: 对乙酰氨基酚

C: 丙磺舒

D: 别嘌醇

答案：D

31. 白天咳嗽宜选用的药品是

A: 羧甲司坦

B: 苯丙哌林

C: 可待因

D: 右美沙芬

答案：B

32. 通过抑制磷酸二酯酶，升高 cAMP 水平，加强心肌收缩力的非苷类药物是

- A: 洋地黄毒苷
- B: 米力农
- C: 地高辛
- D: 卡维地洛

答案：B

33. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件。处方按其性质分为法定处方和医师处方。《处方管理办法》还将处方分为麻醉药品处方、急诊处方、儿科处方、普通处方等。印刷用纸根据实际需要颜色区分，并在处方右上角以文字注明。

- A: 淡橙色
- B: 淡绿色
- C: 淡黄色
- D: 淡红色

答案：C

34. (2017 年真题) 缺铁性贫血患者常表现为 ()

- A: 血红蛋白减少
- B: 嗜酸性粒细胞增多
- C: 中性粒细胞增多
- D: 红细胞增多

答案：A

35. 属于核苷酸类 HIV 逆转录酶抑制剂的是

- A: 恩夫韦替
- B: 扎西他滨

C: 沙奎那韦

D: 奈韦拉平

答案: B

36. 复发

A: 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次（同一菌株），尿细菌数 $>105\text{cfu/ml}$

B: 宜选用毒性小的抗菌药物

C: 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药 6 周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同

D: 治疗后症状消失，尿菌阴转后在 6 周内再次出现菌尿，菌种与上次相同

答案: D

37. 多黏菌素可能引起

A: 尿液隐血

B: 尿胆红素

C: 尿葡萄糖

D: 尿蛋白

答案: D

38. 下列确诊医院获得性肺炎的最重要的依据是

A: $\text{WBC}>10\times 10^9/\text{L}$ 或 $<4\times 10^9/\text{L}$

B: 脓性气道分泌物

C: 肺部 X 线检查有新发或进展性浸润阴影

D: 发热 $>38^\circ\text{C}$

答案: C

39. 患者，男，65 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次，阿卡波糖 0.1g. 一日 3 次。罗格列酮 4mg，一日一次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级，轻度肾功能不全，长期服用贝那普利、阿司匹林。

- A: 阿司匹林
- B: 二甲双胍
- C: 阿卡波糖
- D: 罗格列酮

答案：D

40. 常见老年人 ADR 的药物类别，普萘洛尔致心动过缓、心脏停搏、诱发哮喘，加重心衰

- A: β 受体阻断剂
- B: 抗胆碱药
- C: 钙通道阻滞剂
- D: 抗生素

答案：A

41. 有关免疫抑制剂与药物、食物同服的影响，说法错误的有

- A: 与氟康唑同服，他克莫司血药浓度升高
- B: 与葡萄柚汁同服，西罗莫司血药浓度降低
- C: 与抑酸剂合用，吗替麦考酚酯血药浓度降低
- D: 与葡萄柚汁同服，环孢素血药浓度升高

答案：B

42. 患儿，女，5 岁，误服香豆素灭鼠药，可选用的解救药物是（）

- A: 维生素 K
- B: 亚甲蓝

C: 二巯丙醇

D: 纳洛酮

答案: A

43. (2019 年真题) 患者, 女, 69 岁, 体型偏胖, BMI30.1, 主诉夜间咳嗽、咽部有异物感, 平躺时常有反酸、烧心、胸痛伴背痛, 自用止咳糖浆无效。查体: 咽红, 听诊双肺未闻及干湿性啰音, 偶有哮鸣音。既往史: 高血压病史 12 年, 服用氨氯地平片 5mgqd, 血压控制在 140/85mmHg 左右, 高脂血症 10 年, 服用阿托伐他汀钙片 20mgqd。

A: 支气管哮喘

B: 心绞痛

C: 胃溃疡

D: 胃食管反流病

答案: D

44. (2018 年真题) 患者, 男, 59 岁, 高血压病史 5 年, 因头痛伴有恶心、呕吐就诊, MRI 检查结果显示蛛网膜下腔出血。为防治脑血管痉挛, 早期宜选用的药物 ()

A: 尼莫地平

B: 氨氯地平

C: 硝苯地平

D: 缬沙坦

答案: A

45. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热 (39.1°C)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查， $T38.8^{\circ}\text{C}$ ，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查： $\text{WBC}18.5\times10^9/\text{L}$ (参考值 $4.0\times10^9\sim10.0\times10^9$)，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 鞣酸蛋白
- B: 洛哌丁胺
- C: 小檗碱
- D: 药用炭

答案：B

46. 患者女，53 岁，上腹痛、腹泻、消瘦 1 年。大便常规有大量脂肪球，X 线腹平片显示上腹中部多发钙化点。对其宜选用的药品是

- A: 乳酶生
- B: 硫糖铝
- C: 胰酶
- D: 酵母

答案：C

47. 患者，男性，55 岁，近期感觉乏力、疲倦、心悸、气短，经常头晕、头疼、困倦。经医生检查发现，患者皮肤干燥、指甲扁平。实验室检查示 $\text{Hb}72\text{g/L}$ 。诊断为缺铁性贫血，处方为乳酸亚铁口服。

- A: 大便颜色变黑为消化道出血所致
- B: 服药时不能饮用茶和咖啡
- C: 注意足够的蛋白质摄入
- D: 尽量使用铁锅烹饪

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：A

48. 不能发现"长时间应用才能发生或停药后迟发"的药品不良反应，缘于

- A: 考察不全面
- B: 病例数目少
- C: 管理漏洞
- D: 观察时间短

答案：D

49. 实施"用药列表"，能有效地

- A: 识别及管理多重用药
- B: 提高用药顺应性
- C: 转变疾病预防和保健观念
- D: 健康生活方式的教育

答案：A

50. 女性，32 岁，3 年来月经量增多，乏力、心悸。体格检查面色较苍白。血红蛋白 80g / L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 $7 \times 10^9 / L$ ，血小板 $120 \times 10^9 / L$ ，血清铁 $300 \mu g / L$ 。

- A: 溶血性贫血
- B: 再生障碍性贫血
- C: 巨幼细胞性贫血
- D: 缺铁性贫血

答案：D

51. 粪外观所对应的疾病,阿米巴痢疾

- A: 柏油便，黑色有光泽
- B: 暗红果酱色
- C: 白陶土便
- D: 米泔水样

答案：B

52. “滴、量滴、滴剂”的外文缩写为()。

A: qod

B: Ad

C: gtt

D: Add

答案：C

53. (2019 年真题) 患儿，男，2 岁，误服水银后，应选用的洗胃液是

A: 鸡蛋清

B: 淀粉溶液

C: 牛奶与水等量混合

D: 1:5000 高锰酸钾溶液

答案：A

54. 可升高红细胞，用于肾性及非肾性贫血的是

A: 维生素 B12

B: 重组人促红素

C: 非格司亭

D: 硫酸亚铁

答案：B

55. 一新生儿确诊感染乙型肝炎，提示其生母妊娠期间血清学检查结果
是

A: HBsAg，HBeAg 均为阳性

B: HBsAb，HBeAg 均为阳性

C: HBeAg 为阳性

D: HBsAg 为阳性

答案：A

56. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

- A: 头孢菌素
- B: 碳青霉烯类
- C: 氯霉素
- D: 青霉素

答案：C

57. （2016 年真题）患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。

- A: 对乙酰氨基酚片
- B: 双嘧达莫片
- C: 氯吡格雷片
- D: 华法林片

答案：C

58. 骨髓造血功能较为活跃，某些药物可引起贫血、粒细胞减少、过敏性紫癜等

- A: 内分泌系统
- B: 水盐代谢
- C: 血液系统
- D: 运动系统

答案：C

59. （2018 年真题）患者，男，67 岁，慢性哮喘 20 余年，现因哮喘急性发作就诊，首选的药物是（）

- A: 二羟丙茶碱片
- B: 沙丁胺醇气雾剂
- C: 异丙托溴铵气雾剂
- D: 氨茶碱片

答案：B

60. (2021 年真题) 哺乳期妇女使用，易诱发新生儿胆红素脑病的药物是 ()

- A: 胰岛素
- B: 复方炔诺酮
- C: 依那普利
- D: 复方磺胺甲噁唑

答案：D

61. 并不存在风险，目前不需采取措施；评判为

- A: 确认
- B: 待验证
- C: 驳倒
- D: 验证

答案：C

62. 患者，男，65 岁，患有骨质疏松症。根据患者饮食习惯，每日需补充元素钙 600mg。药师为其推荐碳酸钙(0. 5g / 片)，该患者适宜的用法用量是

- A: 4 片 qd
- B: 6 片 qd
- C: 2 片 tid
- D: 1 片 tid

答案：D

63. 在治疗沙眼的药物中，对沙眼衣原体有强大的抑制作用的是

- A: 金霉素眼膏
- B: 红霉素眼膏
- C: 酞丁安滴眼剂
- D: 硫酸锌滴眼剂

答案：C

64. 下列治疗蛔虫病的药物中，以对肠道寄生虫具有神经-肌肉阻滞作用而显效的是

- A: 阿苯达唑
- B: 噻嘧啶
- C: 甲苯咪唑
- D: 噻苯达唑

答案：B

65. 禁用阿朴吗啡催吐的毒物是()。

- A: 磷化锌
- B: 麦角胺
- C: 阿片类药物
- D: 麻黄碱

答案：C

66. (2018 年真题) 患者,女,49 岁,近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊,临床诊断为下呼吸道细菌性感染,处方如下:

- A: 阿司匹林泡腾片
- B: 氨溴索片

C: 维生素 C 片

D: 左氧氟沙星片

答案：A

67. 患者，女，59 岁，一月前患胃溃疡，近日查体发现血脂异常化验结果：TC7.2mmol/L，TG1.7mmol/L，LDL-C4.3mmol/L，ALT56U/L，AST80U/L。该患者首选的调脂药是()

A: 阿托伐他汀钙片

B: 阿昔莫司胶囊

C: 普罗布考片

D: 非诺贝特片

答案：A

68. 男性，45 岁。反复发生夜间呼吸困难 1 个月，加重一天就诊，体格检查：血压 180/110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率 130 次 / 分。

A: 双肺炎症还是肺间质纤维化

B: 支气管哮喘还是心源性哮喘

C: 肺心病还是冠心病

D: 慢性支气管炎还是急性支气管炎

答案：B

69. 对 A 组 β 溶血性链球菌有抗菌活性，但由于抗菌谱广，且过度使用可能延迟结核病的诊断，增加结核分枝杆菌对该类药物的耐药性，不建议用于常规治疗的药物是

A: 阿莫西林

B: 莫西沙星

C: 克林霉素

D: 阿奇霉素

答案：B

70. 服药后饮水可能会引起水潴留的药物是

A: 抗尿结石药

B: 苦味健胃药

C: 利胆药

D: 抗利尿药

答案：D

71. 可了解工作效果、并为之后工作的进一步完善的是

A: 对查阅的资料进行评价、分析和整理

B: 随访了解效果，并建立档案

C: 形成答案并以口头形式提供给询问者

D: 对问题进行确定并归类

答案：B

72. 适用于夜间服用的药物是

A: 糖皮质激素

B: 氨基糖苷类

C: 他汀类

D: 利尿药

答案：C

73. 在药物信息咨询服务中，二级信息资料最突出的优势是

A: 提供的信息最新

B: 能够很方便地对所需要的一级信息资料进行筛选

C: 对某一个具体问题提供的信息全面、详实

D: 读者能够自己评价信息，免受他人观点影响

答案: B

74. 老年人服用可能出现锥体外系反应的药物是

A: 甲氧氯普胺

B: 哌替啶

C: 苯二氮䓬类药

D: 双嘧达莫

答案: A

75. 患者，女，20 岁，1 天前淋雨后受凉，初始感咽痒、咽干，随后感咽部疼痛，吞咽时更为明显，伴刺激性咳嗽，无发热、畏寒、寒战。

查体：T36. 5℃，P70 次 / 分，R18 次 / 分，BP135/80mmHg。鼻咽黏膜光滑，咽隐窝无异常分泌物；双侧扁桃体 I 度肿大，表面光滑，未见脓性分泌物；颈部未及肿大淋巴结。采用改良 Centor 评分：患者，20 岁，无发热，伴咳嗽，无扁桃体渗出或肿胀，无颈前淋巴结肿痛；改良 Centor 评分为 0 分。药师对该患者的建议，错误的是

A: 可服用布洛芬混悬液止痛

B: 避免环境温度突然变化

C: 建议口服阿莫西林胶囊 500mgbid，疗程 10d

D: 告知患者不要强行发声

答案: C

76. 嗜酸性粒细胞正常参考区间是

A: 0~0.01

B: 0.03~0.08

C: 0.005~0.05

D: 0.20~0.40

答案：C

77. 患者，女，65 岁，体检结果示：低密度脂蛋白胆固醇 5.7mmol/L，颈动脉粥样硬化斑块，宜选用的药物是（）

- A: 甲巯咪唑
- B: 阿托伐他汀
- C: 氢氯噻嗪
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：B

78. 属于胃食管反流病的食管外症状的是（）（消化性溃疡病的治疗）

- A: 哮喘
- B: 烧心
- C: 反流
- D: 上腹部烧灼感

答案：A

79. 抗高血压的药是（）。

- A: 多粘菌素
- B: 法莫替丁
- C: 二甲双胍
- D: 卡托普利

答案：D

80. 可能导致因心力衰竭和呼吸衰竭而死亡的是

- A: 易制毒药品
- B: 蛋白同化制剂
- C: 精神刺激剂

D: 肽激素类

答案：A

81. 患者，男，75 岁，有高血压，长期服用厄贝沙坦氢氯噻嗪片（150mg/12.5mg）1 片 qd，血压控制平稳。因排尿困难、尿频和尿不尽感就诊，诊断为良性前列腺增生。给予非那雄胺片 5mgqd，特拉唑嗪片 5mgqd。患者用药后出现头晕，前来咨询。

A: 头晕可能与患者焦虑有关，继续用药会逐渐缓解

B: 非那雄胺可增强降压药的降压效果，建议更换降压药

C: 非那雄胺可引起直立性低血压，头晕可能与此相关

D: 建议睡前服用特拉唑嗪，有助于缓解头晕症状

答案：D

82. 伴有高血压的患者应慎用的是

A: 氯苯那敏

B: 对乙酰氨基酚

C: 含伪麻黄碱的复方制剂

D: 阿司匹林

答案：C

83. 下列哪种药物是 WHO 规定的第一阶梯镇痛药物

A: 吗啡

B: 可待因

C: 芬太尼

D: 阿司匹林

答案：D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

84. 高蛋白饮食在肠内产生氨基酸会影响其吸收、降低疗效的药物是()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/875233321122012033>