

2023-24 年山西省岢岚县《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库含答案 (完整版)

第 I 部分 单选题 (100 题)

1. 患者，女性，40 岁，甲状腺肿大，伴有心悸、多汗、烦躁、消瘦等症状。诊断：甲状腺功能亢进症。

- A: 格列齐特
- B: 大剂量碘剂
- C: 放射性碘
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：D

2. 苯妥英钠的血药浓度超过多少可出现眼球震颤症状

- A: $25 \mu\text{g} / \text{ml}$
- B: $15 \mu\text{g} / \text{ml}$
- C: $20 \mu\text{g} / \text{ml}$
- D: $10 \mu\text{g} / \text{ml}$

答案：C

3. 控制癫痫持续状态，可静脉注射

- A: 地西泮
- B: 硫喷妥钠
- C: 阿司匹林
- D: 氯丙嗪

答案：A

4. 服用后可能导致口中有氨味，舌苔和大便呈灰黑色的药物是

- A: 硫糖铝
- B: 奥美拉唑
- C: 枸橼酸铋钾
- D: 西咪替丁

答案：C

5. (2017 年真题) 可能引起高铁血红蛋白血症的抗高血压药是 ()

- A: 阿利克仑(阿利吉仑)
- B: 卡托普利
- C: 硝普钠
- D: 氨氯地平

答案：C

6. 可用于减轻季节性过敏性鼻炎相关症状的药物是

- A: M 受体拮抗剂
- B: 白三烯受体阻断剂
- C: 磷酸二酯酶抑制剂
- D: β 受体激动剂

答案：B

7. 因为能增强 β -肾上腺素受体阻断药对心脏的抑制作用，所以禁止与普萘洛尔合用的药物是

- A: 倍他司汀
- B: 二甲双胍
- C: 尼麦角林
- D: 丁苯酞

答案：C

8. 抗酸作用较弱而慢，但持久，对溃疡面有保护作用

A: 三硅酸镁

B: 氢氧化铝

C: 氢氧化镁

D: 碳酸钙

答案：A

9. 引起睫状肌麻痹，适用于青少年屈光检查，尤其适用于 5 岁以下儿童的药物是

A: 奥布卡因

B: 羟苄唑

C: 20%甘露醇

D: 阿托品

答案：D

10. 糖皮质激素禁用于严重高血压患者是因为

A: 抑制免疫功能，只抗炎不抗菌

B: 抑制蛋白质合成

C: 促进胃酸分泌及胃蛋白酶分解

D: 水钠潴留

答案：D

11. 属于 M 受体阻断剂的药物是

A: 布林佐胺

B: 阿托品

C: 奥布卡因

D: 拉坦前列素

答案：B

12. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡(A1 期)伴出血。13C 呼气试验：Hp(+)。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。

医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次 / 日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次 / 日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次 / 日；注射用蛇毒血凝酶 1U，静脉滴注，1 次 / 日；替米沙坦 40mg，15 服，1 次 / 日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次 / 日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次 / 日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次 / 日。

A: 埃索美拉唑钠

B: 胶体果胶铋胶囊

C: 克拉霉素

D: 硝苯地平缓释片

答案：A

13. (2018 年真题) 长期大剂量使用,会降低阿司匹林对心血管的保护作用,应避免合用的药物是 ()

A: 阿托伐他汀

B: 格列齐特

C: 贝那普利

D: 布洛芬

答案：D

14. 通过抑制 5-HT 和去甲肾上腺素（NA）再摄取，增加突触间隙 5-HT 和 NA 浓度从而增强中枢 5-HT 和 NA 能神经功能而发挥抗抑郁作用的药物是

- A: 度洛西汀
- B: 舍曲林
- C: 吗氯贝胺
- D: 阿米替林

答案：A

15. 不易引起严重乳酸血症的双胍类药物是

- A: 甲苯磺丁脲
- B: 二甲双胍
- C: 苯乙双胍
- D: 阿卡波糖

答案：B

16. 可能诱发酒后双硫仑样反应的抗菌药物是

- A: 左氧氟沙星
- B: 哌拉西林
- C: 米诺环素
- D: 甲硝唑

答案：D

17. 口服吸收少，用于肠道感染的是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 氧氟沙星
- C: 甲氧苄啶
- D: 呋喃唑酮

答案：D

18. 维生素 K

- A: 促进四氢叶酸类辅酶的循环利用
- B: 促进凝血因子合成
- C: 抑制血小板聚集
- D: 促进纤溶

答案：B

19. 与细菌核蛋白体的 30s 亚基结合，抑制细菌蛋白质合成的是

- A: 万古霉素
- B: 林可霉素
- C: 四环素
- D: 青霉素

答案：C

20. 主要经肝脏代谢，受肾功能影响小，可用于肾功能不全患者的强心苷是

- A: 地高辛
- B: 去乙酰毛花苷（西地兰 D）
- C: 毛花苷丙（西地兰 C）
- D: 洋地黄毒苷

答案：D

21. （2015 年真题）阿片类镇痛药与硫酸镁合用，可增强中枢抑制，导致的不良反应是（）。

- A: 胆绞痛
- B: 便秘

- C: 躁狂
- D: 低血压

答案: D

22. 有类磺胺反应的 NSAID 是

- A: 吲哚美辛
- B: 阿司匹林
- C: 塞来昔布
- D: 对乙酰氨基酚

答案: C

23. 属于磷酸二酯酶抑制剂的平喘药是

- A: 多索茶碱
- B: 沙美特罗
- C: 孟鲁司特
- D: 布地奈德

答案: A

24. 糖皮质激素的药理作用不包括

- A: 抗休克
- B: 抗病毒
- C: 免疫抑制
- D: 抗炎

答案: B

25. 双香豆素与苯巴比妥合用可

- A: 诱导肝药酶加速灭活，作用减弱
- B: 与其竞争结合血浆蛋白

C: 产生协同作用

D: 竞争性对抗

答案：A

26. 可引起致死性肺毒性的抗心律失常药是()

A: 胺碘酮

B: 利多卡因

C: 奎尼丁

D: 普萘洛尔

答案：A

27. 治疗醛固酮升高引起的顽固性水肿的药物是

A: 螺内酯

B: 阿米洛利

C: 甘露醇

D: 氨苯蝶啶

答案：A

28. 患者，男，19 岁，既往有癫痫病史 2 年，长期服用苯妥英钠控制良好。1 周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4 次/日。

A: 停药后复发率高

B: 餐前服用比餐后效果佳

C: 具有抗雄激素样作用，剂量过大可出现男性乳房女性化、女性泌乳等

D: 餐后服用比餐前效果佳

答案：B

29. 下列药物中，与蛋白同化激素无相互作用的是

- A: 青霉素
- B: 华法林
- C: 环孢素
- D: 他克莫司

答案：A

30. 糖尿病合并酮症酸中毒的患者()

- A: 胰岛素皮下注射
- B: 抑制葡萄糖苷酶
- C: 可促进周围组织细胞(肌肉等)对葡萄糖的利用和抑制肝糖原异生作用
- D: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

答案：A

31. 可阻断肺-胸膜的牵张感受器产生的肺迷走神经反射，适用于各种原因引起的刺激性干咳的药物是

- A: 苯丙哌林
- B: 喷托维林
- C: 右美沙芬
- D: 福尔可定

答案：A

32. 患者，男，62 岁。高血压病史 10 年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压 162/80mmHg，心率 72 次/分。该患者日前服用的药物处抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

- A: 辛伐他汀
- B: 双氯芬酸
- C: 碳酸钙 D
- D: 氨基葡萄糖

答案：B

33. 可用于预防 HIV（人免疫缺陷病毒）感染者巨细胞病毒视网膜炎的药物是

- A: 更昔洛韦
- B: 阿昔洛韦
- C: 恩替卡韦
- D: 金刚烷胺

答案：A

34. 属于抗雌激素类的是()

- A: 他莫昔芬
- B: 睾酮
- C: 甲地孕酮
- D: 己烯雌酚

答案：A

35. 长春碱可用于治疗()。

- A: 晚期睾丸肿瘤
- B: 急性淋巴细胞白血病

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 晚期前列腺癌

D: 绒毛膜上皮癌

答案：A

36. 链激酶的作用机制是

- A: 加速抗凝血酶Ⅲ的作用
- B: 促进纤维蛋白溶解
- C: 抑制维生素 K 在肝细胞合成凝血因子
- D: 抑制血小板聚集

答案：B

37. 某些慢性疾病使用地塞米松长期治疗，为减少外源性激素对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制，推荐给药时间是

- A: 下午 4 时左右
- B: 中午 12 时左右
- C: 空腹
- D: 上午 8 时左右

答案：D

38. 可增加肝毒性的药物是

- A: β 受体阻断剂
- B: 利福平
- C: 甲氨蝶呤
- D: 阿糖胞苷

答案：B

39. 下述利尿药中，可导致血钾升高的是()

- A: 呋塞米
- B: 氨苯蝶啶
- C: 氢氯噻嗪

D: 乙酰唑胺

答案：B

40. 在真菌细胞内代谢后进入真菌的 RNA，抑制 DNA 和 RNA 的合成，导致真菌死亡的是

A: 两性霉素

B: 氟胞嘧啶

C: 万古霉素

D: 伊曲康唑

答案：B

41. 患者，女，68 岁。近期有急性心肌梗死病史。目前正在服用阿司匹林、氯吡格雷、普伐他汀和美托洛尔。近日因偶尔出现胃灼热不适感而就医，该患者应避免使用的药物是

A: 雷尼替丁德

B: 法莫替丁

C: 奥美拉唑

D: 雷贝拉唑

答案：C

42. 用药过程中需要监护甲状腺功能的是()

A: 胺碘酮

B: 氯沙坦

C: 哌唑嗪

D: 硝普钠

答案：A

43. 治疗系统性红斑狼疮选用

- A: 吡嗪酮
- B: 甲硝唑
- C: 氯喹
- D: 甲苯咪唑

答案：C

44. 不宜口服给药的药物是

- A: 硝苯地平
- B: 洛伐他汀
- C: 硝酸甘油
- D: 普萘洛尔

答案：C

45. 外耳道红肿局部治疗可选用

- A: 3%硼酸乙醇
- B: 2%酚甘油
- C: 伪麻黄碱
- D: 赛洛唑啉

答案：B

46. (2020 年真题) 主要用于解热镇痛，但几乎没有抗炎作用的药物是

- A: 吲哚美辛
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 阿司匹林
- D: 塞来昔布

答案：B

47. 脓疱型痤疮可选用()

- A: 阿达帕林
- B: 酮康唑
- C: 维 A 酸
- D: 林旦霜

答案：A

48. 格列本脲的作用特点是

- A: 直接抑制肝糖原分解和糖原异生
- B: 提高靶细胞对胰岛素的敏感性
- C: 抑制胰高血糖素的分泌
- D: 增强胰岛素的作用

答案：A

49. (2020 年真题) 可用于预防 HIV (人免疫缺陷病毒) 感染者巨细胞病毒视网膜炎的药物是

- A: 恩替卡韦
- B: 更昔洛韦
- C: 阿昔洛韦
- D: 金刚烷胺

答案：B

50. 抑制二氢叶酸还原酶的药物是()

- A: 甲氧苄啶
- B: 磺胺嘧啶
- C: 克拉霉素
- D: 庆大霉素

答案：A

51. 异烟肼抗结核杆菌的作用原理是

- A: 抑制蛋白质合成
- B: 抑制 RNA 多聚酶
- C: 与锌离子络合、影响戊糖代谢
- D: 抑制分枝菌酸合成

答案：D

52. 长期慢性便秘者不宜长期大量使用的药物是

- A: 番泻叶
- B: 欧车前
- C: 多库酯钠
- D: 利那洛肽

答案：A

53. 治疗急慢性肾衰竭的首选药物是

- A: 呋塞米
- B: 氯噻酮类
- C: 氨苯蝶啶
- D: 氢氯噻嗪

答案：A

54. 关于铂类药物的描述，下列说法错误的是

- A: 顺铂是结、直肠癌的首选药之一
- B: 作用机制是破坏 DNA 的结构和功能
- C: 细胞增殖周期非特异性抑制剂
- D: 广谱抗肿瘤药物

答案：A

55. 阻断 M

- A: 氢氧化铝
- B: 奥美拉唑
- C: 雷尼替丁
- D: 哌仑西平

答案：D

56. 患者，男，56 岁。有糖尿病病史 15 年，近日并发肺炎，呼吸 35 次/分，心率 105 次/分，血压 160/90mmHg，呼出气体有丙酮味，意识模糊，尿酮呈强阳性，血糖 500mg/dl。

- A: 皮下注射
- B: 舌下含服
- C: 静脉注射
- D: 口服

答案：C

57. 胰岛素和磺酰脲类药物最常见的共同不良反应是

- A: 胃肠道反应
- B: 低血糖反应
- C: 过敏反应
- D: 肝功能损伤

答案：B

58. 洛伐他汀的作用是()

- A: 主要影响胆固醇吸收
- B: 主要影响甘油三酯合成
- C: 影响脂蛋白合成、转运及分解
- D: 主要影响胆固醇合成

答案：D

59. 降低肾素活性最强的药物是

- A: 可乐定
- B: 硝苯地平
- C: 卡托普利
- D: 普萘洛尔

答案：D

60. (2020 年真题) 可以碱化尿液，用于代谢性酸中毒的药物是

- A: 硫酸镁
- B: 氯化钠
- C: 氯化铵
- D: 乳酸钠

答案：D

61. 氨甲环酸的作用机制是()

- A: 促使毛细血管收缩
- B: 刺激血小板生成
- C: 激活凝血因子
- D: 对抗纤维蛋白溶解

答案：D

62. 按作用时间分类，属于速效的胰岛素的是()

- A: 谷赖胰岛素
- B: 短效胰岛素
- C: 甘精胰岛素
- D: 地特胰岛素

答案：A

63. 应用硝普钠时的注意事项及用药监护不包括()

- A: 监测血压
- B: 血硫氰酸盐水平
- C: 缓慢静脉注射
- D: 避光使用

答案：C

64. (2015 年真题) 不属于抗乙型肝炎病毒的药品是 ()。

- A: 拉米夫定
- B: 干扰素
- C: 泛昔洛韦
- D: 恩替卡韦

答案：C

65. 甲氧氯普胺的作用不包括

- A: 胃肠道兴奋作用
- B: 促进胃酸分泌
- C: 促进胃肠蠕动
- D: 刺激泌乳素释放

答案：B

66. 属于 ACEI 类药，临床用于糖尿病肾病的是

- A: 普萘洛尔
- B: 肼屈嗪
- C: 卡托普利
- D: 硝苯地平

答案：C

67. 可与吸入性糖皮质激素合用的长效 β_2 受体激动剂是

- A: 多索茶碱
- B: 沙美特罗
- C: 孟鲁司特
- D: 噻托溴铵

答案：B

68. 关于应对顺铂所致肾毒性的措施，下列说法错误的是

- A: 使用时应充分水化，并及时给予利尿剂
- B: 定期检测电解质、肾功能，同时观察 24h 尿量及尿颜色
- C: 必要时给予碳酸氢钠碱化尿液和别嘌醇
- D: 肾功能不全者可以使用

答案：D

69. 属于刺激性泻药的是()

- A: 欧车前
- B: 多库酯钠
- C: 番泻叶
- D: 利那洛肽

答案：C

70. 蒙脱石散是

- A: 微生态制剂
- B: 抗分泌药
- C: 吸附剂
- D: 抗动力药

答案：C

71. (2017 年真题) 可导致新生儿药物性黄疸的是 ()

- A: 阿莫西林
- B: 磺胺嘧啶
- C: 兴孢他啶
- D: 林可霉素

答案：B

72. 为克服服药初期的类早孕反应，双炔失碳酯肠溶片成分中增加了

- A: 炔雌醇
- B: 甲羟孕酮和炔雌醇
- C: 维生素 B6
- D: 去氧孕烯

答案：C

73. 对铜绿假单胞菌无效的氟喹诺酮类药是

- A: 甲氧苄啶
- B: 磺胺嘧啶
- C: 呋喃唑酮
- D: 氧氟沙星

答案：D

74. (2018 年真题) 属于膨胀性泻药的是 ()

- A: 乳果糖
- B: 蓖麻油
- C: 硫酸镁
- D: 聚乙二醇 4000

答案：D

75. 在血液中几乎不与血浆蛋白结合的口服降糖药是

- A: 罗格列酮
- B: 达格列净
- C: 二甲双胍
- D: 吡格列酮

答案：C

76. 治疗侵袭性曲霉菌病首选()

- A: 灰黄霉素
- B: 伏立康唑
- C: 氟胞嘧啶
- D: 氟康唑

答案：B

77. 属于高选择性非肽类血小板膜糖蛋白 IIb/IIIa 受体抑制剂的是

- A: 氯吡格雷
- B: 替罗非班
- C: 噻氯匹定
- D: 替格雷洛

答案：B

78. 与多柔比星合用或配伍可增加心脏毒性的药物是()

- A: 利福平
- B: 甲氨蝶呤
- C: 阿糖胞苷
- D: β 受体阻断剂

答案：D

79. 成人使用阿托品最低致死量为

- A: 10mg
- B: 80mg~130mg
- C: 5mg
- D: 50mg

答案：B

80. (2019 年真题) 患者，女，36 岁，近期经常上腹灼烧痛、反酸，疼痛多出现在上午 10 点及下午 4 点，有时夜间痛醒，进食后缓解，X 线钡餐诊断为十二指肠溃疡，该患者宜使用的治疗药物是 ()

- A: 奥美拉唑
- B: 多潘立酮
- C: 颠茄
- D: 甲氧氯普胺

答案：A

81. (2021 年真题) 患儿。女，14 岁。因出现尿频、尿急、尿痛症状 2 天就诊，诊断为急性膀胱炎，患儿既往有癫痫病史，宜选用的治疗药物是 ()。

- A: 青霉素 G
- B: 阿奇霉素
- C: 呋喃妥因
- D: 环丙沙星

答案：C

82. (2021 年真题) 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

- A: 口服补液盐 II 是等渗性口服补液盐
- B: 口服补液盐是复方制剂，II、II 代表不同的配方
- C: 腹泻导致重度脱水时首选静脉补液，情况稳定后可更换为口服补液盐治疗
- D: 口服补液盐使用方便、价格低廉，发生腹泻时如能口服，应尽早使用

答案：A

83. 四环素类首选用于()

- A: 钩端螺旋体病
- B: 布鲁菌病
- C: 鼠疫、土拉菌病
- D: 伤寒、副伤寒

答案：B

84. 属于第一代头孢菌素口服制剂的是()。

- A: 头孢克洛
- B: 头孢克肟
- C: 头孢拉定
- D: 头孢吡肟

答案：C

85. 不属于浓度依赖性抗菌药物的是

- A: 阿奇霉素

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 达托霉素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/875243020131012033>