

泌尿系统练习题

一、A1 型题，单 5 选 1 (每题仅一个最佳【答案】)

[分值:1]

您的姓名： 填空题]*

基本信息：[矩阵文本题]

姓名：	
部门：	
员工编号：	

1 慢性肾小球肾炎发病的起始因素是（） [单选题]*

- A.病毒感染
- B..链球菌感染
- C.免疫介导炎症(正确答案)
- D.感染后毒素作用
- E.代谢产物潴留

2.慢性肾小球肾炎必有的临床表现是（） [单选题]*

- A.血尿

B.蛋白尿 (正确答案)

C.水肿

D.高血压

E.贫血

3.病人，女性，28岁。因反复出现蛋白尿(+~++)、镜下血尿、轻度水肿入院。查血压 180/100mmHg，肾功能检查血肌酐持续升高。可能的诊断是（） [单选题]*

A.急性肾小球肾炎

B.急进性肾衰竭

C.急性肾盂肾炎

D.肾病综合征

E.慢性肾小球肾炎 (正确答案)

4.可确定慢性肾小球肾炎病理类型的检查是（） [单选题]*

A.尿常规

B.免疫学检查

C.肾活组织检查 (正确答案)

D.肾功能检查

E.病原学检查

5.慢性肾小球肾炎的治疗原则为（） [单选题]*

A.以消除蛋白尿及血尿为目标

- B.使用激素治疗为主
- C.早期透析治疗
- D.防止和延缓肾功能减退，改善症状 (正确答案)
- E.休息、饮食治疗为主

6.原发性肾病综合征病人最常见体征是（） [单选题] *

- A.疲乏无力
- B.头晕
- C.高血压
- D.水肿 (正确答案)
- E.高血脂

7.病人，男性，45岁。既往有肾小球肾炎病史。近几个月来双下肢水肿，血压升高，来院复查，证实为慢性肾炎急性发作。为迅速缓解症状，最佳措施是（） [单选题] *

- A.卧床休息，下肢抬高
- B.抗生素治疗
- C.免疫抑制剂治疗
- D.利尿降压 (正确答案)
- E.激素治疗

8.慢性肾小球肾炎治疗中可降压、延缓肾功能减退的措施是（） [单选题] *

- A.卧床休息

B.低蛋白、低磷饮食

C.利尿药

D.血管紧张素转换酶抑制剂 (正确答案)

E.抗血小板药物

9.病人，男性，35岁。因血尿伴中度水肿2个月余就诊，测血压140/95mmHg，诊断为“慢性肾炎”。下列治疗措施中错误的是（） [单选题]*

A.利尿剂

B.抗血小板药物

C.糖皮质激素 (正确答案)

D.血管紧张素转换酶抑制剂

E.低蛋白低磷饮食

10.对慢性肾炎病人的饮食指导，错误的是（C） [单选题]*

A.蛋白质每日每千克体重0.6~0.8g，其中摄入量60%以上为高生物效价蛋白质

B.保证每日充足热量摄入

C.不必限制水的摄入 (正确答案)

D.补充多种维生素

E.盐的摄入量为每日1~3g

11.病人，女性，40岁。慢性肾小球肾炎病史10年，因反复发作不愈影响生活和工作，病人表现非常焦虑。护士针对该病人采取的心理护理内容中，重要性最低的是（） [单选题]*

- A.注意观察病人心理活动
- B.及时发现病人不良情绪
- C.主动与病人沟通
- D.与家属共同做好病人的疏导工作
- E.向病人讲解慢性肾小球肾炎的病因 (正确答案)

(12~13题共用题干) 填空题]

12-13.病人，男性，55岁。慢性肾小球肾炎10年，1周前受凉后出现食欲减退。恶心、呕吐晨起最明显，夜尿增多。内生肌酐清除率为30 ml/min [填空题]

12.病人饮食中蛋白质的选择正确的是（） [单选题]*

- A.大量动物蛋白
- B.大量植物蛋白
- C.少量动物蛋白 (正确答案)
- D.少量植物蛋白
- E.禁食蛋白质

13 为了维持水电解质、酸碱平衡，下列护理措施不正确的是（） [单选题]*

- A.食用含钾高的食物 (正确答案)
- B.限制磷的摄
- C.补充活性维生素 D3

D.限制钠、水摄入

E.补充钙、铁

14.病人，男性，30岁，因慢性肾小球肾炎收入院。目前主要临床表现为眼睑及双下肢轻度水肿，血压150/100mmHg。护士在观察病情中应重点关注（） [单选题]*

A.精神状态

B.水肿情况

C.血压变化 (正确答案)

D.心率变化

E.营养状况

15.原发性肾病综合征的病因及发病机制中，较肯定的因素是（） [单选题]*

A.感染引起的直接损害

B.免疫因素 (正确答案)

C.变态反应

D.肾小动脉硬化

E.淀粉样变性

16.肾病综合征最根本的病理生理改变是（） [单选题]*

A.水肿

B.高血压

C.低蛋白血症

D.大量蛋白尿 (正确答案)

E.高胆固醇血症

17. 某肾病综合征病人入院治疗，查体：双下肢水肿。实验室检查：尿蛋白 4.5g/d，血浆白蛋白 20g/L。该病人水肿的主要原因是（） [单选题] *

A.醛固酮增多

B.球-管失衡

C.饮水过多

D.肾小球滤过率下降

E.血浆胶体渗透压下降 (正确答案)

18.病人，男性，22岁，尿蛋白(++++)，全身水肿1个月，血压 165/100mmHg。入院后诊断为肾病综合征。引起该病人蛋白尿最主要的原因是（） [单选题] *

A.肾小球滤过率增加 (正确答案)

B.血浆胶体渗透压下降

C.尿量增加

D.感染

E.肾功能下降

19.肾病综合征病人最突出的体征是（） [单选题] *

A.高血压

B.水肿 (正确答案)

C.肾区叩击痛

D.嗜睡

E.昏迷

20.病人，男性，20岁。因双下肢水肿、蛋白尿收入院。查尿蛋白(+++)，胆固醇轻度升高，血清蛋白 20g/L。入院后诊断为肾病综合征。上述疾病最主要的并发症是（） [单选题]*

A.感染(正确答案)

B.动脉粥样硬化

C.肾功能不全

D.心功能不全

E.心力衰竭

21.肾病综合征病人易自发形成血栓的主要原因是（） [单选题]*

A.血管内皮易受损伤

B.红细胞增多

C.组织因子释放

D.高脂血症(正确答案)

E.血小板增多

22.病人，男性，36岁。尿蛋白(++++)，全身水肿1个月，测血压 165/100mmHg。入院后诊断为肾病综合征。引起该病人水肿最主要的因素为（） [单选题]*

A.低钾血症

B.低钠血症

C.低蛋白血症 (正确答案)

D.高脂血症

E.氮质血症

23.能确定病综合征的病理类型的检查项目是 () [单选题] *

A.中段尿培养

B.尿蛋白定量

C.肾功能检查

D.肾活检 (正确答案)

E.血脂全套

24.下列不符合肾病综合征诊断标准的是 () [单选题] *

A.大量蛋白尿(>3.5g/d)

B.高脂血症

C.高血压 (正确答案)

D.水肿

E.低白蛋白血症

25.患儿男，5岁。因“肾病综合征”以肾上腺皮质激素治疗5个月，出现水肿减轻、食欲增加、双下肢疼痛。最应关注的药物副作用是 () [单选题] *

A.高血压

B.骨质疏松 (正确答案)

D.消化性溃疡

E.库欣综合征

26.病人，女性，36岁。发热、头晕、乏力、晨起眼水肿天。查体:体温 38.8℃，血压 140/95mmHg，24 小时尿蛋白定量 3.9g，初步诊断为肾病综合征。下列护理措施中错误的是（） [单选题]*

A.用高生物效价优质蛋白

B.限制水钠摄入

C.避免皮肤长时间受压

D.迅速利尿，以减轻症状 (正确答案)

E.适度活动，避免产生肢体血栓等并发症

27.病人，女性，36岁。发热、头晕、乏力、晨起眼睑水肿 3 天。查体:体温 38.8℃，血压 140/95mmHg，24 小时蛋白定量 3.9g，初步诊断为肾病综合征。下列护理措施中错误的是（） [单选题]*

A.用高生物效价优质蛋白

B.限制水钠摄入

C.避免皮肤长时间受压

D.迅速利尿，以减轻症状 (正确答案)

E.适度活动，避免产生肢体血栓等并发症

(28-30题共用题干) [单选题]

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/875300020004011330>