

2024 广西壮族自治区右江区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库附答案【完整版】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 氯霉素（在肝脏与葡萄糖醛酸结合后排泄）半衰期成人 4 小时，新生儿则为 25 小时，即

- A: 药物分布
- B: 药物吸收
- C: 药物中毒
- D: 药物代谢

答案：D

2. 用 10%氯化钠注射液 9ml 加适量注射用水稀释成 90ml 的溶液，其氯化钠浓度是（）

- A: 0.009
- B: 0.1
- C: 0.1
- D: 0.01

答案：D

3. 禁止与单胺氧化酶抑制剂联用的药物不包括

- A: 苯二氮
- B: 5-HT
- C: 三环类药物
- D: 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂

答案：A

4. 患者，女，55 岁，因反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸、胃灼热、间断积食来诊，食管测压提示食管下括约肌压力小于 6mmHg，结合胃镜检查 results，临床诊断为胃食管反流病。医师处方：奥美拉唑 20mgqd 强化抑酸治疗。

- A: 禁烟戒酒
- B: 服用 NSAIDs 止痛
- C: 控制体重
- D: 避免高脂饮食

答案：B

5. 以下患者中，最适宜口服给药的是

- A: 胃肠反应大的患者
- B: 吞咽困难的老人
- C: 病情危重的患者
- D: 慢性病或轻症患者

答案：D

6. 以健康受试者进行初步的临床药理学及人体安全性评价是指

- A: II 期临床试验
- B: III 期临床试验
- C: 临床预试验
- D: I 期临床试验

答案：D

7. (2015 年真题) 治疗药物评价的内容，一般不包括的项目是 ()。

- A: 依从性

- B: 有效性
- C: 安全性
- D: 经济性

答案：A

8. 属于超长效的胰岛素制剂是

- A: 低精蛋白锌胰岛素
- B: 精蛋白锌胰岛素
- C: 赖脯胰岛素
- D: 甘精胰岛素

答案：D

9. 有机磷农药中毒后，具有食欲缺乏、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、瞳孔缩小、视力模糊、多汗、流涎、支气管痉挛、呼吸道分泌物增多、呼吸困难、发绀等表现的是()。

- A: 烟碱样症状
- B: 毒蕈碱样症状
- C: 骨骼系统症状
- D: 中枢神经系统症状

答案：B

10. 阿尔茨海默病患者应该避免使用的药物是

- A: 多奈哌齐
- B: 卡巴拉汀
- C: 美金刚
- D: 颠茄

答案：D

11. 乳酸性酸中毒患者宜选用()。

- A: 瑞格美脲
- B: 二甲双胍
- C: 格列喹酮
- D: 胰岛素

答案: D

12. (2020 年真题) 药品说明书中提及“两种药物在吸收过程中, 会发生相互影响, 不能同时服药”, 但没有明示服药间隔时间, 通常建议的间隔时间是()

- A: 2 小时
- B: 0.5 小时
- C: 1 小时
- D: 3 小时

答案: A

13. 以下对“发热指标”的叙述中, 不正确的是

- A: 腋下温度超过 37.0°C
- B: 直肠温度超过 37.6°C
- C: 腋下温度超过 36.6°C
- D: 口腔温度超过 37.3°C

答案: C

14. 口服避孕药妇女所致心肌梗死, 在吸烟人群中危险性加大

- A: 生理因素
- B: 生活和饮食习惯
- C: 药物的使用
- D: 药物制剂因素

答案：B

15. 较易导致肾损伤的药物是

- A: 环孢素
- B: 比沙可啶
- C: 酮康环孢素唑
- D: 布洛芬

答案：D

16. 服用华法林期间应进行监测的指标是()

- A: APTT
- B: ALT
- C: INR
- D: RBC

答案：C

17. 急性胰腺炎发病几小时，血清淀粉酶达到高峰

- A: 2~12
- B: 48~72
- C: 12~72
- D: 1

答案：C

18. 可促进去铁胺的螯合，用于慢性铁中毒的是

- A: 维生素 A
- B: 维生素 B1
- C: 维生素 D
- D: 维生素 C

答案：D

19. 辛伐他汀

- A: 宜清晨服用
- B: 宜睡前服用
- C: 宜餐前服用
- D: 宜餐后服用

答案：B

20. 药师对药品不良事件、新药上市后被召回或撤市的案例应及时掌握，不能松懈

- A: 塞来昔布
- B: 钆贝葡胺
- C: 替加色罗
- D: 培高利特

答案：B

21. 按照药品不良反应程度分级标准评判,轻微的反应或疾病,症状不发展,一般无需治疗,应评判为

- A: 轻度
- B: 重度
- C: 中度
- D: 弱轻度

答案：A

22. 主要降低 TG 兼降低 TC 的药物首选

- A: 考来烯胺
- B: 氯贝丁酯

C: 氟伐他汀

D: 阿昔莫司

答案: B

23. 患者，男，70 岁，2 周以来出现尿频、夜尿次数明显增多，且尿流变细、间断，排尿踌躇、费力等排尿困难现象，排尿后滴沥、尿不尽，近几天又出现睡眠障碍。

A: 索利那新

B: 非那雄胺

C: 米多君

D: 坦索罗辛

答案: B

24. 属于非核苷酸类 HIV 逆转录酶抑制剂的是

A: 奈韦拉平

B: 沙奎那韦

C: 恩夫韦替

D: 扎西他滨

答案: A

25. 过敏性皮炎常表现为()

A: 中性粒细胞增多

B: 嗜酸性粒细胞增多

C: 红细胞增多

D: 血红蛋白减少

答案: B

26. 关于透析患者使用磷结合剂的下列叙述错误的是

- A: 透析患者服用钙剂必须在进食的同时服用
- B: 透析患者服用钙剂量大时易出现高钙血症
- C: 透析患者服用磷结合剂的钙剂，目的是为了补钙
- D: 高磷血症会导致心脏、血管的钙化

答案：C

27. 药物警戒对用药安全具有重要作用。下列确认的用药不良事件中，属于发现药品使用环节问题的是

- A: “亮菌甲素事件”
- B: “阿糖胞苷儿科事件”
- C: “万络(罗非昔布)事件”
- D: “拜斯亭(西立伐他汀)事件”

答案：B

28. 患者，男，52 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：

- A: 雷米普利
- B: 氟伐他汀
- C: 比索洛尔
- D: 左旋氨氯地平

答案：B

29. 一旦误服该毒性物质中毒，忌用碳酸氢钠溶液洗胃的是

- A: 磷化锌等灭鼠药
- B: 克仑特罗(瘦肉精)
- C: 拟除虫菊酯类杀虫药
- D: 香豆素类杀鼠药

答案：D

30. 药物相互作用有发生在体内的药动学、药效学方面的作用；亦有发生在体外的配伍变化，如引起理化反应使药品出现混浊、沉淀、变色和活性降低。

- A: 抗酸药合用四环素类
- B: 阿司匹林合用格列美脲
- C: 磺胺类药与青霉素合用
- D: 用药时同服甲氧氯普胺

答案：B

31. 可使乳儿出现易激惹、尖叫、惊厥等神经系统症状哺乳期妇女不宜选用的药物是（）

- A: 左炔诺孕酮
- B: 链霉素
- C: 氯霉素
- D: 依那普利

答案：A

32. （2016 年真题）以延长患者生命时间为指标开展的药物经济学评价方法属于（）。

- A: 成本-效用分析
- B: 成本-效益分析
- C: 最小成本分析
- D: 成本-效果分析

答案：D

33. 与对氨基苯甲酸（PAPB）化学结构相似，可与 PAPB 竞争二氢叶酸合成酶的药物是

- A: 青霉素

- B: 四环素
- C: 链霉素
- D: 磺胺嘧啶

答案：D

34. 女，30 岁。G2P1 既往月经规律，月经量少，身体健康，要求长期采取避孕措施。

- A: 长效口服避孕药
- B: 宫内节育器
- C: 安全期避孕
- D: 紧急避孕药

答案：B

35. 规范处方行为与操作流程，归属

- A: 科学发展
- B: 管理规范到位
- C: 知识培训
- D: 环境与流程的优化与持续改进

答案：B

36. 患者，男，53 岁，因纳差、食欲减退来药店购药，药师应推荐的药品是（）

- A: 乳酶生片
- B: 酵母片
- C: 甲氧氯普胺片
- D: 多潘立酮片

答案：B

37. (2019 年真题) 患者，男，47 岁，2 型糖尿病史，饮食不规律，近期因口服降糖药疗效不佳欲改为三餐前即刻使用胰岛素或胰岛素类似物控制血糖，应选用的药物是

- A: 普通胰岛素
- B: 精蛋白锌胰岛素
- C: 门冬胰岛素
- D: 低精蛋白锌胰岛素

答案：C

38. “1 天给药 1 次；如需要立即达到治疗浓度，可首剂加倍”是针对

- A: 半衰期大于 30 小时的药品
- B: 半衰期大于 24 小时的药品
- C: 半衰期 8~24 小时的药品
- D: 半衰期小于 30 分钟的药品

答案：B

39. 药师在指导合理用药时应正确交代给药途径和给药方法，下列交代的内容中错误的是

- A: 活菌制剂不能用超过 40% 的水送服
- B: 肠溶片需整片吞服，不宜嚼碎服用
- C: 栓剂是外用制剂，不可口服
- D: 泡腾片可以溶解于温开水中服用，也可以作为咀嚼片服用

答案：D

40. 可能诱发心血管脑病、引起肝癌、肾癌的是

- A: 蛋白同化制剂
- B: 精神刺激剂
- C: 易制毒药品

D: 肽激素类

答案：A

41. 患者，女，35 岁，临床诊断为高甘油三脂血症，临床上给予非诺贝特进行治疗，该药正确的用量为()

A: 0.5g, qd

B: 0.5g, tid

C: 0.1g, tid

D: 0.2g, qd

答案：C

42. 苯丙酸诺龙属于哪一类兴奋剂

A: 利尿剂

B: β 受体阻断剂

C: 蛋白同化激素

D: 精神刺激剂

答案：C

43. 慢性阻塞性肺病急性加重期伴脓痰者宜选用的治疗方案是()

A: 吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药

B: 抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素

C: 长效 β_2 受体激动剂+吸入型糖皮质激素

D: 吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂

答案：B

44. 60 岁以上老年人用药剂量应酌减，一般给予成人剂量的

A: 45295

B: 45356

C: 45355

D: 45327

答案: C

45. 万古霉素 0.5g 加入 5%葡萄糖注射液 100ml 中静脉滴注要求滴注时间不得少于 1h，已知每毫升 15 滴，每分钟最多可滴注的滴数约是()

A: 25 滴

B: 50 滴

C: 15 滴

D: 7 滴

答案: A

46. 可用于紫癜辅助治疗的药物是

A: 维生素 C

B: 维生素 A

C: 复合维生素 B

D: 维生素

答案: A

47. (2018 年真题) 患者,女,38 岁,已婚,妊娠 2 个月,近日自觉心慌、多汗,查 FT₃,FT₄ 偏高 TSH0.01mU/L,临床诊断为甲状腺功能亢进症适宜的治疗方案为 ()

A: 维持妊娠,选用甲巯咪唑治疗

B: 终止妊娠,选用丙硫氧嘧啶治疗

C: 维持妊娠,行甲状腺切除手术

D: 维持妊娠,选用丙硫氧嘧啶治疗

答案: D

48. 下列是 5 位患者血常规检查的结果，其中白细胞计数异常的是

A: 6 个月～2 岁婴儿 $11.0 \times 10^9 / L$

B: 成人静脉血 $13.0 \times 10^9 / L$

C: 成人静脉血 $4.3 \times 10^9 / L$

D: 成人末梢血 $8.0 \times 10^9 / L$

答案：B

49. 贫血患者常出现

A: 中性粒细胞增多

B: 嗜酸性粒细胞增多

C: 血红蛋白减少

D: 血小板计数增高

答案：C

50. 能监测用药过程错误的真实发生率的是

A: 直接观察

B: 病历审查

C: 计算机检测方法

D: 岗位工作问责

答案：A

51. 下列关于甲状腺功能亢进症患者教育的说法错误的是()

A: 避免饮用咖啡等兴奋性饮料

B: 避免使用含碘药物

C: 禁食富含碘的食物

D: 妊娠伴甲状腺功能亢进症患者宜选甲巯咪唑

答案：D

52. 可引起溶血性贫血的药物是

- A: 氯丙嗪
- B: 氯霉素
- C: 地塞米松
- D: 阿糖胞苷

答案：A

53. 患者，女，25 岁，产后 2 个月，哺乳期，因尿路感染需要给予抗感染治疗，首选的药物是()

- A: 头孢呋辛
- B: 多西环素
- C: 阿米卡星
- D: 左氧氟沙星

答案：A

54. 属于苯二氮革类药物的是

- A: 舍曲林
- B: 丁螺环酮
- C: 阿米替林
- D: 艾司唑仑

答案：D

55. 一般情况下，为治疗感冒连续服用抗感冒药的时间不应该超过

- A: 7 日
- B: 5 日
- C: 9 日
- D: 3 日

答案：A

56. 属于患者用药咨询的是

- A: 栓剂、气雾剂的正确使用方法
- B: 注射剂溶媒的正确选择
- C: 减肥、补钙、补充营养素
- D: 抗菌药物的合理应用

答案：A

57. 有双侧肾动脉狭窄的高血压患者不宜选用

- A: 维拉帕米
- B: 多沙唑嗪
- C: 哌唑嗪
- D: 卡托普利

答案：D

58. 治疗胆囊炎的药物需选用

- A: 消炎利胆片
- B: H₂ 受体阻断剂
- C: M 受体激动剂
- D: 质子泵抑制剂

答案：A

59. (2017 年真题) 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 美洛昔康
- C: 双氯芬酸钠

D: 尼美舒利

答案：A

60. (2015 年真题) 患者，男，50 岁，高血压病史 3 年。期间先后用硝苯地平片和硝苯地平控释片控制血压，近日出差曾饮酒和引用多种饮料，出现血压波动情况。

- A: 控释片比普通片剂含量高，不宜嚼碎服用，不然会导致低血压
- B: 控释片比普通片剂含量相同，可以固定时间替换服用
- C: 控释片一般一日三次给药，与普通片给药次数相同
- D: 控释片比普通片剂含量相同，与普通片给药次数相同

答案：A

61. 某患者，男，64 岁，身高 174cm，体重 92kg，既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊。临床处方：阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

- A: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片
- B: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、单硝酸异山梨酯注射液
- C: 特拉唑嗪片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片
- D: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、辛伐他汀片

答案：B

62. 下列关于药物对孕妇的影响哪一项是错误的

- A: 受精后半个月内，几乎见不到药物的致畸作用
- B: 受精后 3 周至 3 个月接触药物，最易发生先天畸形
- C: 孕妇不应过量服用含咖啡因的饮料
- D: 孕妇患有结核、糖尿病应绝对避免药物治疗以防胎儿畸形

答案：D

63. 能显示药师的文献评价能力和技巧的咨询服务方法步骤是

- A: 形成答案并以口头形式提供给询问者
- B: 随访工作效果，并建立档案
- C: 对问题进行确定并归类
- D: 对查阅的资料进行评价、分析和整理

答案：D

64. 患者于 1 周前无诱因出现咳嗽，咳嗽为阵发性，痰少，呈白色黏液性，不易咳出，同时出现发热，体温多在夜间升高，38℃左右，无畏冷、寒战、胸痛、咳血等，于卫生院治疗后，未见好转，并有气喘、气促，活动后呼吸困难等症状。入院治疗诊断为：肺炎。

- A: 阿奇霉素
- B: 链霉素
- C: 克拉霉素
- D: 米诺环素

答案：B

65. 下列病原体中，可导致沙眼的是

- A: 沙眼衣原体
- B: 豚解支原体
- C: 大肠埃希菌
- D: 变形杆菌

答案：A

66. 排便在一日内超过 3 次，或粪便中脂肪成分增多，或带有未消化的食物、黏液、脓血者称为腹泻。腹泻是由多种不同病因所致，在应用止泻药治疗的同时，实施对因治疗不可忽视。

- A: 黄连素
- B: 磷霉素
- C: 谷维素
- D: 天麻素

答案：A

67. 抑制细菌核酸合成的药物是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 利福喷汀
- C: 头孢哌酮
- D: 头孢米诺

答案：B

68. (2017 年真题) 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 头孢克洛干混悬剂
- B: 感冒清热冲剂
- C: 维生素 C 片
- D: 葡萄糖酸锌口服液

答案：A

69. 以下中毒病例中，临床应用特殊试剂能够明确诊断的是

- A: 苯巴比妥
- B: 硝西泮
- C: 丙咪嗪
- D: 奋乃静

答案：B

70. (2015 年真题) 解救有机磷中毒过程中，如阿托品应用过量，应立刻给予 ()。

- A: 毛果芸香碱
- B: 东莨菪碱
- C: 山莨菪碱
- D: 麻黄碱

答案：A

71. 有关血红蛋白的叙述正确的是

- A: 血红蛋白常被称为"血色素"，是组成血液的主要成分
- B: 血红蛋白减少是诊断贫血的重要指标，并能确定贫血的类型
- C: 缺铁性贫血时红细胞计数的减少程度较血红蛋白的减少程度明显
- D: 血红蛋白承担着机体向器官组织运输氧气和运出二氧化碳的功能

答案：D

72. 毒物种类很多，中毒方式各异，虽然有的毒物中毒尚无特效解毒药，但救治原则基本相同。

- A: 巴比妥
- B: 苯巴比妥
- C: 硫喷妥钠
- D: 异戊巴比妥

答案：D

73. 下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法，错误的是

- A: 抗抑郁药起效较快，使用 1 周后可判定疗效
- B: 当单药治疗无效时，可考虑联合使用两种作用机制不同的抗抑郁药
- C: 应尽可能单一用药，足量、足疗程治疗

D: 剂量递增，尽可能采用最小有效剂量，使不良反应减至最小

答案：A

74. 下列不属于艾滋病的基本特征的是

A: 自然杀伤细胞（NK 细胞）活性下降

B: T 淋巴细胞功能下降

C: 体重减轻或非正常的生长减慢

D: B 淋巴细胞功能失调

答案：C

75. 皮下脂肪薄，局部循环差，致使皮下和肌肉注射给药的吸收不规则，即

A: 药物排泄

B: 药物吸收

C: 药物代谢

D: 药物分布

答案：B

76. 当创伤应激严重时，给予肠外营养物质的热氮比应调整为

A: NPC7: 3

B: NPC5: 5

C: 100kcal: 1gN

D: 150kcal: 1gN

答案：C

77. 患者，女，37 岁，因小腹胀痛 2 月余、加重 5 天就诊。主诉就诊前无明显诱因出现小腹胀痛，阴道不规则流液，流出物呈黄色脓状，量时多时少，下腹及腰骶部间歇性坠痛。间断性院外治疗（口服金刚藤胶囊、阿莫西林胶囊，具体用量不详）。5 天前月经来潮，下腹部坠痛与腰骶部胀痛难忍，遂来院就诊。8 超提示右侧卵巢囊肿、盆腔积液。妇科检查提示外阴发育正常，阴道黏膜充血，有黄色脓性鱼腥臭味白带，宫颈肥大充血并有举痛，子宫大小正常。门诊以“急性盆腔炎、卵巢囊肿、阴道炎”收治入院。

- A: 阿奇霉素
- B: 克林霉素
- C: 氧氟沙星
- D: 多西环素

答案：B

78. 根据病原体、传播和症状的不同分为上呼吸道感染(上感)和流行性感冒(流感)。上感和流感在一年四季均可发病，尤以冬、春季较为多见。

- A: 96h 以内
- B: 72h 以内
- C: 48h 以内
- D: 108h 以内

答案：C

79. (新药 4 期临床评价的局限性) II 期临床试验很难发现“低于 1% 发生频率”的不良反应，属于

- A: 考察不全面
- B: 管理漏洞
- C: 病例数量少

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

D: 观察时间短

答案：C

80. 肥胖、某些疾病、中毒都可成为非酒精性脂肪肝的诱因。脂肪肝合并其他疾病时应采取相应的治疗措施

- A: 替米沙坦
- B: 别嘌醇
- C: 二甲双胍
- D: 奥利司他

答案：A

81. 处方外文缩写 OU 代表()

- A: 右耳
- B: 左耳
- C: 双眼
- D: 左眼

答案：C

82. 临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径,半衰期 12h 的药物通常选择()

- A: 每日给药 1 次
- B: 静脉滴注给药
- C: 每个半衰期给药 1 次
- D: 2~3 个半衰期给药 1 次

答案：C

83. 解救中毒的肾衰竭者()

- A: 不能催吐
- B: 不能导泻
- C: 禁止洗胃
- D: 不能用强利尿剂

答案：D

84. (2015 年真题) 处方中“餐前给药”的外文缩写是 ()。

A: pc

B: Ac

C: po

D: qn

答案：B

85. 随着人均寿命的提高和人民生活水平的提高，对待疾病的观念也逐渐从治疗转变为预防，通过服用营养保健品来预防疾病的人群日益增加，下列相关说法错误的是

A: 遗传因素对健康长寿起到了决定性作用

B: 复合维生素一般适合于饮食不规律者、多数孕妇、老年人和儿童

C: 应有针对性地挑选合适的补充剂才能发挥营养成分的最佳效果

D: 合理饮食是获取营养成分最简单有效的途径

答案：A

86. 下列药物中，可经脑脊液途径给药的为

A: 氟尿嘧啶

B: 甲氨蝶呤

C: 长春新碱

D: 塞替派

答案：B

87. 前记

A: 对药物治疗的建设性意见与结果评价

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 临床诊断、费别

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/876014020055011030>