# 四川成都市华西中学数学七年级上册整式的加减专项攻克

考试时间：90 分钟；命题人：教研组

**考生注意：**

1、本卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分，满分 100 分，考试时间 90 分钟

2、答卷前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。


## 第 I 卷（选择题　20 分）

**一、单选题（10 小题，每小题 2 分，共计 20 分）**

1、如果 $xy\neq 0$，$\frac{1}{3}xy^2+axy^2=0$，那么 $a$ 的值为（　　）

A．－3　　B．$-\frac{1}{3}$　　C．0　　D．3

2、下列各正方形中的四个数之间都有相同的规律，根据此规律，$x$ 的值为（　　）




A．135　　B．153　　C．170　　D．189

3、多项式 a－（b－c）去括号的结果是（　　）


A．a－b－c　　B．a+b－c　　C．a+b+c　　D．a－b+c

4、代数式 $a^2-\frac{1}{b}$ 的正确解释是（　　）

A．$a$ 与 $b$ 的倒数的差的平方　　B．$a$ 与 $b$ 的差的平方的倒数


C．$a$的平方与$b$的差的倒数　　D．$a$的平方与$b$的倒数的差

5、如图，填在下面各正方形中的四个数之间都有相同的规律，根据这种规律，$m$的值应是（　　）




A．110　　B．168　　C．212　　D．222

6、如图，边长为$m$的正方形纸片上剪去四个直径为$d$的半圆，阴影部分的周长是（　　）




A．$m^2-\pi d^2$　　B．$m^2-\frac{1}{2}\pi d^2$

C．$4m-\pi d$　　D．$4m+2\pi d-4d$

7、下列各式中，与$2a^2b$为同类项的是（　　）

A．$-2a^2b$　　B．$-2ab$　　C．$2ab^2$　　D．$2a^2$

8、下列说法中，正确的是（　　）

A．0不是单项式　　B．$\frac{\pi a}{2}$的系数是$\frac{1}{2}$

C．$xyz^2$的次数是4　　D．$2x^2-3x-1$的常数项是1

9、下列代数式中是二次三项式的是（　　）

A．$2x+x^2-x^3$　　B．$x^2+2xy+y^2$　　C．$2\left(m^2-mn\right)$　　D．$a^3+2a^2-1$

10、下列去括号正确的是（　　）.

A．$1-(a-b)=1-a-b$　　B．$1+2(a-b)=1+2a-b$

C．$1-(a-b)=1+a-b$　　D．$1-(a-b)=1-a+b$

## 第Ⅱ卷（非选择题　80 分）

**二、填空题（10 小题，每小题 3 分，共计 30 分）**

1、某市出租车收费标准为：起步价为 8 元，3 千米后每千米的价格为 2.5 元，在计价器最终所显示数字的基础上再加$b$元燃油附加费，小赵乘坐出租车走了$x$千米$(x>3)$，则小赵应该共付车费_____元（用含$x$和$b$的代数式表示）.

2、若多项式$(k-1)x^2+3x^{|k+2|}+2$为三次三项式，则$k$的值为_____.

3、围棋是一种起源于中国的棋类游戏，在春秋战国时期即有记载，围棋棋盘由横纵各 19 条等距线段构成，围棋的棋子分黑白两色，下在横纵线段的交叉点上．若一个白子周围所有相邻（有线段连接）的位置都有黑子，白子就被黑子围住了．如图 1，围住 1 个白子需要 4 个黑子，固住 2 个白子需要 6 个黑子，如图 2，围住 3 个白子需要 8 个或 7 个黑子，像这样，不借助棋盘边界，只用 15 个黑子最多可以围住___个白子.




图 1




图 2

4、已知有理数$a$和有理数$b$满足多项式$A$，$A=(a-1)x^3+x^{|b+2|}-x^2+bx-a$是关于$x$的二次三项式，则$a=$_____，$b=$_____；当$x=-2$时，多项式$A$的值为_____.

5、如果多项式$4x^3-2x^2-\left(kx^2+17x-6\right)$中不含$x^2$的项，则$k$的值为_____

6、将一串有理数按下列规律排列，回答下列问题：$\frac{1}{2}$，$-\frac{2}{3}$，$\frac{1}{4}$，$-\frac{4}{5}$，$\frac{1}{6}$，$-\frac{6}{7}$，…问题：第2020个数是_____.

7、若 $x^2+2x$ 的值是6，则 $2x^2+4x-7$ 的值是_____.

8、已知 $a-3b=3$，则 $6b+2(4-a)$ 的值是_____.

9、有一列数按如下规律排列：$\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\frac{\sqrt{3}}{4}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{\sqrt{5}}{8}$，$\frac{\sqrt{6}}{10}$，$\frac{\sqrt{7}}{12}$，…，则第2022个数是 _____.

10、多项式 $\frac{1}{10}x^{m-1}+2x-5$ 是关于 $x$ 的四次三项式，则 $m=$_____

**三、解答题（5小题，每小题10分，共计50分）**

1、计算下式的值：$(2x^4-4x^3y-2x^2y^2)-(x^4-2x^2y^2+y^3)+(-x^4+4x^3y-y^3)$，其中 $x=\frac{1}{4}$，$y=-1$，甲同学把 $x=\frac{1}{4}$ 错抄成 $x=-\frac{1}{4}$，但他计算的结果也是正确的，你能说明其中的原因吗？

2、代数式 $(3a+2a^2-4a^3)-(a^2\square a-3a^3)$ 里的“□”是“＋，－，×，÷”中某一种运算符号.

（1）如果“□”是“＋”，化简：$(3a+2a^2-4a^3)-(a^2\square a-3a^3)$；

（2）当 $a=-1$ 时，$(3a+2a^2-4a^3)-(a^2\square a-3a^3)=-2$，请推算“□”所代表的运算符号.

3、计算：

（1）$(2a-b)-(2b-3a)-2(a-2b)$；

（2）$\left(4x^2-5xy\right)-\left(\frac{1}{3}y^2+2x^2\right)+2\left(3xy-\frac{1}{4}y^2-\frac{1}{12}y^2\right)$.

4、要对一组对象进行分类，关键是要选定一个分类标准，不同的分类标准有不同的结果．如对下面给出的七个单项式：$2x^3z$，$xyz$，$3y^2$，$-5y^2x$，$-z^2x^2$，$\frac{1}{3}x^2yz$，$z^3$ 进行分类，若按单项式的次数分类：二次单项式有 $\frac{1}{3}y^2$；三次单项式有 $xyz$，$-5y^2x$，$z^3$；四次单项式有 $2x^3z$，$-z^2x^2$，$\frac{1}{3}x^2yz$．请你用两种不同的分类方法对上面的七个单项式进行分类.

5、

【观察】1×49=49，2×48=96，3×47=141，…，23×27=621，24×26=624，25×25=625，26×24=624，27×23=621，…，47×3=141，48×2=96，49×1=49.

【发现】根据你的阅读回答问题：

（1）上述内容中，两数相乘，积的最大值为_____；

（2）设参与上述运算的第一个因数为a，第二个因数为b，用等式表示a与b的数量关系是_____.

【类比】观察下列两数的积：1×59，2×58，3×57，4×56，…，m×n，…，56×4，57×3，58×2，59×1.

猜想mn的最大值为_____，并用你学过的知识加以证明.

## -参考答案-

一、单选题

1、B

【解析】

【分析】

根据同类项的定义可知，$\frac{1}{3}xy^2$和$axy^2$是同类项，两数和为0，且$xy\neq 0$，则系数$\frac{1}{3}$和$a$互为相反数，求解即可.

【详解】

∵$xy\neq 0$，$\frac{1}{3}xy^2+axy^2=0$，则$\frac{1}{3}xy^2$和$axy^2$是同类项，

∴系数互为相反数，

∴$\frac{1}{3}+a=0$，

即$a=-\frac{1}{3}$，

故选：B.

【考点】

本题考查了同类项的定义，相反数的定义，熟记同类项的定义是解题的关键.

2、C

【解析】

【分析】

由观察发现每个正方形内有：$2\times2=4,2\times3=6,2\times4=8,$可求解$b$，从而得到$a$，再利用$a,b,x$之间的关系求解$x$即可.

【详解】

解：由观察分析：每个正方形内有：

$2\times2=4,2\times3=6,2\times4=8,$

$\therefore 2b=18,$

$\therefore b=9,$

由观察发现：$a=8,$

又每个正方形内有：

$2\times4+1=9,3\times6+2=20,4\times8+3=35,$

$\therefore 18b+a=x,$

$\therefore x=18\times9+8=170.$

故选C.

【考点】

本题考查的是数字类的规律题，掌握由观察，发现，总结，再利用规律是解题的关键.

3、D

【解析】

【分析】

根据去括号的法则：括号前是“－”时，把括号和它前面的“－”去掉，原括号里的各项都改变符号，进行计算即可.

【详解】

$a-(b-c)=a-b+c$ ，

故选：D.

【考点】

本题主要考查去括号，掌握去括号的法则是解题的关键.

4、D

【解析】

【分析】

说出代数式的意义，实际上就是把代数式用语言叙述出来．叙述时，要求既要表明运算的顺序，又要说出运算的最终结果.

【详解】

解：代数式$a^2-\frac{1}{b}$的正确解释是$a$的平方与$b$的倒数的差.

故选：D.

【考点】

用语言表达代数式的意义，一定要理清代数式中含有的各种运算及其顺序．具体说法没有统一规定，以简明而不引起误会为出发点.

5、C

【解析】

【分析】

观察不难发现，左上角、左下角、右上角为三个连续的偶数，右下角的数是左下角与右上角两个数的乘积减去左上角的数的差，根据此规律先求出阴影部分的两个数，再列式进行计算即可得解.

【详解】

解：根据排列规律，12 下面的数是 14，12 右面的数是 16，

∵8＝2×4-0，22＝4×6-2，44＝6×8-4，

∴$m$＝16×14-12＝212，

故选：C.

【考点】

本题是对数字变化规律的考查，仔细观察前三个图形，找出四个数之间的变化规律是解题的关键.

6、D

【解析】

【分析】

根据题意，阴影部分的周长等于正方形的周长减去 4$d$，再加上 4 个半圆的周长，即可求得答案

【详解】

解：由题意可得：阴影部分的周长$4m+2\pi d-4d$

故选 D

【考点】

本题考查了列代数式，根据题意求得周长是解题的关键.

7、A

【解析】

【分析】

含有相同字母，并且相同字母的指数相同的单项式为同类项，据此分析即可

【详解】

与$2a^2b$是同类项的特点为含有字母$a,b$，且对应$a$的指数为 2，$b$的指数为 1,

只有 A 选项符合；

故选 A.

【考点】

本题考查了同类项的概念，掌握同类项的概念是解题的关键.

8、C

【解析】

【分析】

根据单项式和多项式的定义选出正确选项.

【详解】

A 正确，一个数也是单项式；

B 错误，系数是$\frac{\pi}{2}$；

C 正确，次数是$1+1+2=4$；

D 错误，常数项是-1.

故选：C.

【考点】

本题考查单项式和多项式，解题的关键是掌握单项式的系数、次数的定义，多项式的常数项的定义.

9、B

【解析】

【分析】

根据多项式的次数和项数的概念，逐一判断即可.

【详解】

解：A. $2x+x^2-x^3$ 是三次三项式，不符合题意，

B. $x^2+2xy+y^2$是二次三项式，符合题意，

C. $2\left(m^2-mn\right)$是二次二项式，不符合题意，

D. $a^3+2a^2-1$是三次三项式，不符合题意，

故选 B.

【考点】

本题主要考查多项式的次数和项数，掌握多项式的次数是多项式的最高次项的次数，是解题的关键.

10、D

【解析】

【分析】

根据去括号的法则逐项判断即可求解.

【详解】

解：*A*、$1-(a-b)=1-a+b$，故本选项错误，不符合题意；

*B*、$1+2(a-b)=1+2a-2b$，故本选项错误，不符合题意；

*C*、$1-(a-b)=1-a+b$，故本选项错误，不符合题意；

*D*、$1-(a-b)=1-a+b$，故本选项正确，符合题意.

故选：D.

【考点】

本题主要考查了去括号法则，熟练掌握去括号法则——如果括号外的因数是正数，去括号后原括号内各项的符号与原来的符号相同；如果括号外的因数是负数，去括号后原括号内各项的符号与原来的符号相反是解题的关键.

二、填空题

1、$(\frac{5}{2}x+b+\frac{1}{2})$

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/876043204152011020