

2023-24 年湖南省靖州苗族侗族自治县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题通关秘籍题库附答案【完整版】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2016 年真题）对于有睡眠障碍的抑郁症患者，适宜选用的抗抑郁药是（ ）。

- A: 米氮平
- B: 佐匹克隆
- C: 雷美尔通
- D: 地西泮

答案：A

2. 心衰导致药物经肾排泄减少

- A: 肾血流量减少
- B: 肾小管重吸收增加
- C: 肾小球滤过减少
- D: 肾小管分泌减少

答案：A

3. 甲状腺危象应选用的药物是

- A: 二甲双胍
- B: 格列本脲
- C: 胰岛素
- D: 大剂量碘剂

答案：D

4. 可了解工作效果，并可进一步完善之后工作的咨询服务方法步骤是

- A: 形成答案并以口头形式提供给询问者
- B: 对查阅的资料进行评价、分析和整理
- C: 随访工作效果，并建立档案
- D: 对问题进行确定并归类

答案：C

5. 药物治疗的效果不以货币为单位表示，而是用其他量化的方法表达治疗目的的药物经济学评价方法是

- A: 最大成本法
- B: 成本-效益分析
- C: 成本-效果分析
- D: 最小成本法

答案：C

6. 患儿，男，6 个月，体重 9.0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有乒乓球感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

- A: 智障
- B: 脑瘫
- C: 坏血病
- D: 佝偻病

答案：D

7. 可引起良性颅压增高、囟门隆起

- A: 维生素 A
- B: 氯霉素

C: 苯妥英钠

D: 抗组胺药

答案: A

8. 男性，68 岁，发热伴咳嗽 1 周，表情淡漠，气急，近 2 天全身散在出血点及瘀斑，血压 60/40mmHg，血红蛋白 120g/L，白细胞 $12 \times 10^9/L$ ，血小板 $30 \times 10^9/L$ ，血涂片可见少量红细胞碎片，凝血酶原时间 18 秒（正常值 13 秒），骨髓穿刺示增生活跃，巨核细胞多，诊断为弥散性血管内凝血。

A: 维生素 K1

B: 鱼精蛋白

C: 低分子肝素

D: 维生素 C

答案: B

9. 抑制细菌核酸合成的药物是

A: 磺胺嘧啶

B: 头孢米诺

C: 头孢哌酮

D: 利福喷汀

答案: D

10. 急性尿失禁首选哪种药物

A: 选择性 α_1 受体激动药

B: 钙通道阻滞剂

C: 抗胆碱能药物

D: 非甾体抗炎药

答案: C

11. 从事药学服务的药师应具备沟通能力，此项要求的重要性不包括

- A: 是药师实施药学服务的基本技能
- B: 可使患者获得有关的用药指导
- C: 可提高患者用药的依从性和满意度
- D: 可杜绝投诉事件

答案：D

12. 对磺胺类药物过敏者可以选用的利尿剂是

- A: 乙酰唑胺
- B: 氢氯噻嗪
- C: 依他尼酸
- D: 布美他尼

答案：C

13. 用药期间饮酒可能出现“双硫仑样反应”的药物是（）

- A: 头孢哌酮
- B: 万古霉素
- C: 克拉霉素
- D: 美罗培南

答案：A

14. 美国食品药品监督管理局(FDA)根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别卡托普利在妊娠中晚期使用属于药物妊娠毒性分级

- A: C 级
- B: D 级
- C: B 级

D: A 级

答案: B

15. (血常规检查异常的病症)骨髓增生病

A: 淋巴细胞增多

B: 白细胞增多

C: 血小板增多

D: 红细胞沉降率减慢

答案: C

16. 发现处方存在或潜在的问题、制定并实施干预和改进措施，是

A: 参与健康教育

B: 处方点评

C: 药物信息服务

D: 处方审核

答案: B

17. (2015 年真题) 静脉注射阿昔洛韦的适宜溶媒是 ()。

A: 5%葡萄糖注射液

B: 0.9 氯化钠注射液

C: 50%葡萄糖注射液

D: 复方氯化钠注射液

答案: B

18. 下列药物中，不属于兴奋剂的是

A: 利尿剂

B: 钙通道阻断剂

C: β 受体阻断剂

D: 精神刺激剂

答案：B

19. 下列处方用药应该评判为“无适应证用药”的是

A: 忽略药品说明书提示用药

B: 病因未明用药

C: 感冒、咳嗽、无感染，给予阿奇霉素

D: 应用两种或两种以上一药多名的药物

答案：C

20. 下列关于硫脲类抗甲状腺药不良反应的描述，哪一项是错误的

A: 咽痛、发热

B: 粒细胞缺乏

C: 中毒性肝炎

D: 药疹、瘙痒

答案：A

21. 用体重计算年长儿童的剂量时，一般应选择

A: 剂量的 1/3

B: 剂量的 1/2

C: 剂量的下限

D: 剂量的上限

答案：C

22. 某患者，女性，28 岁，近半年出现面色苍白、头晕、乏力，近日头晕加重，并出现心慌、气短，到医院就诊，血常规检查示 $Hb < 90g / L$ 。

A: 右旋糖酐铁

- B: 叶酸
- C: 富马酸亚铁
- D: 维生素 C

答案：B

23. 患儿，男，5 个月，体重 9.0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有“乒乓球”感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

- A: 维生素 C
- B: 维生素 A
- C: 维生素 B12
- D: 维生素 D

答案：D

24. 以下中毒后药物拮抗的叙述中，属于物理性拮抗的是

- A: 依地酸钙钠解救铅中毒
- B: 弱碱中和强酸
- C: 药用炭吸附
- D: 二巯丙醇解救汞中毒

答案：C

25. 患者，女，56 岁，身高 156m，体重 61kg。空腹血糖 7.8mmol/L，餐后血糖 11.2mmol/L，糖化血红蛋白 6.7%。

- A: 饮食及运动治疗
- B: 口服 α -糖苷酶抑制剂
- C: 口服磺酰脲类降糖药
- D: 口服二甲双胍

答案：D

26. 患者，女，42 岁，因成骨肉瘤使用环磷酰胺甲氨蝶呤联合化疗，用药过程中，者出现出血性膀胱炎。适宜的处理措施是()

- A: 给予糖皮质激素冲击治疗
- B: 停药，水化，给予美司钠治疗
- C: 停药，给予亚叶酸钙治疗
- D: 停药，给予糖皮质激素

答案：B

27. 严重肝功能减退病人常伴功能性肾功能不全，以致使"经肝肾两种途径清除"的药物的血药浓度很高，因此用药原则是

- A: 一般无须调整剂量
- B: 须谨慎使用，必要时减量给药
- C: 尽可能避免使用
- D: 必须减量应用

答案：D

28. 可稀释痰液，并借助咳嗽反射以帮助痰液排出，避免阻塞气道的药品是

- A: 布地奈德
- B: 沙丁胺醇
- C: 羧甲司坦
- D: 扎鲁司特

答案：C

29. 脂肪乳用于急性肝损伤、急性胰腺炎、脂质肾病患者

- A: 无适应证用药
- B: 有禁忌证用药

C: 超适应证用药

D: 过度治疗用药

答案: B

30. 可引起粪便红细胞增多的是

A: 急性胰腺炎

B: 阻塞性黄疸

C: 溶血性黄疸

D: 细菌性痢疾

答案: D

31. 溶栓治疗

A: 巴曲酶

B: 阿司匹林

C: 阿替普酶

D: 低分子肝素

答案: C

32. 治疗艾滋病的非核苷类逆转录酶抑制剂是 ()

A: 拉米夫定

B: 利巴韦林

C: 依非韦伦

D: 阿昔洛韦

答案: C

33. 可刺激胃肠黏膜，引起水肿或充血

A: 脂肪

B: 酒

C: 食盐

D: 食醋

答案: B

34. 下列处方中常见的外文缩写，其含义是"每晚用药"的是

A: qh

B: qn

C: qs

D: qd

答案: B

35. 严重烧伤患者尿常规检查可发现

A: 尿血红蛋白阳性

B: 尿葡萄糖阳性

C: 尿淀粉酶增高

D: 尿胆红素阳性

答案: A

36. (2018 年真题) 患者,男,67 岁,慢性咳喘 20 余年,现因哮喘急性发作就诊,首选的药物是 ()

A: 氨茶碱片

B: 异丙托溴铵气雾剂

C: 沙丁胺醇气雾剂

D: 二羟丙茶碱片

答案: C

37. 乙型肝炎的辅助治疗药物不包括

A: 维生素

B: 谷胱甘肽

C: 多烯磷脂酰胆碱

D: CB 维生素 D

答案：D

38. 主要抑制 L-型钙通道的钙离子内流，减慢窦房结的自律性和房室结传导的药物是

A: 维拉帕米

B: 米力农

C: 去乙酰毛花苷

D: 多巴胺

答案：A

39. 服用氨基糖苷类药时应该禁用的饮食是

A: 食醋

B: 酒

C: 食盐

D: 脂肪

答案：A

40. 长期应用苯二氮（𠂇）类药物不能突然停止使用，因其存在

A: 首剂效应？

B: 毒性反应？

C: 戒断症状？

D: 后遗效应？

答案：C

41. 下列药品可以申请医疗机构制剂的是

- A: 中药、化学药的复方制剂
- B: 中药注射剂
- C: 中药颗粒剂
- D: 生物制品（变态反应原除外）

答案：C

42. 最容易吸湿的药品是

- A: 乙醇
- B: 甘油
- C: 叶酸
- D: 鱼肝油乳

答案：B

43. （2018 年真题）某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮 3mg 和炔雌醇 0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

- A: 尽快同时服用两片药，然后在常规时间继续服药，在以后的 7 天内要加用屏障避孕法
- B: 到 21 日 20:00 再同时服用两片药，然后在常规时间继续服药
- C: 尽快补服一片，然后在常规时间继续服药
- D: 不再继续服用此周期药物，经过一个 7 天的停药期，再开始继续服用下一周期的药物

答案：C

44. 患儿，男，12 岁，患有常年性过敏性鼻炎，药师推荐使用布地奈德鼻喷雾剂。关于用药剂量和使用方法，正确的是

- A: 每侧鼻孔 128 μg （两喷），早、晚各一次，取得效果后改为每日睡前每侧鼻孔喷入 128 μg

B: 每侧鼻孔 $64\mu\text{g}$ （一喷），早、晚各一次，取得效果后改为每日早晨每侧鼻孔喷入 $64\mu\text{g}$

C: 每侧鼻孔 64μ （一喷），早、晚各一次，取得效果后改为每日睡前每侧鼻孔喷入 $64\mu\text{g}$

D: 每侧鼻孔 $128\mu\text{g}$ （两喷），早、晚各一次，取得效果后改为每日早晨每侧鼻孔喷入 $128\mu\text{g}$

答案：B

45. 牙痛等轻度疼痛宜选用的药物是

A: 阿司匹林

B: 可待因

C: 多奈哌齐

D: 吗啡

答案：A

46. 血清 γ -谷氨酰转移酶正常参考区间是

A: 成人 $<50\text{U/L}$

B: 男性 $11\sim 50\text{U/L}$

C: 成人 $<40\text{U/L}$

D: 男性 $<40\text{U/L}$

答案：B

47. 癫痫的药物治疗适用于各型癫痫的药物

A: 卡马西平

B: 丙戊酸钠

C: 苯妥英钠

D: 拉莫三嗪

答案：B

48. 患者，女，38 岁，主诉：咳嗽、咳痰、高热、乏力 2 日；查体：神清、气稍促，心律 95bpm，律齐，体温 39.1℃，血压 110 / 70mmHg；心肺听诊：两肺呼吸音粗，未及明显啰音；发病以来胃纳差、精神欠佳、二便可、夜眠可。诊断：急性上呼吸道感染。

A: 对于干性咳嗽可单用镇咳药；对痰液较多者应以祛痰为主，镇咳药合用祛痰剂。以利于痰液排出和加强镇咳效果

B: 对支气管哮喘时的咳嗽宜适当合用平喘药，缓解支气管痉挛，并辅助镇咳和祛痰

C: 右美沙芬可引起嗜睡，驾车、高空作业或操作机器者宜慎用；妊娠期妇女、严重高血压者、有精神病史者禁用

D: 镇咳药连续口服 1 周，症状未缓解或消失可改用肾上腺皮质激素

答案：D

49. 减轻前列腺张力和膀胱出口梗阻的是（）

A: 特拉唑嗪

B: 哌唑嗪

C: 索利那新

D: 度他雄胺

答案：A

50. 下列处方用药中，应该评判为"禁忌证用药"的是

A: 坦洛新用于降压

B: 应用两种或两种以上一药多名的药物

C: 治疗感冒、咳嗽给予抗菌药

D: 脂肪乳用于急性肝损伤、脂质肾病、脑卒中

答案：D

51. 患者，女，45 岁，既往有扩张型心肌病，近 1 年出现劳累性呼吸困难，1 天前因感冒出现发热、咳嗽、咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。肺动脉瓣区第二心音亢进及舒张早期和中期奔马律。根据该患者临床表现，最可能的诊断为

- A: 大叶性肺炎
- B: 急性心肌炎
- C: 支气管肺炎
- D: 急性左心衰竭

答案：D

52. 成年人血清中高密度脂蛋白胆固醇含量是

- A: 0.56~1.70mmol / L
- B: 3.1~5.7mmol / L
- C: 2.1~3.1mmol / L
- D: 1.03~2.07mmol / L

答案：D

53. 通过阻断 β 受体，同时具有血管扩张作用的非苷类药物是

- A: 地高辛
- B: 卡维地洛
- C: 米力农
- D: 洋地黄毒苷

答案：B

54. 以下用于治疗寻常型痤疮的药物中，属于非处方药的是

- A: 阿达帕林
- B: 维胺酯

C: 过氧苯甲酰

D: 异维 A 酸

答案: C

55. 依据 CTP 评分，肝功能不全 B 级病人用药剂量为正常患者剂量的

A: 40%维持剂量

B: 50%维持剂量

C: 25%维持剂量

D: 30%维持剂量

答案: C

56. 对中重度痤疮伴感染显著者推荐使用

A: 0.1%阿达帕林凝胶

B: 10%过氧苯甲酰凝胶

C: 红霉素-过氧苯甲酰凝胶

D: 0.03%维 A 酸乳膏剂

答案: A

57. 血脂调节药的合理应用主要用于高胆固醇血症，尤其是黄色瘤患者的是（）

A: 普罗布考

B: 他汀类与贝特类联用

C: 依折麦布

D: 伊曲康唑

答案: A

58. 宜于睡前服用的药品是

A: 糖皮质激素

- B: 阿卡波糖
- C: 洛伐他汀
- D: 甲氧氯普胺

答案：C

59. (2015 年真题) 下列药品宜冷处贮存但不宜冷冻的是 ()。

- A: 卡前列甲酯栓剂
- B: 甘露醇注射液
- C: 双歧三联活菌制剂
- D: 氯化钾注射液

答案：C

60. 用于房颤患者血栓栓塞的预防药物首选

- A: 华法林
- B: 氯吡格雷
- C: 维生素 K
- D: 阿司匹林

答案：A

61. 普通处方一般不得超过几日用量

- A: 7
- B: 5
- C: 1
- D: 3

答案：A

62. 患者，男，59 岁，哮喘病史 8 年，近日因急性脑梗死就诊住院治疗 2 周后出院。对于该患者脑血管病的二级预防，宜选用的抗血小板药物是()

- A: 氯吡格雷
- B: 阿司匹林
- C: 华法林
- D: 对乙酰氨基酚

答案：A

63. 属于拓扑异构酶抑制剂是

- A: 培美曲塞
- B: 放线菌
- C: 顺铂
- D: 依托泊苷

答案：D

64. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160/105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol/L(参考范围<7.8mmol/L)，甘油三酯

1.2mmol/L(参考范围 0.56~1.70mmol/L)，总胆固醇 6.26mmol/L(参考值范围<5.2mmol/L)，低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol/L(参考值范围 2.1~3.1mmol/L)，高密度脂蛋白胆固醇为 20mmol/L(参考值范围 1.2~6.5mmol/L)，肌酐 60 μ mol/L(参考值范围 45~84 μ mol/L)。蛋白尿：++。临床诊断为高血压、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 非诺贝特
- B: 阿托伐他汀
- C: 依折麦布
- D: 普罗布考

答案：B

65. 下列不良事件中，属于假劣药事件是()

- A: 康泰克 PPA 事件
- B: 拜斯亭(西立伐他汀)事件
- C: 万洛(罗非昔布)事件
- D: 亮菌甲素事件

答案: D

66. 用药与反应发生时间关系密切，有文献资料佐证；但引发 ADR 的药品不止一种，或原患疾病病情进展因素不能除外；可评价为

- A: 很可能
- B: 待评价
- C: 可能
- D: 可能无关

答案: C

67. 属于 M 受体阻断剂的是

- A: 美托洛尔
- B: 乙酰胆碱
- C: 异丙托溴铵
- D: 福莫特罗

答案: C

68. 患者，男，35 岁。血压 180/100mmHg，经服硝苯地平及血管紧张素转化酶抑制剂治疗 3 周后血压降至 120/80mmHg，关于停药的问题应是

- A: 继续服药，血压平稳控制 1~2 年后再逐渐减少剂量至停药 1 种药，如血压不稳定，即表明需长期服用能保持血压稳定的最小剂量
- B: 为避免血压下降过低，应停药

C: 停药后血压增高再服

D: 可以停服降压药

答案：A

69. 患者,男,58岁,体重68kg,高血压病史5年。5天前出现咳嗽、咳痰,伴发热,入院查体 BP: 120/80mmHg, T38.9℃。化验结果:白细胞计数 $14.6 \times 10^9/L$, 中性粒细胞百分比 86%。胸片示:右下肺纹理增粗,诊断为社区获得性肺炎,青霉素皮试阳性。

A: 哌拉西林

B: 阿奇霉素

C: 头孢他啶

D: 头孢曲松

答案：C

70. (2016年真题) 患者,男,60岁,呈典型的“面具脸”,“慌张步态”及“小字症”表现,确诊为帕金森病,患者同时患有闭角型青光眼,不宜选用的治疗帕金森病的药物是()。

A: 普拉克索

B: 司来吉兰

C: 多奈哌齐

D: 左旋多巴

答案：D

71. 患者,男,50岁。临床诊断慢性肾衰竭(尿毒症期),进行肾移植治疗,配合应用免疫抑制剂他克莫司,其初始剂量为

A: $0.05 \sim 0.15 \text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$

B: $0.02 \sim 0.03 \text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$

C: $0.75 \sim 1 \text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$

D: 2~5mg/ (kg • d)

答案：A

72. 宜于餐中服用的药品是

A: 糖皮质激素

B: 阿卡波糖

C: 洛伐他汀

D: 甲氧氯普胺

答案：B

73. 根据时辰药理学，选择最适宜的给药时间，可增强药物疗效、避免不良反应、提高用药依从性以保证正常起居(避免夜尿过多)的是

A: 清晨服糖皮质激素

B: 清晨服利尿药

C: 清晨服抗抑郁药

D: 清晨服氨基糖苷类

答案：B

74. 在日常饮食因素中，对高血压患者用药疗效影响最大的是

A: 饮茶

B: 高糖

C: 食醋

D: 食盐

答案：D

75. 可引起 A/G 比值<1 的是

A: 自身免疫性疾病如风湿热、红斑狼疮等

B: 慢性肝炎、肝硬化、肝实质性损害

C: 摄入不足、消化不良时

D: 各种原因脱水所致的血液浓缩

答案: B

76. 下列关于药物对孕妇的影响哪一项是错误的

A: 受精后半个月内，几乎见不到药物的致畸作用

B: 孕妇不应过量服用含咖啡因的饮料

C: 孕妇患有结核、糖尿病应绝对避免药物治疗以防胎儿畸形

D: 受精后 3 周至 3 个月接触药物，最易发生先天畸形

答案: C

77. pH 碱性的感染尿液常见

A: 酪氨酸和亮氨酸结晶

B: 磷酸盐结晶

C: 草酸盐结晶

D: 尿酸盐结晶

答案: B

78. 患者，女，18 岁，近半年来食欲亢进，多汗，体重明显减轻，伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤，心率 104 次 / 分。化验结果：血清促甲状腺激素（TSH） $<0.1\text{mU/L}$ ，FT3、FT4 明显升高，肝、肾功能基本正常，白细胞计数正常。诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是

A: 碘化钾治疗，定期复查

B: 选用放射性 ^{131}I 治疗

C: 注意休息与补充营养，使用甲巯咪唑治疗

D: 甲状腺全切除手术

答案: C

79. 心衰治疗中能够快速控制体液潴留的药物是（）

- A: 肾上腺素
- B: β 受体阻断剂
- C: 阿托品
- D: 利尿剂

答案：D

80. 可用于强心苷类中毒后快速型心律失常的药物是

- A: 阿托品
- B: 胺碘酮
- C: 异丙肾上腺素
- D: 利多卡因

答案：D

81. （2017 年真题）药师在审核处方时，无需要求确认或重新开处方的情形是（）

- A: 给糖尿病患者同时开具消渴丸和格列本脲
- B: 头孢曲松钠选用复方氯化钠注射液作溶媒
- C: 将酚麻美敏胶囊和板蓝根颗粒开在同一张处方上
- D: 诊断为麻疹，使用阿莫西林抗感染治疗

答案：C

82. 患者在使用丙成酸钠时应监测血药浓度，适宜的血药浓度范围是（）

- A: 10~20ug/ml
- B: 4~12ug/ml
- C: 10~40ug/ml

D: 50~150ug/ml

答案：D

83. (2015 年真题) 下列关于脑梗死急性期药物治疗的说法，正确的是 ()。

- A: 血小板计数 $<100 \times 10^9/L$ 时应禁用溶栓药
- B: 应在使用溶栓药的同时联合使用阿司匹林
- C: 甘油果糖脱水作用较甘露醇强且快
- D: 急性脑梗死的溶栓治疗时间窗是 48 小时内

答案：A

84. 患者，女，48 岁，有高血压病史，右上肢震颤，呈静止性，紧张时加重，睡眠时消失，诊断为帕金森病。服用复方左旋多巴治疗，症状一度好转又反复加重，随后加大复方左旋多巴剂量，并加用苯海索治疗。患者同时服用氨氯地平、缬沙坦等药物控制血压。近日出现运动症状波动，伴有异动症。导致该不良反应的药物是

- A: 左旋多巴
- B: 苧丝肼
- C: 氨氯地平
- D: 苯海索

答案：A

85. 适用于有完整子宫、绝经后期不希望有月经样出血的妇女 ()

- A: 单纯雌激素补充治疗
- B: 雌孕激素序贯用药
- C: 单纯孕激素补充治疗
- D: 雌孕激素连续联合用药

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/876044223105011030>