

急救理论知识考试题与答案

1、重度创伤病人死亡的常见原因是（）

- A、化脓性感染
- B、休克
- C、急性肾功能衰竭
- D、应激性溃疡
- E、成人呼吸窘迫综合症

答案：B

2、闭合性肋骨骨折的治疗要点是（）

- A、止痛、防治并发症
- B、胸腔穿刺
- C、胸腔闭式引流
- D、开胸探查
- E、气管插管或气管切开

答案：A

3、双人进行胸外心脏按压时与人工呼吸的比例是（）

- A、2:1
- B、5:1
- C、4:1
- D、15:2
- E、6:1

答案：B

4、心脏复苏时，使心脏复跳效果最佳的药物是（）

- A、异丙肾上腺素
- B、肾上腺素
- C、利多卡因
- D、去甲肾上腺素
- E、阿托品

答案：B

5、支气管哮喘转送注意事项哪个不正确（）

- A、吸氧；
- B、保持静脉通道通畅；
- C、途中严密观察神志、呼吸、血压、心率、心律等变化；

D、给予强心药。

答案：D

答案：E

46、有关雷击伤说法哪个是错误的？（）

A、雷击伤可出现皮肤闪电纹

B、可造成心跳停止

C、雷击放电时间约为 100~500ms

D、可造成鼓膜穿孔，视网膜剥离

答案：C

47、休克患者应用血管扩张剂前，应掌握的原则（）

A、测量中心静脉压

B、补充血容量

C、观察神志

D、控制输液

E、测量血压

答案：B

48、急诊科的适宜观察床数量应为医院床位数的（）

A、12%

B、23%

C、34%

D、45%

答案：B

49、患者，女性，20岁，I型糖尿病3年。近日恶心、呕吐、头痛、嗜睡、深快呼吸，呼气可闻烂苹果。患者出现的可能情况是（）

A、糖尿病酮症酸中毒

B、呼吸衰竭

C、颅内压升高

D、低血糖

E、脑血管意外

答案：A

50、关于慢性肾功能衰竭时的心律失常，下列哪项是错误的（）

A、可因高钾血症引起

B、可因低钾血症引起

- C、可有窦性静止、窦房传导阻滞、室性自搏心律
- D、可因高钙血症引起
- E、可有室性早搏、室性心动过速、室颤

答案：D

51、烧伤后病人出现休克症状时，最早的治疗措施中，下列哪项是错误的

- A、立即转往有条件的医院治疗
- B、镇静止痛
- C、立即静脉输液
- D、保护创面，防止再损伤
- E、注意合并伤的诊断及处理

答案：A

52、上臂上止血带的标准部位（）

- A、上臂的上 1/3
- B、上臂的上 1/4
- C、上臂的上 1/2
- D、上臂的上 1/5

答案：A

53、可除颤心律不包括：（）

- A、无脉室速
- B、室颤
- C、室扑
- D、电机械分离

答案：D

54、患者，女，58岁，反复胸痛收入ICU，拟“冠心病，心绞痛”，给予静脉滴注硝酸甘油，2h后突然发生剧烈胸痛，伴呕吐，体检：患者无反应，脉搏测不出，心电监护示室颤。下列那一项是最有可能的诊断（）

- A、心肌梗死
- B、心源性休克
- C、心脏骤停
- D、充血性心衰
- E、心绞痛

答案：C

55、颅高压的三主征是（）

- A、无痛、呕吐、眩晕
- B、头痛、呕吐、癫痫
- C、头痛、呕吐、视乳头水肿
- D、头痛、呕吐、精神症状

答案：C

56、院前急救处理病人时遵循从 的顺序最为可靠。（）

- A、躯干到四肢
- B、头到脚
- C、哪里出血先处理哪里
- D、个人习惯

答案：B

57、颅后窝骨折时，常发生。（）

- A、鼻漏
- B、耳漏
- C、鼻漏或耳漏
- D、均能发生

答案：B

58、患者，女，28岁，看电视时突觉右侧上下肢不能活动，不能言语，无呕吐，无抽搐，有风湿性心脏病十年。最可能的诊断是（）

- A、脑出血
- B、TIA
- C、脑血栓形成
- D、脑栓塞
- E、蛛网膜下腔出血

答案：D

59、初次腹腔穿刺后放腹水量时一般不要超过（）（）

- A、1000ml
- B、2000ml
- C、3000ml
- D、4000ml
- E、5000ml

答案：C

60、使用台式血压计测量病人血压时，充气至动脉搏动音消失，再加压使压力升高（）mmHg，缓慢放气，测得血压数值并记录。（）

- A、 15~20
- B、 10~20
- C、 15~30
- D、 20~30

答案： D

61、判断休克已纠正除血压恢复正常外，尿量每小时至少应稳定（）

- A、 25mL 以上
- B、 30ml₂, 以上
- C、 35mL 以上
- D、 40ml 以上
- E、 45mL, 以上

答案： B

62、下列哪一种临床类型不是毒覃中毒的类型（）

- A、 胃肠炎型
- B、 神经型
- C、 神经异常型
- D、 溶血型
- E、 肾坏死型

答案： E

63、28岁初产妇，妊娠39周胎儿经阴道娩出后，立即出现多量阴道流血，色鲜红，持续不断。最可能的病因诊断应为（）

- A、 子宫收缩乏力
- B、 软产道裂伤
- C、 凝血功能障碍
- D、 植入胎盘部分剥离
- E、 以上都不是

答案： B

64、心脏骤停的病理生理机制最常见的是（）

- A、 心室颤动
- B、 室性心动过速
- C、 电机械分离
- D、 第三度房室传导阻滞
- E、 心室停顿

答案： A

65、大咯血病人药物止血应首选（）

- A、安络血
- B、止血敏
- C、垂体后叶素
- D、酚妥拉明
- E、以上都不是

答案：C

66、男，57岁。2个月来清晨常出现头痛，癫痫发作4次，经检查诊断为颅内占位性病变、颅内压增高，行开颅手术。压增高的典型表现为（）

- A、头痛、呕吐、食欲缺乏
- B、头痛、呕吐、抽搐
- C、头痛、抽搐、呕吐、意识障碍
- D、头痛、呕吐、视盘水肿
- E、头痛、抽搐、血压增高

答案：D

67、抑制哮喘气道炎症的首选药物是（）

- A、拟肾上腺素类药物
- B、黄嘌呤类药物
- C、色甘酸钠
- D、糖皮质激素
- E、酮替芬

答案：D

68、患者女性，26岁。于2000年4月20日因“出血性休克、宫外孕”急诊手术。入手术室时，神志清，T 37.2℃，P 92次/分，BP 100/60mmHg，硬膜外麻醉成功后，突然出现意识丧失，面色苍白，口唇四肢末梢严重发绀，脉搏、心音、血压均测不出，血氧饱和度迅速下降至20%。应该立即对患者进行（）

- A、补充血容量
- B、心肺复苏
- C、心电监护
- D、吸氧
- E、送医院急救

答案：B

69、对氧治疗的描述，下列哪项是错误的（）

- A、以纠正低氧血症和提高氧供为目的
- B、重度通气障碍对氧治疗较敏感，疗效较好

- C、轻度肺部感染对氧治疗较敏感，疗效较好
- D、当肺泡完全萎陷时，氧治疗效果很差
- E、当肺泡血液灌流完全停止，氧治疗效果很差

答案：D

70、处理烧伤或烫伤的部位时，应立即（）

- A、用缓慢及流动的冷水冲洗
- B、将贴着身体的衣物除去
- C、将水泡刺穿
- D、让伤者多饮水

答案：A

71、心肺复苏指南建议对婴儿实施双人 CPR 均按照（）的比例给予按压和通气。（）

- A、 5:1
- B、 15:2
- C、 30:2
- D、 15:1
- E、 20:1

答案：B

72、频发室性期前收缩的定义是（）

- A、室性期前收缩 $>5/h$
- B、室性期前收缩 $>10/h$
- C、室性期前收缩 $>30/h$
- D、室性期前收缩 $>60/h$
- E、室性期前收缩 $>100/h$

答案：C

73、以下关于胸外心脏按压术的叙述哪项是错误的（）

- A、下压比向上放松的时间长一倍
- B、按压部位在胸骨中下 1/3 交界处
- C、按压部位的定位先确定胸骨下切迹
- D、按压频率为 100 次/min
- E、按压与放松时，手不能离开胸骨定位点

答案：A

74、患者，女，23 岁。因路人发现晕倒在地而送来急诊，体检：神志恍惚，瞳孔缩小，呼出气无特殊气味，心率 120 次/分，律齐，BP90/60mmHg，上臂可见多处

注射针眼、该患者最有可能的诊断是（）

- A、有机磷中毒
- B、鸦片类中毒
- C、乙醇中毒
- D、口服地西洋中毒
- E、以上都不是

答案：B

75、下列关于开放性气胸的治疗正确的是（）

- A、封闭伤口
- B、胸腔引流
- C、预防张力性气胸
- D、清创
- E、以上都是

答案：E

76、病人，男，75岁，因腹部刀刺伤致肝、脾破裂入手术室行肝破裂修补、脾切除腹腔冲洗引流术，术后入1CU病房。现病人神志淡漠，四肢皮肤有花斑，皮温凉，CVP:4cmH₂O，BP:70/50mmHg，HR:125次/分，尿量<20ml/h。实验室检查：红细胞 $3.0 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白80g/L，WBC: $4.1 \times 10^9/L$ 既往冠心病病史。该病人自觉冷，下列措施不正确的是（）

- A、加盖棉被
- B、用毛毯保暖
- C、将输入液体加温
- D、调节病室内温度
- E、用热水袋、电热毯

答案：E

77、急性心肌梗死并发心源性休克的主要原因是（）

- A、血管床增大而有效循环血量不足
- B、窦性心动过速
- C、心排血量急剧降低
- D、周围血管扩张
- E、迷走神经兴奋性增加

答案：C

78、搬运脊椎骨折病人严禁使用软担架的原因是（）

- A、使骨折加重，脊髓神经受损

- B、造成颈部损伤
- C、病人感到不舒服

答案：A

79、病人呼出气味中有大蒜味，应考虑：（）

- A、尿毒症
- B、酮症酸中毒
- C、有机磷农药中毒
- D、肺癌
- E、绿脓杆菌感染

答案：c

80、处理骨折患者时，应首先掌握的原则是（）

- A、抢救生命
- B、妥善处理伤口，并简单有效固定
- C、迅速安全转移伤员
- D、输液并输血
- E、立即将骨折端嵌入进行复位

答案：A

81、关于心电图的价值，下列哪项不正确？（）

- A、能确诊心律失常
- B、能反映心功能状态
- C、辅助诊断房室肥大
- D、辅助诊断电解质紊乱
- E、能确诊心肌梗塞

答案：E

82、二尖瓣狭窄合并房颤，心室率 120 次/分，首选治疗是（）

- A、利尿剂以减轻心脏前负荷
- B、硝普钠以扩张血管
- C、西地兰控制心室率
- D、吸氧改善缺氧
- E、二尖瓣分离术解除机械梗阻

答案：C

83、女性，46岁，右上腹绞痛伴寒战高热（39℃），两日来精神淡漠，体检：皮肤巩膜黄染，P 120 次/分，Bp 11.6/8.0 kPa（89 / 60mmHg），右上腹有压痛，肌紧张，WBC 30X10⁹ /L，N 92%，最合适的诊断为：（）

- A、肝外胆管结石合并感染

- B、肝内肝管结石
- C、胆道蛔虫病
- D、急性梗阻性化脓性胆管炎

答案：D

84、风心病二尖瓣狭窄，出现哪项体征提示心力衰竭（）

- A、心尖部收缩期抬举性搏动
- B、交替脉
- C、拍击性第一心音
- D、肺动脉瓣区第二心音亢进

答案：B

85、男性，45岁。少量饮酒后，突然大口呕吐鲜血1500ml。否认肝炎史。检查：血压10/5 kPa（75 / 50 mmHg），P 130次/分，眼结合膜苍白。肝不大，脾肋下触不清。腹水（十十）。Hb 50g/L, 该病人最适宜的诊断方法是：（）

- A、急症钢餐透视
- B、急症内窥镜检查
- C、选择性腹腔动脉造影
- D、双囊三腔管压迫试验

答案：D

86、现场救治中首先应（）

- A、呼吸支持
- B、伤员分类
- C、循环支持
- D、判断伤情
- E、通知医疗机构

答案：A

87、男，56岁，因胸骨后压榨样疼痛1小时，急诊来院。体检：血压100/60 mmHg, 心率194次/分，心音低。心电图显示：P波无法辨认，QRS波宽大畸形，连续节律基本规则，下列哪一种药为急用首选（）

- A、心律平
- B、乙胺碘呋酮
- C、利多卡因
- D、心得安
- E、溴苄胺

答案：C

88、在对心跳呼吸骤停患者进行基本生命支持时，以下哪种说法不正确。

()

A、用 6T0 秒（不超过 10 秒）检查是否存在正常呼吸；

B、对除怀疑颈椎损伤的所有病人使用仰头抬颌法开放气道；

C、如果人工通气未使胸廓起伏，应继续进行人工通气直到有效胸廓起伏；

D、每名急救人员最好只连续进行 2 分钟左右的胸外按压后轮换，以保证 按压质量。

E、对怀疑颈椎损伤的所有病人使用双手推举下颌法开放气道；

答案：C

89、当你游泳离岸较远时，小腿抽筋，你该怎么办？ ()

A、用力在水中拼命蹬脚

B、深吸一口气，把头潜入水中，两手抓住脚尖，用力向自身方向拉，一次 不行，可反复几次

C、拼命游回岸边

答案：B

90、关于现场救护体位摆放，以下哪项不妥？ ()

A、无意识、无呼吸、无心跳者，应置于复苏体位

B、神志不清有呼吸和循环者，应置于恢复体位

C、咯血者，应置于患侧卧位

D、毒蛇咬伤下肢时，要将患肢提高

E、腹痛者屈双膝于腹前

答案：D

91、创伤性休克早期常可出现 ()

A、血液浓缩

B、血液稀释

C、呼吸性酸中毒

D、代谢性酸中毒

E、多尿

答案：A

92、大面积烧伤病人休克期调节补液量最可靠的临床指标是 ()

A、血压

B、每小时尿量

C、脉率

D、口渴、烦躁等临床表现

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/876105014054010041>