2020 年医学公共基础知识考试 288 题[含答案]

一、填空题

1．慢性汞中毒的主要临床表现为（脑衰综合症）（震颤）（口腔牙龈炎）

2．高浓度给氧是指吸入氧浓度为（>60%）。中浓度给氧是 指吸入氧浓度为（40%~60%）。低浓度给氧是指吸入氧浓度（24%~40%）。

3．正常人平卧时，颈静脉充盈的水平限于锁骨上缘至下颌角距离的（下 2\3 处）。

4．正常人体温，口表为（36.3°~37.2°），肛表比口高（0.3°~0.5°）

5．在医学科研中率的标准化，经常要采用全国人口的性病年龄构成，其理由是（便于进行比较）。

6．统计资料的类型有（数值变量）（分类变量）（变量的转化）。

7．环境污染的来源有（生产性污染）（生活污染）（其他污染）。

8．成年人正常血压范围为（90~139\60~89mmHg）

9．硅沉着病的基本病理改变是：（肺组织纤维化）和（矽结节）。

10．正常人胸廓前后径为横径之比为（1:1.5）

11．地方性氟中毒的主要临床表现有（氟骨症）（氟斑牙）

12．必需脂肪酸有（6---系亚油酸）和（w—3 系 a—亚麻酸）

13．饮用水的卫生学要求是：（流行病学上安全）（感官性状良好）（化学性状良好）(不含任何有害化学物质)

14．普奈落尔抗高血压的主要作用机制是（减少心排血量）（抑制肾素分泌）（降低外周交感神经活性）（中枢降压作用）。

15．异烟肼对神经系统的主要不良反应是（外周神经炎）和（中枢神经系统症状）

16. 最早应用的该拮抗药中对心肌抑制较弱而扩血管作用较强的是（硝苯地平），常用于治疗高血压，亦用于防治（变异）型心绞痛。

17. 血管舒张药物治疗慢性心功能不全的主要机制是（舒张小动脉降低后负荷）（舒张静脉降低前负荷）

18. 刺激性气体对人体最严重的危害是引起（肺水肿）。

19. 臂大肌注射时，定位方法有两种：十字法：（从臂顶点向左右侧画一水平线）；连线法（与从 髂　嵴最高点作一垂直平分线外上四分之一处取髂 前上棘和尾骨联线的三分之一处）

20. 成人胃管插入深度一般为（45~55）cm

21. 耻骨上膀胱穿刺引流术，穿刺部位应选择在（耻骨联合上 2 横指中线处）。

22. 心包穿刺抽液，一般每次不宜超过 20M1,是由于（一次抽液过多，可引起回心血流增加，导致急性肺水肿）。

23. 压颈试验（奎氏试验）的目的是（了解椎管内有无阻塞）。

24. 胸骨穿刺部位在（胸骨中线第 2 肋间水平）。

25. 2 岁以下的小孩，骨髓穿刺部位最好选择在（胫骨粗隆前下方）。

26. 正常人心尖搏动位于（左第五肋间隙锁骨中线内侧 0.5~1cm）

27. 肘静脉压的正常值是（0.29~1.42kPa）30~145mmH20

28. 碱化尿液，可是苯巴比妥钠从肾排泄（增加），使水杨酸盐从肾排泄（增加）

29. 正常体重为理想体重的（+\—10%）。超过正常体重（20%）为肥胖

30. 腭扁条体位于软腭两侧的（舌腭弓）（咽腭弓）之间

31. 腋窝淋巴结引流（躯干上部）.（乳腺）及（胸壁）的淋巴液

32. 肺动脉瓣区第二心音分裂受呼吸的影响，一（吸气末）最响

33．心脏听诊时听诊器的使用，钟式胸件适合于（低频杂音），膜式胸件适合于（高频杂音）

34．肺部检查望诊呼吸应注意呼吸的（类型）（深度）（频率）（节律）（运动受限）

35．腹部深触诊法包括（单手深部滑行触诊法）（双手触诊法）（深压触诊法）（冲击触诊法）（钩指触诊法）。

36．胸腔闭式引流，玻璃管插入水封瓶液面下 2~3cm，则胸腔内压应为（2~3cm）cmH2o

37．我国卫生标准规定，每 1000mL 饮用水中不得超过（3）个大肠菌群数。

38．免疫球蛋白根据其重链抗原性不同而分为（IgG）(IgM)(IgA)(IgD)(IgE).

39．抗原与抗体接合要有（特异性）。

40．革兰阳性细菌镜下观察为（蓝）色，而革兰阴性细菌镜下观察为（红色）。

41．完全抗原具有（免疫原性）和（抗原性）两种。

42．免疫的基本功能是（免疫防御）（免疫稳定）(免疫监视)

43．病毒传播方式有（水平传播）（垂直传播）。

44．心房颤动首选（强心苷），窦性心动过速宜选用（普萘洛尔）。

45．衣原体具有独特的生活周期。原体具有（感染性），而始体则为（繁殖体）。

46．OT 试验阳性说明人体对（结核分枝杆菌）有免疫力。

47．写出与下列疾病相关的病毒：原发性肝癌：（HBV）；宫颈癌（HSV—II）;鼻咽癌（EBV）；尖锐湿疣（HPV）。

48．原核细胞型微生物包括（细菌）（立克次体）（衣原体）（支原体）（放线菌）（螺旋体）。

49．外毒素的化学成分是（蛋白质），内毒素的化学成分是（脂多糖）。

50．灭菌是指杀灭（病原微生物的繁殖体和芽胞）的方法。

51．鉴别葡萄球菌有无致病性的重要指标是测定（血浆凝固酶）。测定人体对结核分枝杆菌有无免疫力可用（OT）试验。

52．细菌基因转移与重组方式有：（转化）（转导）（溶性转换）（接合）

53．细菌的特殊结构有：（芽胞）.（鞭毛）.（荚膜）（菌毛）。

54．病毒复制周期包括（吸附）.（穿入）（脱壳）（生物合成）（装配成熟与释放）5 个步骤。

55．黄疸时巩膜和皮肤较易被感染，这是因为它们富含与胆红素亲和力较强的（弹性蛋白）。

56．需用电子显微镜才能观察到的细菌特殊结构是（菌毛）。细菌繁殖的方式为（二分裂），对热抵抗力最强的病毒为（HBV）。

57．a.B 受体激动药有（肾上腺素），拮抗药有（拉贝洛尔）。

58．哌唑嗪选择性阻断（a1）受体，美托洛尔则选择性阻断（B1）受体。

59．毛果芸香碱有（缩）瞳作用，机制是（激动虹膜括约肌 M 受体）；去氧肾上腺素有（扩）瞳作用，机制是（激动虹膜开大肌的 a 受体）。

60．（PaCO2）是反映呼吸性酸碱平衡紊乱的重要指标。

61．体内外液体交换平衡失调会导致（钠水潴留）。

62．成人 24 小时尿量少于（400）mL，称为少尿，24 小时尿量超过（2000）mL，称为多尿。

63．需补体参与的超敏反应有（II）型和（III）型。

64．肝细胞性黄疸血清中酯型胆红素（增多），非酯型胆红素（增多），尿中尿胆原（增多），尿胆红素（阳性）。粪色（变浅）。

65．人工自动免疫进入人体的物质是（抗原）。

66．肝性脑病时，引起血氨升高的原因是（氨清除不足）.（氨生成过多）

67．在休克期出现微循环（淤血），其组织灌流特点是（灌而少流）（灌多于流）。

68．弥散性血管内凝血 DIC，指在某些致病因子作用下，（凝血因子）或（血小板）被激活，大量可溶性促凝物质入血，而引起一个以（凝血功能失常）为主要特征的病理过程。主要临床表现为（出血）（休克）（脏器功能障碍）（溶血性贫血）。

69．根据发热的病因不同，发热可分（感染性发热）和（非感染性发热）两大类型。前者是由（各种生物病原体）引起，后者右（生物性病原体以外的因素）引起。

70．根据缺氧的原因和血氧的变化，一般将缺氧分为（低张性缺氧）.（血液性缺氧）(循环性缺氧)（组织性缺氧）四种类型。低张性缺氧的动脉血氧分压（下降），血氧饱和度（下降），血氧容量（正常），血氧含量（下降）。

71．碱中毒时血浆游离 Ca2+浓度（降低），神经肌肉兴奋性（升高），病人可出现（手足抽搐）。

72．能增强磺胺药疗效的药物是（甲氧苄啶）其作用原理是（抑制二氢叶酸还原酶）。

73．引起慢性肾衰竭的疾病中，以（慢性肾小球肾炎）最常见。除此之外，还要许多其他疾病也可引起慢性肾衰竭，它们共同的发病环节是（大量肾单位被破坏）。

二、单选题

74．阑尾是附着于何种器官之上的？(C)

A.空肠 B.回肠 C.盲肠 D.十二指肠

75．呼吸系统的功能主要是(A)

A.进行气体交换 B.进行水液代谢 C.呼出氧气，吸入二氧化碳 D.进行血液循环

76．神经系统的基本结构和功能单位是\(B)

A.神经胶质 B.神经元 C.神经纤维 D.神经轴突

77．胆盐对胆汁分泌的作用是(A)

A.促进胆汁分泌 B.减慢胆汁的分泌 C.促进胆汁合成 D.以上均不对

78．胆盐进入小肠后，90%以上被回肠末端粘膜吸收，通过门静脉又回到肝脏，再成为合成胆汁的原料，然后胆汁又分泌入肠，该过程称为(B)

A.回收利用 B.肠肝循环 C.门脉循环 D.肝胆循环

79. 下列哪项不是胆汁的生理功能？(D)

A.乳化脂肪 B.中和胃酸 C.刺激肠蠕动 D.调节情绪

80. 胆汁由何种细胞分泌？(B)

A.胆细胞 B.肝细胞 C.上皮细胞 D.间质细胞

81. 神经纤维的结构有轴突以及(A)

A.髓鞘 B.胞体 C.树突 D.轴突

82. 以下哪项不是肝脏的生理功能？(D)

A.代谢的枢纽 B.解毒 C.分泌胆汁 D.产生抗体

83. 下列哪项不是神经胶质细胞的功能？(D)

A.支持作用 B.修复和再生作用 C.绝缘和屏蔽作用 D.产生兴奋

84. 小肠特有的运动形式是(B)

A.紧张性收缩 B.分节运动 C.蠕动 D.袋状运动

85. 幽门括约肌和幽门瓣具有的作用是(C)

A.加强胃的蠕动及容受性舒张

B.保证胃的紧张性性收缩

C.控制胃内容物排入十二指肠以及防止肠内容物逆流回胃

D.控制十二指肠液的分泌速率

86. 胃可分为五个区域，以下哪个区域离十二指肠最近？(C)

A.贲门 B.胃底 C.幽门 D.胃体

87. 胃壁组织由外而内可分为四层，则外面第二层应为(A)

A.肌层 B.粘膜下层 C.浆膜层 D.粘膜层

88. 进食时反射性引起胃壁平滑肌的舒张叫做胃的\(B)

A.反射性舒张 B.容受性舒张 C.紧张性收缩 D.蠕动

89. 食糜由胃排入十二指肠的过程叫(A)

A.胃排空 B.消化 C.吸收 D.排遗

90. 左右肝管合并后称为(B)

A.胆总管 B.肝总管 C.胆囊管 D.主胰管

91. 人体共有多少对颅神经？(B)

A.11B.12C.7D.8

92. 人的呼吸系统包括呼吸道和(C)

A.心 B.肝 C.肺 D.脾

93. 神经细胞冲动到达时，神经递质可释放入何处：(C)

A.突触前膜 B.突触后膜 C.突触间隙 D.以上均不对

94. 从传导速度来看，有髓的神经纤维较无髓的(B)

A.传导更远 B.传导更快 C.传导更慢 D.传导更近

95. 从传导速度来看，直径粗的神经纤维较细的(B)

A.传导更远 B.传导更快 C.传导更慢 D.无影响

96. 神经元的基本功能除了感受刺激外，还有(C)

A.营养功能 B.支持功能 C.传导兴奋 D.吞噬功能

97. 在中枢神经系统里，不含胞体只有神经纤维聚集的部分称为(A)

A.白质 B.灰质 C.黑质 D.纹状体

98. 根据神经元的功能，可分为感觉神经元、运动神经元以及(B)

A.单极神经元 B.联络神经元 C.双极神经元 D.以上均不对

99. 反射活动的结构基础称为(C)

A.反射带 B.条件反射 C.反射弧 D.以上均不对

100. 按解剖位置，咽可分为鼻咽部、口咽部以及(B)

A.舌咽部 B.喉咽部 C.腭咽部 D.以上均不对

101. 维持个体生命，包括心跳、呼吸、消化、体温、睡眠等重要生理功能的中枢系统是(A)

A.脑干 B.脊髓 C.小脑 D.端脑

102. 调整肌紧张，维持身体平衡，控制肌肉的张力和协调主要由哪部分脑结构承担？(C)

A.脑干 B.脊髓 C.小脑 D.延髓

103. 在中枢神经系统里，神经细胞胞体集中的部位又称为(B)

A.白质 B.灰质 C.黑质 D.纹状体

104. 以下哪项不属于脑干结构？(D)

A.中脑 B.脑桥 C.延髓 D.小脑

105. 中枢神经系统除了脑之外，还包括(B)

A.脊柱 B.脊髓 C.神经节 D.以上均不对

106. 神经元间联系方式是互相接触，而不是细胞质的互相沟通该接触部位的结构特化称为(A)

A.突触 B.触突 C.树突 D.以上均不对

107. 许多简单反射活动的低级中枢位于(B)

A.大脑 B.脊髓 C.肢体 D.以上均不对

108. 机体与外界环境之间的气体交换过程叫(A)A.呼吸 B.吐纳 C.换气 D.新陈代谢

109. 心脏瓣膜的主要功能是(C)

A.防止血液循环 B.防止血液流过 C.防止血液倒流 D.防止血流过快

110. 右房室瓣膜又叫(C)

A.一尖瓣 B.二尖瓣 C.三尖瓣 D.四尖瓣

111. 心脏一共有多少个腔？(D)

A.1B.2C.3D.4

112. 心脏在人体位于(B)

A.前纵隔 B.中纵隔 C.后纵隔 D.上纵隔

113. 当CO2浓度轻度升高时，可以导致(C)

A.暂停呼吸 B.呼吸抑制 C.呼吸兴奋 D.以上均不对

114. 调节呼吸的最重要的生理性化学因素是(A)

A.CO2.B.COC.NO2.D.NO

115. 上下消化道分解的标志是(D)

A.十二指肠 B.幽门窦 C.胰管开口 D.Treitz 韧带

116. 组织毛细血管血液与组织细胞之间的气体交换叫(C)

A.呼吸 B.肺换气 C.组织换气 D.新陈代谢

117. 体循环起始于(B)A.左心房 B.左心室 C.右心房 D.右心室

118. 肺动脉发出的部位是(D)A.左心房 B.左心室 C.右心房 D.右心室

119. 肺的功能血管是(A)

A.肺动脉和肺静脉 B.支气管动脉和静脉 C.冠状动脉 D.腹主动脉

120. 肺表面具有活性物质，可以保持肺泡表面张力，保证肺泡结构稳定性，主要由(D)

A.肺间质细胞分泌 B.巨噬细胞分泌 C. Ⅰ型肺泡细胞分泌 D. Ⅱ型肺泡细胞分泌

121. 在组织学上，肺内支气管的各级分支及其终端的大量肺泡又称为(B)

A.肺间质 B.肺实质 C.两者都对 D.两者都不对

122. 支气管、血管、淋巴管、神经出入于肺的地方称为(B)

A.纵隔 B.肺门 C.肺尖 D.肺底

123. 鼻腔附近含有空气的骨腔叫做(B)

A.鼻道 B.鼻旁窦 C.鼻甲 D.鼻前庭

124. 呼吸的基本中枢位于(D)

A.间脑 B.中脑 C.小脑 D.延髓

125. 循环系统包括(A)

A.心血管系统和淋巴系统 B.心脏和血管 C.血管和淋巴管 D.心脏和淋巴管

126. 喉不仅是呼吸的通道，也是(C)

A.消化器官 B.循环通道 C.发音器官 D.分泌器官

127. 食物消化后，可吸收成分透过消化道粘膜进入血液或淋巴液的过程叫(D)

A.分解 B.消化 C.排遗 D.吸收

128. 测血压时，袖带太紧可导致测得的血压(B)

A.偏高 B.偏低 C.血压波动 D.以上均不对

129. 肺静脉里的血液属于(B)

A.静脉血 B.动脉血 C.两者都对 D.两者都不对

130. 一般来说，起到弹性贮器作用的是(B)

A. 大静脉 B. 大动脉 C. 毛细血管 D. 小动脉

131. 正常人的心律是由何发起并控制的？(A)

A. 窦房结 B. 房室结 C. 浦肯野纤维 D. 以上均不对

132. 心脏本身的营养血管是(B)

A. 微血管 B. 冠状血管 C. 肺动脉 D. 主动脉

133. 从动脉到静脉，血压逐渐(C)

A. 升高 B. 波动增加 C. 降低 D. 以上均不对

134. 心传导系由特殊分化的心肌细胞构成，主要(D)

A. 收缩心肌 B. 舒张心肌 C. 产生新心肌细胞 D. 产生和传导冲动

135. 对冠脉血流量影响很大的因素是(C)

A. 血管因素 B. 动脉血压 C. 心肌节律性舒缩活动 D. 血细胞

136. 血管内的血液对单位面积血管壁的侧压力叫(B)

A. 血阻 B. 血压 C. 血流变 D. 血常规

137. 微循环的作用是(B)

A. 实现血液的物质运输 B. 实现血液和组织之间的物质交换

C. 实现血液和淋巴之间的物质交换 D. 实现淋巴和组织之间的物质运输

138. 微循环是指循环系统中(C)

A. 小动脉与小静脉部分 B. 动静短路部分 C. 微动脉与微静脉部分 D. 微动脉与小动脉部分

139. 当冠状动脉突然阻塞时，不易很快建立侧支循环，常可导致(C)

A. 心跳骤停 B. 心律失常 C. 心肌梗塞 D. 心跳减慢

140. 肺循环起于(D)

A. 左心房 B. 左心室 C. 右心房 D. 右心室

141. 食道位于喉咙与胸腔的后面，是连结咽喉到何种器官的肌肉管道？(A)

A. 胃 B. 十二指肠 C. 大肠 D. 肛门

142. 循环系统平均充盈压是指\(C)

A. 动脉收缩压 B. 动脉舒张压 C. 血液停止流动时对血管壁的侧压力 D. 以上均不对

三、多选题

143. 关于 IgG，哪些叙述是正确的（ABD）

A. 含量最高，居五类 Ig 之首

B. 半衰期较长，居五类 Ig 之首

C. 是体内最早合成的抗体

D. 可通过胎盘

E. 可穿过黏膜

144. 基因治疗的策略包括（ABCD）

A. 替换性基因治疗

B. 补偿性基因治疗

C. 调控性基因治疗

D. 导入反义核酸

145. 可用作克隆基因载体的 DNA 有（ABCD）

A. 细菌质粒 DNA

B. 噬菌体 DNA

C. 病毒 DNA

D. 酵母人工染色体

E. 真核细胞基因组 DNA

146. 嘌呤核苷酸从头合成的原料包括（ABCD）

A. 磷酸核糖

B. CO2

C. 一碳单位

D. 谷氨酰胺和天冬氨酸

147. 促胃液素的生理作用有（ABD）

A. 刺激胃黏膜细胞增殖

B. 刺激壁细胞分泌盐酸

C. 抑制主细胞分泌胃蛋白酶原

D. 刺激胰液、胆汁和肠液分泌

E. 刺激幽门与回盲括约肌收缩

148. 降低血清钾浓度的措施有（ABCDE）

A. 静脉滴注葡萄糖液

B. 应用胰岛素

C. 胰岛素、葡萄糖液同时应用

D. 口服阳离子交换树脂

E．腹膜透析

149．阿托品的基本药理作用有（ABE）

A．解除平滑肌痉挛，缓解内脏绞痛

B．阻断虹膜括约肌和睫状肌的 M 受体，导致扩瞳

C．刺激腺体分泌

D．减慢房室传导，减慢心率

E．解除小血管痉挛，改善微循环

150．可以引起血管平滑肌收缩的物质有（ACD）

A．血管紧张素 II

B．前列腺素 E

C．抗利尿激素

D．去甲肾上腺素

151．IL-1 的主要生物学功能包括（BD）

A．激活 NK 细胞

B．介导炎症反应

C．引起恶病质

D．引起发热

E．趋化中性粒细胞

152．下列有关心脏的描述，哪些是正确的（ACE）

A．心尖由左心室构成

B．心底大部分由右心房构成

C．胸肋面大部分由右心房和右心室构成

D．膈面大部分由右心室构成

E．左缘大部分由左心室构成

153．超急性排斥反应的特点有（ABCD）

A．可发生在移植后的几分钟

B．供者和受者 ABO 血型不合

C．受者多次接受器官移植

D．移植器官广泛小血管炎

154．下列哪些因素与肝细胞癌发生关系密切（ABD）

A．黄曲霉污染的食物

B．坏死后肝硬化

C．华支睾吸虫感染

D．肝细胞不典型增生

155．关于原发性高血压脑出血的描述，正确的是（ABCD）

A．以基底节、内囊部多见

B．脑小动脉痉挛通透性增加 C．微小动脉瘤形成、破裂

D．小动脉壁坏死，发生破裂性出血

156．与遗传因素关系密切的肿瘤有（ABD）

A．肾母细胞瘤

B．视网膜母细胞瘤

C．骨母细胞瘤

D．神经母细胞瘤

157．肺回缩力来自（BC）

A．胸内负压

B．肺弹性纤维的回缩力

C．肺泡内液-气界面的表面张力

D．气道阻力

158．胸内负压的生理意义为(ABD)

A．维持肺的扩张状态

B．降低气道阻力

C．保持肺泡大小的稳定性

D．有利于静脉血和淋巴液的回流

159．肥胖症的主要并发症有（ABCD）

A．糖尿病

B．冠心病

C．高甘油三酯

D．动脉粥样硬化

E．低血压

160．躯干骨包括（CDE）

A．髋骨

B．锁骨

C．肋骨

D．胸骨

E．椎骨

161．眼的调节主要包括(BC)

A．晶状体后凸，视轴会聚

B．晶状体变凸

C．瞳孔缩小，两眼视轴向鼻侧会聚

D．睫状肌松弛，瞳孔缩小

162．影响突触前膜递质释放量的主要因素是(BC)

A．动作电位的传导速度

B．锋电位的幅度

C．进入前膜 Ca2+的数量

D．递质小泡的大小

163．胃肠激素的主要生理作用有(ABCD)

A．调节消化道平滑肌运动

B．影响消化液的分泌速度和成分

C．影响其他激素的释放

D．营养作用

164．肝素的主要作用有(ABCD)

A．增强抗凝血酶与凝血酶的亲和力

B．加快灭活凝血酶的速度

C．刺激血管内皮细胞大量释放抗凝血物质

D．可防止血栓形成

165．正常人血液在血管内不凝固的原因是(ABCDE)

A．凝血酶原无活性

B．血液中有抗凝物质存在

C．纤维蛋白溶解系统起作用

D．血管内膜光滑完整

E．血流速度快

166．重组 DNA 技术中，常用到的酶是(ABD)

A．限制性核酸内切酶

B．DNA 连接酶

C．DNA 解链酶

D．反转录酶

167．下列各种物质通过细胞膜的转运方式，哪些是正确的（ACD）

A．O2、CO2 和 NH3 属于单纯扩散

B．葡萄糖进入红细胞内属于主动转运

C．安静时细胞内 K+向细胞外移动为易化扩散

D．Na+从细胞内转移到细胞外为主动转运

168．初次应答和再次应答的共同特点是（BD）

A．抗体倍增时间大致相同

B．可发生 Ig 类别转换

C．抗体水平下降缓慢

D．可产生记忆细胞

E．可产生高亲和性抗体

169．脂肪氧化供能的特点是（ACD）

A．氧化时释放的能量多

B．人体所消耗能源的绝大部分由脂肪提供

C．在短期饥饿的情况下，脂肪是主要的能量来源

D．脂肪不能在机体缺氧的情况下供能

170．下列哪些药属于 H2 受体拮抗剂（ABCD）

A．雷尼替丁

B．法莫替丁

C．西咪替丁

D．尼扎替丁

E．兰索拉唑

171．下列有关肝细胞癌的描述，哪些是正确的（ACD）

A．常经血道转移

B．常与周围肝组织分界明显

C．可呈腺管样结构

D．可呈团块状结构

172．常发展为慢性硬化性肾小球肾炎的有（AC）

A．新月体性肾小球肾炎

B．毛细血管内增生性肾小球肾炎

C．膜性增生性肾小球肾炎

D．轻微病变性肾小球肾炎

173．引起主动脉瓣狭窄的疾病有（ABC）

A．风湿性心内膜炎

B．非感染性心内膜炎

C．动脉粥样硬化

D．梅毒

174．下列有关温度觉的叙述，正确的是（ABD）

A．冷觉和温觉合称温度觉

B．冷温觉感受器开始引起神经冲动发放的分界点温度是 30℃

C．冷温觉感受器的传入神经纤维以Ⅳ类为主

D．一般皮肤表面冷点多于温点

175．C 类神经纤维包括（AC）

A．自主神经节后纤维

B．自主神经节前纤维

C．后根中的痛觉传入纤维

D．皮肤触压觉传入纤维

176．促进胃排空的因素是（AC）

A．迷走神经兴奋

B．小肠内容物酸度增加

C．促胃泌素释放增多

D．小肠被食糜扩张

177．外周免疫耐受形成的机制包括（BCDE）

A．克隆排除

B．克隆无能

C．免疫忽视

D．活化诱导的细胞死亡

E．免疫屏障作用

178．麻醉学专业知识试题精选

低温时对人体的生理影响有（ ADE ）

A.降低代谢，减少氧耗

B.氧离曲线右移

C.血液黏度下降

D.凝血机制发生改变

E.可直接抑制窦房结和减慢心内传导

179．关于近端小管重吸收 Na+ 的描述，正确的是 ABCDE

A. 小管液中的 Na+ 被动扩散至小管细胞内

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/876140200151010044