

①准考证号(工号):

职称:见习护

姓名:林玉洁 类别:本科护理 [返回首页](#) [退出系统](#)

师科室:呼吸内

	试题数	答对	得分	总分	正确率	错误率	分数(百分比)
单项选	40	0	0	40	0.00%	100.00%	0.00%
择题	40	0	0	40	0.00%	100.00%	0.00%
合计	40	0	0	40	0.00%	100.00%	0.00%

## 眼科、耳鼻咽喉科及口腔科

一、单项选择题:每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最正确答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

第 1 题 急性闭角性青光眼患者角膜呈 ( ) **A、雾状混浊**

B、角膜后有沉着物 C、无损害

D、增厚 E、角膜弹性差

标准答案: **A** 您的答案:

第 2 题 外耳道活动性异物的取出方法为 ( ) **A、使其脱水,再行取出**

B、必要时手术取出 **C、应设法停止其活动后再取出**

D、用耵聍钩钩取 E、让其自行爬出,

标准答案: **C** 您的答案:

第 26 题 以下哪项不属于鼻咽癌的病症 **A、早期回吸鼻涕后痰中带血**

B、颈淋巴结肿大 C、耳鸣耳闭塞感

D、听力减退 **E、早期即出现贫血**

标准答案: **E** 您的答案:

第 27 题 滴眼药的考前须知哪项不妥 ( ) **A、滴药前洗手**

- B、严格执行查对制度 C、易沉淀的混悬液要充分摇匀后再滴  
D、每次滴 3 滴以上 E、同时滴多种眼药时每种间隔 2~3 分钟

标准答案：D 您的答案：

第 29 题 以下哪项不属于牙本质过敏的病症特点 () A、激惹性痛

- B、刺激去除后疼痛立即消失 C、用探针在牙面可找到过敏点  
D、温度刺激可引起疼痛 E、牙龈红肿

标准答案：E 您的答案：

第 30 题 以下哪项不属于咽部的淋巴组织 () A、颈深淋巴结群

- B、腺样体 C、腭扁桃体  
D、舌扁桃体 E、咽鼓管扁桃体

标准答案：A 您的答案：

第 31 题 口腔颌面部静脉的解剖特点是 () A、静脉瓣少而坚韧

- B、不易使血液反流 C、两眼眶外侧与口角连线区域称危险三角区  
D、三角区内的感染处理不当易逆行传入颅内 E、属颈外静脉分支

标准答案：D 您的答案：

第 32 题 交感性眼炎一般发生在穿透性眼外伤后 () A、2 周

- B、2~8 周 C、1 周  
D、2~8 个月 E、2~8 天

标准答案：B 您的答案：

第 32 题 急性结膜炎的临床病症是 () A^视力减退

B、角膜混浊 C、眼分泌物增多呈脓性

D、眼分泌物结痂 E、睑结膜、穹窿结膜不充血

标准答案：C 您的答案：

第 33 题 严格掌握扁桃体的手术指征是为了防止 () A、共鸣障碍

B、免疫监视障碍 C、咽淋巴的破坏

D、咽隐窝缺损 E、减少细菌生长繁殖

标准答案：B 您的答案：

第 34 题 称为智齿的是 () A、第一磨牙

B、第二磨牙 C、第三磨牙

D、第四磨牙 E、以上都不是

标准答案：C 您的答案：

第 35 题 龅齿患者出现 0 A、咀嚼器官的功能及完整性丧失

B、牙齿过早脱落 C、牙髓质逐渐破坏

D、牙齿色、形质无变化 E^不影响身体健康

标准答案：A 您的答案：

第 36 题 全身疾病在口腔的表现哪项正确() A、维生素 C 缺乏口腔黏膜出现红斑

B、麻疹初期双颊黏膜出现中央带蓝白色的小点 C、糖尿病患者牙龈呈紫色

D、白血病患者牙龈萎缩 E、药物过敏不影响口腔黏膜

标准答案： B 您的答案：

第 37 题 耳源性颅内并发症有() A、急性乳突炎

B、迷路炎 C、硬脑膜外脓肿

D、急性骨膜下脓肿 E、流行性乙型脑炎

标准答案： C 您的答案：

第 38 题有关开角性青光眼的手术治疗时间哪项正确() A、用药物治疗 1 周后

B、药物治疗眼压不能控制时 C、应用各种药物而且在最大药量治疗下眼压仍不能控制时

D、药物治疗 2 周后 E、眼压控制 2 天后

标准答案： C 您的答案：

第 39 题阿托品用于治疗眼病哪项表达正确() A、增加眼内血管壁的通透性

B、降低眼内血管壁的通透性 C、解除睫状肌的收缩

D、直接止痛 E、直接抗炎

标准答案：B 您的答案：

第 40 题 以下哪项不是鼻出血的全身原因() A、凝血机制障碍

B、高血压 C、风湿性心脏病

D、妇女月经期 E、化学物质中毒

标准答案：D 您的答案：

二、B 型题(配伍选择题)：以下提供假设干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案。某个备选答案可能被选择一次、屡次或还被选择。

(1~3 题共用题干) A. 视力不减退

B. 视力减退 C. 视力急剧减退

D. 视力减退至 0.1-0.2 E. 后期视力减退

第 1 题 急性虹膜睫状体炎() (B) 第 2 题 急性结膜炎() (A)

第 3 题 急性闭角性青光眼() (C) (4~6 题共用题干)

A. 利特尔动脉丛或克静脉丛 B. 鼻-鼻咽动脉丛

C. 鼻中隔后部动脉性出血 D. 下鼻道距下鼻甲前端 1~1.5cm 下鼻甲附着处

E. 下鼻道距下鼻甲中段下鼻甲附着处 1~1.5cm 第 4 题 上颌窦穿刺部位() (D) 第 5 题 老年人鼻出血部位() (C)

第 6 题 小儿及青少年鼻出血部位() (A) (7~10 题共用题干)

A. 维生素 B2 缺乏 B. 维生素 C 缺乏

C. 磺胺、青霉素 D. 牙本质过敏 E. 氯、磷、神中毒

第 7 题 牙龈出血的病因之一是() (B) 第 8 题 口角炎的病因之一是() (A)

第 9 题 可致过敏性口炎的是() (C) 第 10 题 鼻出血的病因之一是() (E)

(11~13 题共用题干) I 型超敏反应

A. II 型超敏反应 C. m 型超敏反应

D. IV 型超敏反应 E. 人工被动免疫反应

第 11 题 扁桃体炎导致的自身变态反应疾病() (C) 第 12 题 角膜移植后排斥反应() (D)

第 13 题 变应性鼻炎() (A) (14~17 题共用题干)

A.睫状体充血 B.睑结膜、穹窿结膜充血  
C.上穹窿和上睑结膜充血 D.角膜充血  
E.睫状体充血，角膜后有沉着物 第 14 题沙眼 0(c)

第 15 题急性结膜炎 0(B) 第 16 题 急性闭角性青光眼 () (A)

第 17 题 急性虹膜睫状体炎 () (E) **(18 20** 题共用题干)

A.瞳孔变形 B.瞳孔垂直性椭圆形散大  
C.瞳孔缩小 D.瞳孔无变化  
E.视物重影 第 18 题 急性结膜炎 0(D)

第 19 题 急性闭角性青光眼 () (B) 第 20 题 急性虹膜睫状体炎 () (A)

三、多项选择题：由一个题干和 A、B、C、D、E 五个备选答案组成，题干在前，选项在后。要求考生从五个备选答案中选出两个或两个以上的正确答案，多项选择、少选、错选均不得分。

第/题 耳源性颅内并发症有 () A、脑膜炎

B、硬膜脑下脓肿 C、脑脓肿

D、乙状窦栓塞性静脉炎 E、流行性乙型脑炎

标准答案：ABCD 您的答案：

第 2 题老年性白内障的分期为 () A、手术前期

B、初发期 C、未成熟期

D、成熟期 E、过成熟期

标准答案：BCDE 您的答案：

第 3 题气管切开术后并发症有 () A、皮下气肿

B、纵隔气肿 C、气胸

D、出血 E、拔管困难

标准答案：ABCDE 您的答案：

第 4 题视网膜的生理功能有() A、光觉

B、色觉 C、形觉

D、感觉 E、触觉

标准答案：ABC 您的答案：

第 5 题智齿冠周炎的临床表现有() A、龈瓣充血

B、龈袋内有脓性物 C、冠周脓肿

D、第一、二磨牙阻生 E、第三磨牙阻生

标准答案：ABCE 您的答案：

第 6 题 角膜移植术护理包括() A、术前滴 1%匹罗卡品缩瞳

B、术后观察角膜有无混浊和水肿 C、用 1%泼尼松龙滴眼以预防排斥反响

D、用 1%阿托品滴眼以防止虹膜粘连 E、睡前戴金属眼罩以防角膜碰伤

标准答案：ABCDE 您的答案：

第 7 题 梅尼埃病主要临床表现包括() A、眩晕

B、幻觉 C、耳鸣

D、波动性听力下降 E、耳胀感

标准答案：ACDE 您的答案：

第 8 题气管切开术后护理应特别注意 () A、保持气管套管通畅

B、每 4~6 小时清洗、消毒内套管 1 次 C、严格无菌操作，吸痰导管一用一消毒

D、痰液黏稠时可给予呼吸道雾化吸入 E、储液瓶内应先放入 250mL 消毒液

标准答案：ABCD 您的答案：

第 9 题鼻咽癌 () A、无地理分布及种族分布特点

第 3 题沙眼的防治包括 () A、一人一巾，局部滴 15%磺胺醋酰钠眼药水

B、滴药使瞳孔缩小，减少疼痛 C、局部短暂滴药

D、不能行滤泡压榨术 E、沙眼患者所有用具一律分开使用

标准答案：A 您的答案：

第 4 题角膜移植术前滴 () A、阿托品眼药水

B、1%毛果芸香碱眼药水 C、15%磺胺醋酰钠眼药水

D、0.25%氯霉素眼药水 E、0.1%利福平眼药水

标准答案：B 您的答案：

第 5 题角膜移植术后角膜内皮排斥反应一般发生在术后 () A、第 3 天

B、第 7 天 C、第 10~15 天

D、第 20 天 E、第 30 天



B、在黄种人中发病率高 C、高发于青少年

D、与 EB 病毒有密切关系 E、与吸烟有密切关系

标准答案：B|您的答案：

第 1。颞下颌关节脱位的处理包括() A、及时复位是最正确治疗方法

B、复位时取半卧位 C、复位时需 3 人配合

D、复位后限制下颌活动 E、复位后固定下颌 2~3 周

标准答案：ADE 您的答案：

四、是非判断题：答题者判断该题所表达的内容是对还是错。

第 1 题 耳源性颅内并发症患者禁用影响瞳孔的药物，诊断不明者不用 镇痛药。

A、对

错标准答案：A 您的答案：

第 2 题 扁桃体炎的主要并发症为咽旁脓肿。

A、对 B、错

标准答案：B 您的答案：

第 3 题 鼻出血的首选止血方法是结扎止血法。

A、对 B、错

标准答案：B 您的答案：

第 4 题 老年性白内障的最正确手术期是未成熟期。

A、对 B、错

标准答案：B 您的答案：

第 5 题牙本质过敏的主要表现是放射痛。

A、对 B、错

标准答案：B 您的答案：

第 6 题 瞳孔呈垂直椭圆形散大是急性闭角性青光眼的临床特点之一。

A、对 B、错

标准答案：A 您的答案：

第 7 题 沙眼是沙眼支原体感染引起的。

A、对 B、错

标准答案：B 您的答案：

第 8 题 外耳道植物性异物可用耵聍钩、异物夹和各种钳夹直接夹取。

A、对 B、错

标准答案：B 您的答案：

第 9 题 急性闭角性青光眼患者角膜弹性差。

A、对 B、错

标准答案：B 您的答案：

第 10 题 角膜移植的排斥反响一般发生在术后 10~15 天。

A、对 B、错

标准答案：A 您的答案：

第 7 题 由于右侧主支气管管腔粗短与气管纵轴角度较小，故异物常易落入右侧。

A、对

错标准答案：A 您的答案：

第 N 题 耳源性脑脓肿患者头痛剧烈时应及时使用止痛剂，以防颅内压增高。

A、对 B、错

标准答案：B 您的答案：

第 7 题 萎缩性鼻炎患者鼻甲水肿，鼻腔宽大，腺体水肿致鼻腔干燥。

A、对 B、错

标准答案：B 您的答案：

第 4 题 沙眼是结膜、角膜上皮的急性增生性炎症。

A、对 B、错

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/877112141052006043>