@精品辅导-只做好题

备考辅导系列

重点难点梯次总结汇编

精华考点合理提炼编排

不同模块全面备考提升

精选真题发现考试规律

章节训练逐一击破短板

全真模拟精确预测趋势

思维拓展强化考前冲刺

注：请仔细预览文本内容，确认后下载学习资料

@高分一次过

执业药师职业资格考试药学综合知识与技能综合考点习题及答案

1.可使丙氨酸氨基转移酶（ALT）升高的药品有（ ）。

A. 伊曲康唑

B. 灰黄霉素

C. 琥乙红霉素

D. 联苯双酯

E. 氟伐他汀

【答案】: A|B|C|E

【解析】:

可致丙氨酸氨基转移酶（ALT）升高的药物主要有：①抗真菌药，如伊曲康唑、灰黄霉素、氟康唑等。②抗生素，如红霉素类、利福平、林可霉素、头孢地嗪等。③HMG-CoA 还原酶抑制剂类调血脂药，即他汀类药物。④抗病毒药，如阿昔洛韦、泛昔洛韦。D 项，联苯双酯具有护肝作用，可降低 ALT。

2.下列肝病患者应慎用的药物是（ ）。

A. 氯丙嗪

B. 对乙酰氨基酚

C. 巴比妥

D. 维生素 A

E. 口服避孕药

执业药师职业资格考试药学综合知识与技能综合考点习题及答案

1.可使丙氨酸氨基转移酶（ALT）升高的药品有（ ）。

A. 伊曲康唑

B. 灰黄霉素

C. 琥乙红霉素

D. 联苯双酯

E. 氟伐他汀

【答案】: A|B|C|E

【解析】:

可致丙氨酸氨基转移酶（ALT）升高的药物主要有：①抗真菌药，如伊曲康唑、灰黄霉素、氟康唑等。②抗生素，如红霉素类、利福平、林可霉素、头孢地嗪等。③HMG-CoA 还原酶抑制剂类调血脂药，即他汀类药物。④抗病毒药，如阿昔洛韦、泛昔洛韦。D 项，联苯双酯具有护肝作用，可降低 ALT。

2.下列肝病患者应慎用的药物是（ ）。

A. 氯丙嗪

B. 对乙酰氨基酚

C. 巴比妥

D. 维生素 A

E. 口服避孕药

执业药师职业资格考试药学综合知识与技能综合考点习题及答案

1.可使丙氨酸氨基转移酶（ALT）升高的药品有（ ）。

A. 伊曲康唑

B. 灰黄霉素

C. 琥乙红霉素

D. 联苯双酯

E. 氟伐他汀

【答案】: A|B|C|E

【解析】:

可致丙氨酸氨基转移酶（ALT）升高的药物主要有：①抗真菌药，如伊曲康唑、灰黄霉素、氟康唑等。②抗生素，如红霉素类、利福平、林可霉素、头孢地嗪等。③HMG-CoA 还原酶抑制剂类调血脂药，即他汀类药物。④抗病毒药，如阿昔洛韦、泛昔洛韦。D 项，联苯双酯具有护肝作用，可降低 ALT。

2.下列肝病患者应慎用的药物是（ ）。

A. 氯丙嗪

B. 对乙酰氨基酚

C. 巴比妥

D. 维生素 A

E. 口服避孕药

执业药师职业资格考试药学综合知识与技能综合考点习题及答案

1.可使丙氨酸氨基转移酶（ALT）升高的药品有（ ）。

A. 伊曲康唑

B. 灰黄霉素

C. 琥乙红霉素

D. 联苯双酯

E. 氟伐他汀

【答案】: A|B|C|E

【解析】:

可致丙氨酸氨基转移酶（ALT）升高的药物主要有：①抗真菌药，如伊曲康唑、灰黄霉素、氟康唑等。②抗生素，如红霉素类、利福平、林可霉素、头孢地嗪等。③HMG-CoA 还原酶抑制剂类调血脂药，即他汀类药物。④抗病毒药，如阿昔洛韦、泛昔洛韦。D 项，联苯双酯具有护肝作用，可降低 ALT。

2.下列肝病患者应慎用的药物是（ ）。

A. 氯丙嗪

B. 对乙酰氨基酚

C. 巴比妥

D. 维生素 A

E. 口服避孕药

与血清胆红素、尿胆原、粪胆原等检测结果一起综合分析。尿胆红素阳性通常提示：急性黄疸型肝炎、胆汁淤积性黄疸。而尿胆原阳性多见于肝细胞性黄疸和溶血性黄疸。

(2)肾小球肾炎、肾病综合征可引起（ ）。

【答案】: C

【解析】:

肾小球性蛋白尿由各种原因导致肾小球基底膜通透性及电荷屏障受损，血浆蛋白大量滤入原尿，超过肾小管重吸收能力所引起。见于肾小球肾炎、肾病综合征、肾肿瘤等。

(3)甲状腺功能亢进症、垂体前叶功能亢进症可引起（ ）。

【答案】: E

【解析】:

血糖增高性糖尿：糖代谢紊乱、甲状腺功能亢进症、垂体前叶功能亢进症、嗜铬细胞瘤均可引起血糖增高性糖尿。

(4)代谢性或呼吸性碱中毒（ ）。

【答案】: A

【解析】:

尿 pH 增高：①疾病代谢性或呼吸性碱中毒、感染性膀胱炎、肾小管性酸中毒；②药物应用碱性药物，如碳酸氢钠、碳酸钾、氨丁三醇等，使尿 pH 增高。

8.糖化血红蛋白检查结果正常值为（ ）。

A. 3.9%～6.1%

B. 3.3%～5.5%

C. 3.8%～4.0%

D. 4.8%～6.0%

E. 2.8%～6.4%

【答案】: D

【解析】:

测定糖化血红蛋白和血红蛋白的百分率，能客观地反映测定前 3 个月内的平均血糖水平，其中，采用高效液相法测定的糖化血红蛋白正常值为 4.8%～6.0%。

9.细菌药敏试验报告包括（ ）。

A. 患者基本信息

B. 药敏试验

C. 涂片、培养鉴定

D. 影像学检查结果

E. 结果判读

【答案】: A|B|C|E

【解析】:

一般来讲，细菌药敏试验报告包括以下四部分：①患者基本信息；②涂片、培养鉴定；③药敏试验；④结果判读。

10.（共用备选答案）

A.亚甲蓝

B.纳洛酮

C.二巯丙醇

D.维生素 K

E.乙酰半胱氨酸

(1)患者，女，46 岁，因感冒发热，自行服用多种含对乙酰氨基酚的感冒药后，发生肝功能衰竭。可选用的解救药物是（ ）。

【答案】: E

【解析】:

乙酰半胱氨酸可用于对乙酰氨基酚的中毒解救。

(2)患儿，女，5 岁，误服香豆素灭鼠药，可选用的解救药物是（ ）。

【答案】: D

【解析】:

香豆素灭鼠药可导致大量出血，可用维生素 K 解救。

(3)患者，男，34 岁，有吸毒史。因过量使用阿片类药物昏迷，入急诊抢救，表现为针尖样瞳孔、呼吸抑制，可选用的解救药物是（ ）。

【答案】: B

【解析】:

纳洛酮为阿片受体拮抗剂，可用于阿片类药物中毒的解救。

11.（共用备选答案）

A.奥美拉唑

B.地塞米松

C.枸橼酸铋钾

D.多潘立酮

E.法莫替丁

(1)宜于餐后或睡前顿服的组胺 H2 受体阻断剂是（ ）。

【答案】: E

(2)宜于晨起或餐前顿服的质子泵抑制剂是（ ）。

【答案】: A

(3)宜于餐前 1 小时服用的胃黏膜保护剂是（ ）。

【答案】: C

【解析】:

A 项，奥美拉唑为质子泵抑制剂，特异性地集中于胃黏膜壁细胞上 pH 较低的泌酸小管口，与 H＋,K＋-ATP 酶（又称质子泵）结合形成复合物，抑制 H＋,K＋-ATP 酶的活性，从而抑制胃酸生成的终末环节，一般清晨顿服或餐前服用。B 项，地塞米松是糖皮质激素。C 项，枸橼酸铋钾为胃黏膜保护剂，餐前服用，可充分附着于胃壁，形成一层保护屏障。D 项，多潘立酮为促胃动力药。E 项，组胺 H2 受体阻断剂：如西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁，宜餐后服用，餐后服比餐前服效果为佳，因为餐后胃排空延迟，有更多的抗酸和缓冲作用时间。

12.部分头孢菌素结构中含有甲硫四氮唑侧链，可以竞争性结合 γ -谷氨酸羟化酶，抑制肠道正常菌群，由此导致的不良反应是（ ）。

A. 凝血功能障碍

B. 排异功能障碍

C. 造血功能障碍

D. 免疫功能障碍

E. 勃起功能障碍

【答案】: A

【解析】:

肠道正常菌群如双歧杆菌、乳酸杆菌等能合成多种人体生长发育必需的维生素，如 B 族维生素（烟酸，泛酸，维生素 B1、B2、B6、B12）、维生素 K 等。维生素 K 是体内多种凝血酶合成的必要条件。头孢菌素抑制肠道正常菌群，使得体内依赖维生素 K 的凝血因子合成不足，从而导致凝血功能障碍。

13.影响氯吡格雷的肝酶（CYP2C19）代谢，从而降低氯吡格雷抗血小板作用的药物是（ ）。

A. 奥美拉唑

B. 阿米替林

C. 非诺贝特

D. 普萘洛尔

E. 吲达帕胺

【答案】: A

【解析】:

奥美拉唑既是 CYP2C19 的底物，又是 CYP2C19 的强抑制剂，与氯吡格雷同服可抑制后者的生物转化（抑制后者活性代谢物的形成），继而降低抗血小板聚集、阻止血栓形成的作用。

14.某甲状腺功能亢进患者，服用抗甲状腺药丙硫氧嘧啶治疗 2 个月后就诊复查，白细胞急剧下降，白细胞计数 3.18×109/L。处置方法

除停止使用丙硫氧嘧啶以外应考虑的药物是（ ）。

A. 利血生

B. 螺内酯

C. 核黄素

D. 地高辛

E. 黄体酮

【答案】: A

【解析】:

根据患者的临床指征，处理方法为：应立即停药，换其他抗甲亢药物，同时服用促进白细胞生长药物。A 项，利血生（也称利可君）为升白细胞药，可以促进白细胞生长、提高白细胞计数，是一种用于治疗各种原因引起的白细胞减少、再生障碍性贫血等的药物。

15.避孕药使用的禁忌证包括（ ）。

A. 哺乳期

B. 年龄＜35 岁的吸烟女性

C. 高血压

D. 严重偏头痛

E. 甲状腺功能亢进症

【答案】: A|C|D|E

【解析】:

避孕药的禁忌证主要有：①哺乳期不宜使用，年龄 > 35 岁的吸烟女性不宜长期服用；②严重心血管疾病、血栓性疾病不宜使用，如高血

压病、冠心病等；③严重肝硬化、肝功能损伤、病毒性肝炎活动期、肾脏疾病、肾功能损伤、严重偏头痛、糖尿病、甲状腺功能亢进症者禁用；④良、恶性肿瘤、癌前病变。

16.（共用题干）

患者，男，48 岁。十二指肠溃疡病史 2 年，近感头痛、眩晕而就诊。查体：血压 160/100mmHg。经一段时间观察及定期检查后，医师诊断为高血压病。

(1)下列降压药应慎用的是（ ）。

A. 可乐定

B. 利血平

C. 肼屈嗪

D. 氢氯噻嗪

E. 卡托普利

【答案】: B

【解析】:

临床上在对高血压伴有消化性溃疡病的治疗时应慎用利血平，因其可以诱发或加重消化性溃疡。

(2)如合用利尿剂，适宜的服用时间为（ ）。

A. 清晨

B. 餐前

C. 餐中

D. 餐后

E. 睡前

【答案】: A

【解析】:

利尿剂宜清晨服用，避免夜间排尿次数过多。

17.（共用备选答案）

A.硫酸锌

B.磺胺醋酰钠

C.酞丁安

D.可的松

E.酮康唑

(1)在治疗沙眼的非处方药中，具有阻止细菌合成叶酸作用的药品是（ ）。

【答案】: B

【解析】:

磺胺醋酰钠滴眼液在结构上为一种类似对氨基苯甲酸（PABA）的物质并与其竞争，抑制二氢叶酸合成酶，阻止细菌合成叶酸，使细菌缺乏叶酸的合成而死亡。

(2)在治疗沙眼的非处方药中，具有沉淀蛋白质和收敛作用的药品是（ ）。

【答案】: A

【解析】:

硫酸锌滴眼液在低浓度时有收敛作用，锌离子能沉淀蛋白，可与眼球

表面和坏死组织及分泌物中的蛋白质形成极薄的蛋白膜，起到保护作用，高浓度则有杀菌和凝固作用，有利于创面及溃疡的愈合。

(3)在治疗沙眼的非处方药中，具有较强抑制沙眼衣原体作用的药品是（ ）。

【答案】: C

【解析】:

酞丁安滴眼液为抗菌药，对沙眼衣原体有强大的抑制作用，在沙眼包涵体尚未形成时，能阻止沙眼衣原体的繁殖和包涵体的形成，尤其对轻度沙眼疗效最好。

18.下列属于脂溶性维生素的是（ ）。

A. 叶酸

B. 维生素 B2

C. 维生素 B6

D. 维生素 C

E. 维生素 D

【答案】: E

【解析】:

脂溶性维生素包括维生素 A、维生素 D、维生素 E 等。

19.为减轻抗肿瘤药物所致神经毒性症状可用（ ）。

A. 长春新碱

B. 紫衫醇

C. 奥沙利铂

D. 维生素 B1

E. 顺铂

【答案】: D

【解析】:

可应用维生素 B1 和维生素 B6 等减轻抗肿瘤药物所致神经毒性症状。

20.缺血性脑卒中的二级预防用药中不包括（ ）。

A. 依达拉奉

B. 阿司匹林

C. 阿托伐他汀

D. 缬沙坦

E. 氯吡格雷

【答案】: A

【解析】:

依达拉奉用于改善急性脑梗塞所致的神经症状、日常生活活动能力和功能障碍，不能用于缺血性脑卒中的二级预防。

21.可导致心搏骤停，切忌直接静脉注射的药品是（ ）。

A. 尼可刹米

B. 洛贝林

C. 甲氧氯普胺

D. 呋塞米

E. 氯化钾

【答案】: E

【解析】:

氯化钾注射液切忌直接静脉注射，于临用前稀释，否则不仅引起剧痛，甚至可引发心脏停搏。

22.（共用备选答案）

A.诊断痛风

B.诊断心肌梗死

C.诊断消化性溃疡

D.诊断急性胰腺炎

E.诊断红细胞增多症

血生化检查结果的临床意义

(1)血清淀粉酶检查超过正常值（ ）。

【答案】: D

【解析】:

血清淀粉酶活性测定主要用于急性胰腺炎的诊断。急性胰腺炎发病后6～12 小时，血清淀粉酶开始升高，12～72 小时达到高峰，3～5 天恢复正常。此外，尚可见于急性腮腺炎、胰腺肿瘤引起的胰腺导管阻塞、消化性溃疡穿孔、急性酒精中毒等。

(2)血尿酸检查超过正常值（ ）。

【答案】: A

【解析】:

血尿酸增高：病理性痛风，急、慢性肾炎，肾结核、肾积水等。核蛋白代谢增强，如粒细胞白血病、多发性骨髓瘤、红细胞增多症等。

(3)肌酸磷酸激酶检查超过正常值（ ）。

【答案】: B

【解析】:

肌酸激酶在心肌梗死在发病后 3～8 小时开始上升，10～36 小时达峰，3～4 天恢复正常。为急性心肌梗死早期诊断指标之一，增高程度与心肌受损程度基本一致。

23.阿片类药物中毒的拮抗剂有（ ）。

A. 阿扑吗啡

B. 尼可刹米

C. 纳洛酮

D. 烯丙吗啡

E. 维库溴铵

【答案】: C|D

【解析】:

纳洛酮和盐酸烯丙吗啡为阿片类药物中毒的首选特异性拮抗剂。

24.下列关于脑梗死急性期药物治疗的叙述，正确的是（ ）。

A. 甘油果糖脱水作用较甘露醇强且快

B. 应在使用溶栓药的同时联合使用普通肝素

C. 应在使用溶栓药的同时联合使用阿司匹林

D. 血小板计数＜100×109/L 时应禁用溶栓药

E. 在发病 12 小时内应用非选择性纤溶酶原激活剂如尿激酶

【答案】: D

【解析】:

对缺血性脑卒中发病 3 小时内和 3～4.5 小时的患者，应按照适应证和禁忌证严格筛选患者，尽快静脉给予 rt-PA 溶栓治疗。禁忌证：对于既往有颅内出血，近 2 周内进行过大的外科手术，近 1 周内有不可压迫部位的动脉穿刺，近 3 个月有脑卒中或心肌梗死病史，严重心、肾、肝功能不全或严重糖尿病者，体检发现有活动性出血或外伤（如骨折）的证据，已接受抗凝治疗，血小板计数＜100×109/L，血糖＜2.7mmol/L，收缩压或舒张压＞100mmHg，妊娠期女性，不合作患者禁用。

25.下列属于骨健康基本补充剂的药物是（ ）。

A. 钙制剂

B. 双膦酸盐

C. 氟制剂

D. 降钙素

E. 甲状旁腺素

【答案】: A

【解析】:

治疗骨质疏松症的药物：①骨健康基本补充剂：钙制剂、维生素 D；②骨吸收抑制剂：双膦酸盐、雌激素或选择性雌激素受体调节剂、降钙素；③骨形成刺激剂：甲状旁腺素、氟制剂等。

26.已有研究表明，在影响人类寿命的因素中，生活方式占（ ）。

A. 15%

B. 8%

C. 60%

D. 10%

E. 7%

【答案】: C

【解析】:

已有研究表明，在影响人类寿命的因素中，生活方式占 60%，遗传因素占 15%，社会因素占 10%，医疗占 8%，环境因素占 7%。

27.患者，男，58 岁，患有高胆固醇血症，长期服用辛伐他汀 40mg qd。患者用药期间应定期监测的生化指标是（ ）。

A. BUN

B. Hb

C. ALT

D. RBC

E. PLT

【答案】: C

【解析】:

由于生化检查简单可行，临床常用生化指标评价肝功能损害，常用的指标有 ALT、AST、ALP 和 BIL。辛伐他汀长期服用对肝功能有损害，所以应当定期检测肝功能。

28.患者，女，29 岁，孕 29＋6 周，血压 160/110mHg，尿蛋白（－），该患者降压药应选用（ ）。

A. 氨氯地平

B. 甲基多巴

C. 卡托普利

D. 厄贝沙坦

E. 哌唑嗪

【答案】: B

【解析】:

妊娠期高血压常用的药物有硫酸镁、甲基多巴、拉贝洛尔、美托洛尔、氢氯噻嗪及硝苯地平。

29.（共用备选答案）

A.洛伐他汀

B.辛伐他汀

C.阿托伐他汀钙

D.依折麦布

E.非诺贝特

(1)高三酰甘油血症患者应首选的药物是（ ）。

【答案】: E

【解析】:

苯氧芳酸类（贝特类）药物可促进 TG 分解以及胆固醇的逆向转运。主要降低血清 TG，也可在一定程度上降低 TC 和 LDL-C，升高 HDL-C。适应证为高三酰甘油血症和以三酰甘油升高为主的混合型高脂血症。主要药物有：非诺贝特，苯扎贝特等。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/878020022114006130