

2024 年河北省赵县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题内部题库（预热题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于利胆类保肝药的是

- A: 熊去氧胆酸
- B: 还原型谷胱甘肽
- C: 多烯磷脂酰胆碱
- D: 甘草酸二铵

答案：A

2. （2018 年真题）急性化脓性中耳炎的局部治疗方案, 正确的是（）

- A: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后可先用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道脓液，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗
- B: 鼓膜穿孔前可使用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道，鼓膜穿孔后可用 2%酚甘油滴耳，再用无耳毒性的抗生素滴耳液治疗
- C: 鼓膜穿孔前可先用 3%过氧化氢溶液彻底清洗外耳道脓液，再用无耳毒性的抗生素滴耳液，鼓膜穿孔后可使用 2%的酚甘油滴耳继续治疗
- D: 鼓膜穿孔前可使用 2%酚甘油滴耳，鼓膜穿孔后先以无耳毒性的抗生素滴耳液抗感染，再用 3%过氧化氢溶液清洗外耳道，以防止进一步感染

答案：A

3. 患者，女性，28 岁。妊娠 5 个月。淋雨 1 天后，出现寒战、高热，伴咳嗽、咳痰，迁延未愈，12 天后突然咳出大量脓臭痰及坏死组织，并有咯血，来诊。查体：体温(T)39℃，脉搏(P)89 次/分，右肺部叩诊呈浊音，可于右肺底听到湿啰音，实验室检查：白细胞(WBC)28×10

- A: 阿奇霉素
- B: 青霉素 G
- C: 喹诺酮类
- D: 磺胺嘧啶

答案：B

4. 患者。男，42 岁，胃癌，病理为胃窦低分化腺癌，根治术后，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇，顺铂+氟尿嘧啶。

- A: 预期性恶心呕吐
- B: 延迟性恶心呕吐
- C: 爆发性恶心呕吐
- D: 急性恶心呕吐

答案：D

5. (2017 年真题) 可以引起耳蜗神经、肾损害的药物是 ()

- A: 加替沙星
- B: 甲砒霉素
- C: 多西环素
- D: 庆大霉素

答案：D

6. 毛果芸香碱对眼的作用是

- A: 缩瞳、升眼压，调节痉挛
- B: 缩瞳、降眼压，调节痉挛

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 扩瞳、降眼压，调节痉挛

D: 扩瞳、升眼压，调节麻痹

答案：B

7. 对红霉素的描述，下列不正确的是()

- A: 对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌有效
- B: 具有肝脏毒性
- C: 抗菌谱与青霉素相似但略广
- D: 属繁殖期杀菌剂

答案：D

8. 洛伐他汀的作用是

- A: 主要影响甘油三酯合成
- B: 影响脂蛋白合成、转运及分解的药物
- C: 主要影响胆固醇合成
- D: 主要影响胆固醇吸收

答案：C

9. 关于非那雄胺作用特点的说法，错误的是

- A: 可抑制酮在前列腺内转化为双氢睾酮
- B: 易引起直立性低血压
- C: 小剂量可促进头发生长，用于治疗源性脱发
- D: 能降低血清前列腺特异性抗原（PS）水平

答案：B

10. 合并重度感染的糖尿病应使用()

- A: 那格列奈
- B: 二甲双胍
- C: 阿卡波糖
- D: 正规胰岛素

答案：D

11. 苯巴比妥与口服抗凝药合用()

- A: 抑制排酸作用
- B: 代谢加快而失效
- C: 代谢加速而导致意外怀孕
- D: 子宫内膜突破性出血

答案：B

12. 普通肝素的作用靶点是

- A: 因子IXa
- B: 因子Xa
- C: 因子IIa
- D: 凝血酶III(AT—III)

答案：D

13. 以下选项中，不属于沙美特罗的适应证的是()

- A: 慢性支气管炎伴气道痉挛的治疗
- B: 夜间哮喘的预防和维持治疗
- C: 肺气肿伴气道痉挛的治疗
- D: 缓解支气管痉挛的急性症状

答案：D

14. (2020 年真题) 属于一线抗结核分枝杆菌的药物是

- A: 莫西沙星、卡那霉素、卷曲霉素
- B: 异烟肼、利福平、莫西沙星
- C: 异烟肼、吡嗪酰胺、乙胺丁醇
- D: 异烟肼、阿米卡星、对氨基水杨酸

答案：C

15. 激动 β 受体，对慢性心力衰竭疗效较好()

- A: 氨力农
- B: 地高辛
- C: 硝普钠
- D: 多巴酚丁胺

答案：D

16. (2021 年真题) 可待因是前药，需经肝药酶转化为吗啡而发挥镇痛作用，参与转化的肝药酶是 ()

- A: CYP3A4
- B: CYP1A2
- C: CYP2D6
- D: CYP2C9

答案：C

17. 避免同时使用“蜡质”脱毛方法的药物()

- A: 异维 A 酸
- B: 壬二酸
- C: 维 A 酸
- D: 阿达帕林

答案：D

18. 临床主要用于耐药金黄色葡萄球菌的糖肽类抗菌药物是

- A: 克拉霉素
- B: 万古霉素
- C: 罗红霉素

D: 红霉素

答案：B

19. (2020 年真题) 患者，男，45 岁。初始诊断肾病综合征合并严重肝功能不全者，宜选用的糖皮质激素是

A: 泼尼松

B: 泼尼松龙

C: 氟替卡松

D: 可的松

答案：B

20. 在肠内吸收水分后膨胀形成胶体，使肠内容物变软，体积增大，反射性增加肠蠕动而刺激排便的是

A: 乳果糖

B: 聚乙二醇 4000

C: 酚酞

D: 甘油

答案：B

21. 属于 III 类抗心律失常药的是

A: 奎尼丁

B: 胺碘酮

C: 利多卡因

D: 普罗帕酮

答案：B

22. 过量使用，会导致大量的中间代谢产物 N-乙酰对苯醌亚胺堆积，引起严重肝毒性的药物是()

- A: 双氯芬酸
- B: 塞来昔布
- C: 阿司匹林
- D: 对乙酰氨基酚

答案：D

23. 下述药物中不属于消毒防腐药的是

- A: 过氧乙酸
- B: 硼酸
- C: 戊二醛
- D: 氨茶碱

答案：D

24. 用 1%麻黄素液滴鼻的主要目的是

- A: 收缩血管，减轻炎症反应
- B: 收缩血管，降低其通透性
- C: 收缩鼻黏膜，抑制腺体分泌
- D: 收缩鼻黏膜，改善鼻通气和鼻窦引流

答案：D

25. （2019 年真题）长期大量使用可致泌尿系统尿酸盐、半胱氨酸盐或草酸盐结石的维生素是（）

- A: 维生素 A
- B: 维生素 B6
- C: 维生素 B2
- D: 维生素

答案：D

26. 可能引起中性粒细胞减少的药物是

- A: 左甲状腺素
- B: 碘及碘化物
- C: 鲨肝醇
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：D

27. 直接舒张小动脉平滑肌的药物是

- A: 利血平
- B: 哌唑嗪
- C: 可乐定
- D: 肼屈嗪

答案：D

28. 对脑 CT 无明显的低密度改变、意识清楚的急性缺血性脑卒中患者，在发病 6 小时内采用其静脉溶栓较安全、有效的是()

- A: 链激酶
- B: 叶酸
- C: 重组人促红素
- D: 尿激酶

答案：D

29. 精神病患者及神经中毒症状者慎用

- A: 四环素可的松
- B: 氯霉素
- C: 利巴韦林
- D: 更昔洛韦

答案：D

30. 患者，男，25 岁。咽炎，注射青霉素后 1 分钟呼吸急促、面部发绀，心率 130 次/分，血压 60/40mmHg。

- A: 初次使用或换批号者必须做皮肤过敏试验
- B: 皮试阳性者，注射青霉素前先预备肌内注射急救药物
- C: 仔细询问过敏史，对青霉素过敏者禁用
- D: 避免饥饿时注射青霉素

答案：B

31. 下列药物不属于大环内酯类的是

- A: 大观霉素
- B: 罗红霉素
- C: 阿奇霉素
- D: 泰利霉素

答案：A

32. 患者，女，41 岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日 6~8 次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞 8~10/HP，红细胞 3~5/HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2 片，口服，3 次/日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2 次/日。

- A: 作用于肠壁的阿片受体，抑制肠蠕动
- B: 吸附消化道内气体和各种病原体、毒素
- C: 平衡消化道正常菌群，提高免疫功能
- D: 修复消化道黏膜

答案：A

33. 抗酸作用较强、慢而持久，可引起反跳性胃酸分泌增多的是

- A: 氢氧化镁
- B: 三硅酸镁
- C: 氢氧化铝
- D: 碳酸钙

答案：D

34. 眼科术后引起的眼内炎应向眼内注射

- A: 阿昔洛韦
- B: 头孢他啶
- C: 夫西地酸
- D: 利福平

答案：B

35. 治疗冠状动脉痉挛所致的变异型心绞痛最为有效的药物是()

- A: 氯沙坦
- B: 比索洛尔
- C: 硝酸异山梨酯
- D: 氨氯地平

答案：D

36. 帕罗西汀用于治疗抑郁症、社交恐怖障碍，成人的起始剂量为每日

- A: 100mg
- B: 20mg
- C: 50mg
- D: 60mg

答案：B

37. 长期频繁使用可致眼部真菌感染的药物是

- A: 利巴韦林
- B: 氯霉素
- C: 更昔洛韦
- D: 四环素可的松

答案：D

38. 阿米卡星与万古霉素合用()

- A: 后者血药浓度下降，药效降低
- B: 不良反应叠加
- C: 药理作用拮抗
- D: 后者血药浓度升高，不良反应增加

答案：B

39. 西咪替丁治疗消化性溃疡病的机制是()

- A: 抑制胃壁细胞的 H
- B: 阻断 H
- C: 阻断 CTZ 的 D
- D: 抗幽门螺杆菌

答案：B

40. 患者，女，70 岁，BMI21kg/m²，45 岁时绝经，10 年前开始，经常出现腰背部疼痛，活动后加重，但未就诊，平日外出活动较少，近 5 年身高降低，驼背明显。10 天前患者不慎摔倒，上肢活动受限、疼痛，就诊后检查结果：血钙 1.97mmol/L，血磷 1.7mmol/L，右上肢 X 光检查提示：右桡骨远端骨折。骨密度检查结果：T 值（-2.9）。

- A: 双醋瑞因
- B: 地塞米松
- C: 对乙酰氨基酚

D: 秋水仙碱

答案：C

41. 可用维生素 B12 治疗的疾病是

A: 慢性失血性贫血

B: 神经炎

C: 缺铁性贫血

D: 再生障碍性贫血

答案：B

42. 通过抑制胆碱酯酶活性，提高脑内乙酰胆碱含量的药物是

A: 多奈哌齐

B: 舍曲林

C: 艾地苯醌

D: 阿尼西坦

答案：A

43. 可促进白细胞增生的药物是

A: 粒细胞集落刺激因子

B: 维生素 B

C: 红细胞生成素

D: 叶酸

答案：A

44. 属于助消化药的是()

A: 莫沙必利

B: 奥美拉唑

C: 胃蛋白酶

D: 胶体果胶铋

答案：C

45. 肝素抗凝血治疗引起的自发性出血，宜用的抢救药物是

A: 维生素 K

B: 氨甲苯酸

C: 鱼精蛋白

D: 氨甲环酸

答案：C

46. 关于甲氨蝶呤，下列说法中错误的是

A: 主要用于治疗急性白血病

B: 强酸条件下的水解产物是谷氨酸和蝶呤酸

C: 是二氢叶酸还原酶抑制剂

D: 是二氢叶酸合成酶抑制剂

答案：D

47. 下列药物中，属于抗乙型肝炎病毒的药物是()

A: 阿德福韦酯

B: 齐多夫定

C: 喷昔洛韦

D: 奥司他韦

答案：A

48. 用于治疗射血分数低的慢性心力衰竭

A: 胺碘酮

B: 阿利吉仑

C: 阿托品

D: 沙库巴曲缬沙坦

答案：D

49. 依普黄酮可用于

A: 妊娠期及哺乳期妇女

B: 绝经期超过 2 年以上的妇女

C: 低钙血症者

D: 儿童及青少年

答案：B

50. 关于下列抗酸剂的描述，不正确的是

A: 碳酸氢钠属于吸收性抗酸剂

B: 最佳服药时间是餐前

C: 抗酸药直接中和胃酸

D: 不推荐用抗酸剂缓解非甾体抗炎药相关症状。预防溃疡发生

答案：B

51. 药粉误入眼内可能引起或加重窄角型青光眼、眼睛疼痛或不适、短暂视物模糊、视觉晕轮或彩色影像的是

A: 氨溴索

B: 沙丁胺醇

C: 噻托溴铵

D: 喷托维林

答案：C

52. 患者，女，41 岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日 6~8 次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞 8~10 / HP，红细胞 3~5 / HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2 片，口服，3 次 / 日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2 次 / 日。

- A: 平衡消化道正常菌群，提高免疫功能
- B: 作用于肠壁的阿片受体，抑制肠蠕动
- C: 吸附消化道内气体和各种病原体、毒素
- D: 修复消化道黏膜

答案：B

53. 铁剂用于治疗

- A: 溶血性贫血
- B: 再生障碍性贫血
- C: 巨幼细胞贫血
- D: 小细胞低血红蛋白性贫血

答案：D

54. 不耐酸，口服剂型多制成酯化物，为肝药酶抑制剂的药物是

- A: 氨曲南
- B: 克拉霉素
- C: 克林霉素
- D: 红霉素

答案：D

55. 头孢曲松

- A: 用于非典型病原体感染
- B: 肾毒性较大

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

D: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

答案：D

56. 以下药物的镇咳作用从弱到强排列正确的是

- A: 喷托维林、右美沙芬、苯丙哌林
- B: 苯丙哌林、可待因、吗啡
- C: 喷托维林、苯丙哌林、可待因
- D: 可待因、吗啡、右美沙芬

答案：A

57. 激动 I₁ 咪唑啉受体的降压药是

- A: 肼屈嗪
- B: 可乐定
- C: 利血平
- D: 吡那地尔

答案：B

58. 患儿，5 岁。有咽痛、肌肉酸痛、咳嗽，实验室检查为支原体感染；医师处方红霉素治疗。

- A: 易被胃酸破坏，临床常用其肠衣片或酯化物
- B: 红霉素广泛分布于各种组织和体液中
- C: 常见用药后 10 日出现转氨酶升高
- D: 静脉滴注速度过快可发生心脏毒性

答案：B

59. 焦虑型、夜间醒来次数较多者宜选用

- A: 氯美扎酮
- B: 谷维素
- C: 氟西泮
- D: 夸西泮

答案：C

60. 患者，男，45 岁。以"间断巩膜黄染伴腹胀 2 年，加重 1 周"之主诉入院。患者 2 年前无明显诱因出现巩膜黄染，伴有腹胀，在当地医院诊断为酒精性肝硬化。1 周前患者上述症状加重，胃镜检查：胃溃疡(A

- A: 治疗胃溃疡
- B: 预防消化道出血
- C: 治疗肝硬化
- D: 缓解腹胀

答案：A

61. 因抑制血管内皮的前列腺素的生成,使血管内的前列腺素和血小板中的血栓素动态平衡失调而致血栓形成风险增加的非甾体抗炎药是()

- A: 吲哚美辛
- B: 阿司匹林
- C: 双氯芬酸
- D: 塞来昔布

答案：D

62. 眼底散瞳检查宜选用

- A: 拉坦前列素滴眼剂
- B: 氯霉素滴眼剂
- C: 托吡卡胺滴眼剂
- D: 碘苷滴眼剂

答案：C

63. 主要抑制排卵的短效口服避孕药是()

- A: 复方炔诺酮

- B: 丙酸睾酮
- C: 苯丙酸诺龙
- D: 炔诺酮

答案：A

64. 分子中含有强碱性基团，可与肝素分子中的硫酸根迅速结合，形成无活性的稳定复合物，使肝素失去抗凝活性的是

- A: 鱼精蛋白
- B: 氨甲环酸
- C: 酚磺乙胺
- D: 维生素 K1

答案：A

65. 维生素 C 缺乏时引起

- A: 成人佝偻病
- B: 脚气病
- C: 坏血病
- D: 角膜软化症

答案：C

66. 关于甲硝唑作用特点和用药注意事项的说法错误的是()

- A: 甲硝唑半衰期比奥硝唑短
- B: 甲硝唑代谢产物可能使尿液颜色加深
- C: 甲硝唑属于时间依赖型抗菌药物
- D: 甲硝唑有致突变和致畸作用

答案：C

67. 与长春新碱合用可增强第Ⅷ对脑神经障碍

- A: 替尼泊苷
- B: 异烟肼
- C: 铂类
- D: 非格司亭

答案：C

68. 链激酶应用过量可选用的拮抗药是

- A: 氨基己酸
- B: 维生素 K1
- C: 鱼精蛋白
- D: 葡萄糖酸钙

答案：A

69. 患者，女，40 岁。癫痫病史 3 年，近来常觉头痛，测量血压为 170 / 110mmHg。

- A: 硝苯地平
- B: 氨氯地平
- C: 维拉帕米
- D: 尼莫地平

答案：D

70. 患者，男，70 岁。进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示胃多发性溃疡(A

- A: 替米沙坦
- B: 埃索美拉唑钠
- C: 美托洛尔
- D: 胶体果胶铋胶囊

答案：D

71. 糖皮质激素用于某些慢性病的长期疗法中，采用隔日 1 次给药法，将 48 小时用量一次服用，合适的时间是

- A: 下午 6 时
- B: 下午 3 时
- C: 上午 8 时
- D: 中午 12 时

答案：C

72. 关于他汀类药物降脂特点的描述，错误的是

- A: 降低血低密度脂蛋白固醇 (LDL-ch)
- B: 较弱的降低三酰甘油 (TG) 的作用
- C: 降低高密度脂蛋白固醇 (HDL-ch)
- D: 降低血总胆固醇 (TC)

答案：C

73. 关于铂类药物的描述，下列说法错误的是

- A: 广谱抗肿瘤药物
- B: 顺铂是结、直肠癌的首选药之一
- C: 作用机制是破坏 DNA 的结构和功能
- D: 细胞增殖周期非特异性抑制剂

答案：B

74. 肾上腺糖皮质激素类药物的共同药理作用不包括

- A: 免疫抑制
- B: 抗休克
- C: 抗炎
- D: 抗病毒

答案：D

75. 延长动作电位时程的广谱抗心律失常药物是()

- A: 维拉帕米
- B: 胺碘酮
- C: 奎尼丁
- D: 美西律

答案：B

76. 根据糖皮质激素分泌的昼夜节律，慢性病治疗如何给药对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制较轻

- A: 上午 8 时左右
- B: 下午 4 时左右
- C: 中午 12 时左右
- D: 晚餐前

答案：A

77. (2019 年真题) 长期使用可引起听力减退、肾功能下降的抗结核药物是()

- A: 利福平
- B: 吡嗪酰胺
- C: 链霉素
- D: 乙胺丁醇

答案：C

78. 下列关于镇痛药物的禁忌证，错误的是

- A: 心源性哮喘禁用吗啡
- B: 多痰患者禁用可待因

C: 颅脑损伤患者禁用羟考酮

D: 室上性心动过速禁用哌替啶

答案: A

79. 主要经肝代谢，主要代谢产物有促智作用的药物是

A: 艾地苯醌

B: 多奈哌齐

C: 阿尼西坦

D: 舍曲林

答案: C

80. 非选择性的钙拮抗剂是

A: 氟桂利嗪

B: 维拉帕米

C: 硝苯地平

D: 地尔硫卓

答案: A

81. 可影响胞浆膜通透性，引起细胞内重要物质外漏的药物是

A: 特比萘芬

B: 多黏菌素

C: 庆大霉素

D: 环丙沙星

答案: B

82. (2018 年真题) 紫杉醇抗肿瘤的作用机制是 ()

A: 抑制二氢叶酸还原酶, 使二氢叶酸不能被还原成四氢叶酸

B: 与 DNA 发生共价结合, 使其失去活性或使 DNA 分子发生断裂

C: 直接抑制拓扑异构酶,并与拓扑异构酶形成复合物

D: 干扰微管蛋白的合成

答案: D

83. 可与吸入性糖皮质激素合用的长效 M 胆碱受体阻断剂是

A: 孟鲁司特

B: 沙美特罗

C: 噻托溴铵

D: 多索茶碱

答案: C

84. 应用阿托品治疗肠痉挛引起口干、心悸、排尿困难是药物的

A: 变态反应

B: 毒性反应

C: 副作用

D: 继发反应

答案: C

85. 具有长效、平稳、血药浓度无峰值特点的胰岛素/胰岛素类似物是
()

A: 甘精胰岛素注射液

B: 预混胰岛素注射液

C: 精蛋白锌胰岛素注射液

D: 普通胰岛素注射液

答案: A

86. 分泌盐皮质激素的是

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 束状带和网装带

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/878051035045007022>