

[医学类试卷]临床执业医师（心血管系统）模拟试卷 1

1 心室颤动导致不可逆性脑损害，其发作至少持续

(A) 4~6 分钟

(B) 7~9 分钟

(C) 30 秒

(D) 1~3 分钟

(E) 10 分钟

2 心脏骤停最重要的诊断依据是

(A) 心音消失

(B) 手足抽动

(C) 桡动脉搏动消失

(D) 呼吸断续

(E) 呼之不应

3 最常见的后纵隔肿瘤是

(A) 脂肪瘤

(B) 神经源性肿瘤

(C) 淋巴瘤

(D) 胸腺瘤

(E) 畸胎瘤

4 治疗顽固性心力衰竭首先进行的处理是

(A) 做血液超滤

(B) 使用非洋地黄类强心药

(C) 联合应用利尿剂

(D) 静脉应用血管扩张剂

(E) 寻找病因

5 左心房增大合并明显肺动脉高压时心界为

(A) 普大形

(B) 三角烧瓶形

(C) 球形

(D) 梨形

(E) 靴形

6 提示室性心动过速的特征性心电图是

- (A) QRS 波群电交替
- (B) 室性融合波
- (C) P 波与 QRS 波群传导比例为 1: 2
- (D) QRS 波群至逆传 P 波的时间小于 0.10秒
- (E) 心动过速由房性期前收缩诱发

7 最可能加重变异性心绞痛的是

- (A) 抗血小板药物
- (B) 硝酸酯类药物
- (C) 钙通道阻滞剂
- (D) 调脂药物
- (E) β 受体阻滞剂

8 Per 试验可了解

- (A) 下肢深静脉瓣膜的状况
- (B) 下肢深静脉通畅的状况
- (C) 大隐静脉瓣膜的状况
- (D) 深静脉交通支瓣膜的状况

(E) 肢体动脉供血状况

9 大隐静脉曲张，高位结扎手术用于

(A) 静脉血栓形成

(B) 静脉石形成

(C) 交通支瓣膜闭锁不全

(D) 大隐静脉上端瓣闭锁不全

(E) 深静脉梗阻

10 大隐静脉曲张伴有深静脉阻塞者应采用

(A) 大隐静脉高位结扎术

(B) 高位结扎加曲张静脉切除术

(C) 5%鱼肝油酸钠注射治疗

(D) 下肢筋膜下静脉交通支结扎术

(E) 以上都不对

11 下列关于疾病与疼痛类型关系的叙述，哪项是错误的

(A) 血栓闭塞性脉管炎早期有运动性疼痛

(B) 动脉硬化性闭塞症，下垂患肢可缓解疼痛

(C) 下肢动脉闭塞病变严重者，高温热敷能缓解疼痛

(D) 下肢静脉曲张时，下垂患肢可加重胀痛

(E) 动脉性溃疡比静脉性溃疡的静息痛严重

12 下述哪种表现不是血栓闭塞性脉管炎的特点

(A) 病人多为男性青壮年

(B) 病变主要侵袭四肢中、小动静脉

(C) 肢体缺血症状多是周期性发作

(D) 反复发作游走性浅静脉炎

(E) X 线检查显示动脉有钙化斑

13 对于肥厚型心肌病，下列哪项是错误的

(A) 左心室腔明显增大，左心室壁心肌明显肥厚

(B) 胸骨左缘可闻及收缩期杂音，做 Valsava 试验时杂音增强

(C) 超声心动图可见 SAM 征

(D) β 受体阻滞剂为首选药物

(E) 常可发生猝死

14 对于高动力循环状态的病理生理改变，下列哪项不正确

- (A) 血压增高
- (B) 心排血量增多
- (C) 心率增快
- (D) 肺毛细血管楔压增加
- (E) 周围循环血液灌注增多

15 对于急性心肌梗死并发症，下列哪项正确

- (A) 乳头肌断裂多见于二尖瓣前乳头肌
- (B) 心脏破裂多见于室间隔穿孔破裂
- (C) 心室壁瘤发生于心梗后 3 个月
- (D) 急性心梗早期即可伴发肺梗死
- (E) 心梗后综合征发生率约为 1%~2%

16 对于急性心肌梗死溶栓治疗，下列哪项不正确

- (A) 心电图出现病理性 Q 波，不宜再溶栓
- (B) 长时间心肺复苏后不宜再溶栓
- (C) 采用 rtPA 溶栓后要随即应用肝素抗凝
- (D) 再灌注心律失常出现与否不是溶栓成败的主要标准

(E) 用尿激酶做静脉溶栓，首次剂量宜 150 万单位

17 对于继发性高血压，下列哪项不正确

(A) 慢性肾小球肾炎所致的高血压主要与水、钠潴留及血容量增加有关

(B) 肾血管性高血压在继发性高血压中属不常见的一种

(C) 原发性醛固酮增多症仅少数病例可发展为重度或恶性高血压

(D) 嗜铬细胞瘤在继发性高血压中是较少的一种

(E) 对 40 岁以下的高血压者应着重考虑继发性高血压的可能

18 对于卧位型心绞痛，下列哪项不正确

(A) 属稳定型心绞痛范畴

(B) 可偶在午睡时发作

(C) 可能与冠心病患者左心室功能下降有关

(D) 硝酸甘油疗效较差

(E) 可出现心肌梗死或猝死

19 对于心房颤动的诊断，下列哪项不正确

(A) 心音强弱不等

(B) 心律绝对不齐

(C) 容易听到第四心音

(D) 心率大于脉率

(E) 心电图 P 波消失，代之 f 波

20 对于心室重构的概念，下列哪项不正确

(A) 心肌损害，心脏负荷过重，室壁应力增加，心室反应性肥大

(B) 肥厚心肌纤维缩短能力和心室排血能力下降

(C) 肥厚心肌收缩速度下降，松弛延缓

(D) 心肌适度肥厚足以克服室壁应力时，心功能可维持正常

(E) 早期心脏肥厚对维护心功能有益

21 对于诊断急性纤维蛋白性心包炎最具特征性的是

(A) 心前区疼痛

(B) 心包摩擦音

(C) 心浊音界向两边扩大

(D) 心前区搏动减弱或消失

(E) 心音遥远

22 二尖瓣关闭不全杂音的特征，下列哪项不正确

- (A) 反流量大，杂音音调高
- (B) 瓣膜增厚，杂音粗糙
- (C) 前瓣损害为主，杂音向左腋下传导，第一心音减弱不明显
- (D) 由于左心室射血期延长，可导致第二心音逆分裂
- (E) 风心病所致的杂音主要为收缩早、中期

23 肥厚型梗阻性心肌病患者，活动后出现心前区痛、头晕，最适宜的治疗药物是

- (A) 硝酸甘油
- (B) 罂粟碱
- (C) 地西洋
- (D) 普萘洛尔(心得安)
- (E) 去痛片

24 服用洋地黄治疗的病人出现下列哪项表现应考虑有洋地黄中毒的可能

- (A) 心电图 ST-T 呈鱼钩形改变
- (B) 心电图 QT 间期缩短
- (C) 心电图出现高 U 波
- (D) 频发房性期前收缩

(E) 频发室性期前收缩

25 感染性心内膜炎不出现下列哪项体征

(A) 杵状指

(B) Osler结

(C) Roth点

(D) Janeways结

(E) Duroziez征

26 高血钾可使下列哪项洋地黄所致的心律失常加重

(A) 室性期前收缩、二联律

(B) 心室率快的心房颤动

(C) 非阵发性交界性心动过速

(D) 完全性心脏传导阻滞

(E) 室性心动过速

27 高血压病死亡原因最常见的为

(A) 心肌梗死

(B) 脑血管意外

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/878125073031007045>