

2024 年河北省易县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库【黄金题型】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 制定新药新知识培训制度，归属于用药错误预防策略中的

- A: 管理规范到位
- B: 科学发展
- C: 环境与流程的优化与持续改进
- D: 人员培训

答案：D

2. (新药 4 期临床评价的局限性) II 期临床试验很难发现"低于 1% 发生率"的不良反应，属于

- A: 考察不全面
- B: 观察时间短
- C: 管理漏洞
- D: 病例数量少

答案：D

3. 具有吸附力，对氰化物无效的洗胃液是

- A: 3% 鞣酸溶液
- B: 1: 5000 高锰酸钾
- C: 淀粉溶液
- D: 活性炭混悬液

答案：D

4. (消化性溃疡病的治疗)，除中和胃酸外，尚具有黏膜保护作用

- A: 溴丙胺太林
- B: 硫糖铝
- C: 奥美拉唑
- D: 硫酸镁

答案：B

5. 单个样品量足够的随机对照试验结果属于

- A: 二级证据
- B: 四级证据
- C: 一级证据
- D: 三级证据

答案：A

6. 处方前记项下包括的项目（）

- A: 临床诊断、费别
- B: 主要实验室数据
- C: 对药物治疗的建设性意见与结果评价
- D: 医师签名、药品金额

答案：A

7. 饭后半小时服用的药物是（）

- A: 枸橼酸铋钾
- B: 瑞巴派特
- C: 雷贝拉唑
- D: 吉法酯

答案：D

8. 高血压合并消化性溃疡者宜不用

- A: 酚妥拉明
- B: 利血平
- C: 甲基多巴
- D: 硝苯地平

答案：B

9. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及嗝气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次 / 分、R20 次 / 分、BP110 / 70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次 / 分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有一 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

- A: 如原方案中已应用克拉霉素，应避免再次使用
- B: 如原方案中已应用甲硝唑，且日剂量达到 1600mg / d，重复应用时剂量加倍
- C: 应重复原方案治疗 2 周
- D: 如原方案中已应用左氧氟沙星，重复应用时剂量加倍

答案：A

10. 再生障碍性贫血、巨幼细胞性贫血可导致

- A: 红细胞生成过多
- B: 红细胞丢失过多
- C: 血红蛋白生成减少
- D: 红细胞生成减少

答案：D

11. 酮康唑、氟康唑、伊曲康唑可导致

- A: 药源性肾损害
- B: 药源性神经损害
- C: 药源性血损害
- D: 药源性肝损害

答案：D

12. 痛风慢性期应长期使用的促尿酸排泄药是

- A: 阿司匹林
- B: 秋水仙碱
- C: 别嘌醇
- D: 丙磺舒

答案：D

13. 患者，男，70岁，2周以来出现尿频、夜尿次数明显增多，且尿流变细、间断，排尿踌躇、费力等排尿困难现象，排尿后滴沥、尿不尽，近几天又出现睡眠障碍。

- A: 米多君
- B: 索利那新
- C: 非那雄胺
- D: 坦索罗辛

答案：C

14. (消化性溃疡病的治疗)，解除平滑肌痉挛和镇痛宜选用

- A: 溴丙胺太林
- B: 奥美拉唑
- C: 硫酸镁
- D: 硫糖铝

答案：A

15. 下列病原体中，可导致沙眼的是

- A: 变形杆菌
- B: 豚解支原体
- C: 大肠埃希菌
- D: 沙眼衣原体

答案：D

16. 必须立即用清水冲洗至少 5 分钟是清除（）

- A: 皮肤污染酚类毒物
- B: 眼内污染毒物
- C: 眼内进入固体腐蚀性颗粒
- D: 毛发被毒物污染

答案：B

17. 关于头痛、偏头痛、紧张性头痛、三叉神经痛的药物治疗(对症治疗),对钝痛如牙痛、头痛、神经痛等有较好的镇痛效果的是

- A: 服用麦角胺咖啡因片、罗通定片、天麻素、苯噻啶、舒马曲坦、佐米曲坦
- B: 乙酰氨基酚、布洛芬、阿司匹林等

C: 推荐应用地西泮(安定)片

D: 一般可首选对乙酰氨基酚，推荐合并应用谷维素、维生素 B1

答案：B

18. 禁用或慎用氟喹诺酮类、四环素类、氯霉素、氨基糖苷类，是指

A: 严格掌握用药剂量

B: 密切监护

C: 明确诊断

D: 严格掌握适应证

答案：D

19. 吸烟后延缓胃溃疡的愈合，而加重出的药物是

A: 胰岛素

B: 西咪替丁

C: 呋塞米

D: 氯丙嗪

答案：B

20. (2017 年真题) 缺铁性贫血患者常表现为 ()

A: 嗜酸性粒细胞增多

B: 血红蛋白减少

C: 中性粒细胞增多

D: 红细胞增多

答案：B

21. 吴先生因晚期肝癌口服吗啡缓释片姑息治疗，因疼痛加剧，自行嚼碎 3 片后疼痛有所缓解，但家人随即发现患者出现呼吸抑制、浅昏迷状态，紧急就医，医师发现患者已出现针尖样瞳孔。针对该患者，除立即进行气道保护、给予氧气外，应同时注射

- A: 纳洛酮
- B: 醋酸甲羟孕酮
- C: 氟哌啶醇
- D: 美沙酮

答案：A

22. 某患者，诊断为抑郁症，服用帕罗西汀 6 周，无明显效果，现考虑更换 MAOIs 类药物，必须先停用帕罗西汀

- A: 3 天
- B: 2 周
- C: 5 天
- D: 1 周

答案：B

23. 可提示肝硬化、慢性肝炎的是

- A: 血清碱性磷酸酶升高
- B: A/G 值低于 1
- C: 丙氨酸氨基转移酶升幅很高
- D: γ -谷氨酰转移酶升高

答案：B

24. 淡红色处方作为

- A: 麻醉药品和第一类精神药品处方
- B: 儿科处方

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 普通处方

D: 急诊处方

答案：A

25. 服用帕罗西汀等选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的患者，如果欲更换用单胺氧化酶抑制剂，必须先停用（）

- A: 7 天
- B: 10 天
- C: 14 天
- D: 5 天

答案：C

26. （2020 年真题）患者，男，66 岁，2 型糖尿病，长期口服二甲双胍，格列美脲，近日查空腹血糖 12.3mmol/L，糖化血红蛋白 9.0%，主诊医师加用“甘精胰岛素每日 1 次+门冬胰岛素每日 3 次”，关于该患者药物治疗方案的说法，正确的是（）

- A: 甘精胰岛素应避免与二甲双胍联合使用
- B: 门冬胰岛素应在三餐前 30 分钟皮下注射
- C: 因采用一日多次胰岛素治疗，格列美脲应停用
- D: 患者为 2 型糖尿病，加用胰岛素一日 4 次方案不适宜

答案：C

27. 关于胃黏膜保护剂胃舒平的服药方式，正确的是

- A: 餐前服用，充分咀嚼后咽下
- B: 宜多饮水，减轻刺激
- C: 直接吞咽
- D: 餐后服用

答案：A

28. 下列药学服务的重要的人群中，特殊人群是指

- A: 应用特殊剂型者
- B: 需要重新选择药品或调整用药方案者
- C: 药物治疗窗窄、需要做监测者
- D: 肝肾功能不全者

答案：D

29. 使尿液呈碱性，可增加抗菌活性、减轻肾毒性，食醋则会加重其毒性作用的是

- A: 大环内酯类
- B: 氨基糖苷类
- C: 头孢菌素类
- D: 林可霉素类

答案：B

30. 治疗社区获得性肺炎时，由于我国的肺炎链球菌对其耐药率高，不单独使用的药物为

- A: 青霉素
- B: 头孢唑林
- C: 红霉素
- D: 莫西沙星

答案：C

31. 成人静脉血白细胞计数的正常范围值

- A: $(10.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$
- B: $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$
- C: $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9/L$
- D: $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9/L$

答案：D

32. 患者,男,28岁,外出进餐后出现腹泻,日6次,水样便,无发热和腹痛症状。宜选用的药物是 ()

- A: 干酵母片
- B: 蒙脱石散
- C: 复方阿嗪米特肠溶片
- D: 奥美拉唑肠溶胶囊

答案: B

33. 可能导致因心力衰竭和呼吸衰竭而死亡的是

- A: 蛋白同化制剂
- B: 肽激素类
- C: 易制毒药品
- D: 精神刺激剂

答案: C

34. 可能增加严重心血管疾病风险,减肥治疗的风险大于获益,已于2010年10月在我国停止生产、销售和使用的减重药是

- A: 芬特明
- B: 奥利司他
- C: 西布曲明
- D: 安非拉酮

答案: C

35. 女性,32岁,3年来月经量多,乏力、心悸。检查面色较苍白。血红蛋白80g/L,呈小细胞低色素性贫血,白细胞 7×10^9

- A: 再生障碍性贫血
- B: 溶血性贫血

C: 缺铁性贫血

D: 巨幼红细胞性贫血

答案：C

36. 针对该患者的现有症状,应选用的药物是 ()

A: 布地奈德吸入剂

B: 单硝酸异山梨酯缓释片

C: 多潘立酮片

D: 奥美拉唑肠溶胶囊

答案：D

37. (2019 年真题) 患者, 男, 25 岁, 有癫痫病史 2 年, 一直服用丙戊酸钠和左乙拉西坦, 癫痫控制良好, 近期因社区获得性肺炎入院。

下列药物中最可能影响患者基础疾病控制的是

A: 莫西沙星

B: 头孢曲松

C: 阿莫西林

D: 阿奇霉素

答案：A

38. 不能解除病因, 不宜长期服用的; 但对慢性钝痛如牙痛、头痛、关节痛等有较好的镇痛效果药物是

A: 罗通定

B: 谷维素

C: 地西泮

D: 阿司匹林

答案：D

39. 以下药物中，妊娠妇女使用可能引起胎儿肢体、耳、内脏畸形的是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 苯妥英钠
- C: 辛伐他汀
- D: 沙立度胺

答案：D

40. 药师在进行药学服务时，经常查阅一些相关网站，获取一些有用信息}中华医学会的网址是

- A: org. cn
- B: www. cm
- C: org. cn
- D: www. cp

答案：B

41. （2015 年真题）患者，女。62 岁，医师处方如下：

- A: 二甲双胍
- B: 氯吡格雷
- C: 氨氯地平
- D: 阿卡波糖

答案：B

42. 可稀释痰液，并借助咳嗽反射以帮助痰液排出，避免阻塞气道的药品是

- A: 沙丁胺醇
- B: 扎鲁司特
- C: 布地奈德
- D: 羧甲司坦

答案：D

43. 患尿路感染，在无病原学结果前，一般首选（）

- A: 针对革兰阴性杆菌有效的抗菌药物
- B: 针对革兰阳性杆菌有效的抗菌药物
- C: 针对革兰阴性球菌有效的抗菌药物
- D: 针对革兰阳性球菌有效的抗菌药物

答案：A

44. 可提示轻度黄疸的是

- A: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$
- B: $>342 \mu\text{mol/L}$
- C: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- D: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

答案：C

45. 禁用于严重痛风患者的调脂药物为

- A: 非诺贝特
- B: 考来烯胺
- C: 烟酸类
- D: 阿托伐他汀

答案：C

46. 患者，男，53岁。因心前区疼痛6年，加重伴呼吸困难10小时入院。入院前6年感心前区疼痛，痛系膨胀性或压迫感，多于劳累、饭后发作，每次持续3~5min，休息后减轻。入院检查：体温 37.8°C ，心率130次/分，血压80/40mmHg。呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻有湿鸣音，心界向左扩大，心音弱，入院诊断为冠心病。

- A: 无症状型心肌缺血型
- B: 冠状动脉粥样硬化型心脏病
- C: 非 ST 段抬高型心肌梗死
- D: 稳定型心绞痛

答案：C

47. 病毒神经氨酸酶抑制剂（扎那米韦、奥司他韦）使用的最佳时间是

- A: 在流感症状严重时
- B: 在流感症状初始时
- C: 在流感症状初始 48 小时内
- D: 在流感症状严重 24 小时内

答案：C

48. 患者，男，43 岁，患有家族性痛风，既往有磺胺类药物过敏史患者近日因工作应酬较多，未能控制饮食，昨夜造成痛风急性发作，右足第一跖趾关节出现红、肿、热、痛，疼痛剧烈。因无法忍受，今日晨起后速来药店购药，药师应推荐的药物是

- A: 丙磺舒
- B: 碳酸氢钠
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 别嘌醇

答案：C

49. 服用头孢曲松、甲硝唑、氯丙嗪等应该禁用的是

- A: 咖啡
- B: 浓茶
- C: 酒
- D: 烟

答案：C

50. 普通处方一般不得超过几日用量

A: 1

B: 3

C: 5

D: 7

答案：D

51. 血管紧张素转化酶抑制剂

A: 依普利酮

B: 阿利吉仑

C: 雷米普利

D: 阿米洛利

答案：C

52. 归属"用药记录"项下的是

A: 联合用药

B: 主要实验室检查数据

C: 临床诊断

D: 医保和费用支付情况

答案：A

53. 服用 α 受体阻断剂后，如果服用西地那非，建议服药间隔时间应为

A: 48 小时

B: 1 周

C: 24 小时

D: 4 小时

答案：D

54. 计算儿童用药剂量的方法中比较合理的是

A: 根据儿童体重计算

B: 根据儿童病情计算

C: 根据儿童年龄计算

D: 根据体表面积计算

答案：D

55. 癫痫持续状态首选的治疗方案是()

A: 口服地西泮 10mg

B: 静脉注射丙戊酸钠 200mg

C: 口服丙戊酸钠 200mg

D: 静脉注射地西泮 10mg

答案：D

56. 患者，女，36 岁。餐后出现恶心、呕吐，可选用的药物是

A: 维生素 C

B: 二甲硅油制剂

C: 甲氧氯普胺或多潘立酮片

D: 鞣酸蛋白

答案：C

57. 皮肤接触腐蚀性毒物，须用中和液或解毒液冲洗，且冲洗的时间要达

A: 10~20min

B: 15~30min

C: 20~30min

D: 5~10min

答案: B

58. 使用片、粒、袋、支等清晰易懂的计数单位，是针对

A: 交代用药注意事项

B: 交代药品贮存条件与方法

C: 交代用药途径及用药方法

D: 交代药物的用量

答案: D

59. 非甾体类抗炎药引起的典型药源性疾病是

A: 胃肠道反应

B: 肌病

C: 血液系统疾病

D: 神经系统疾病

答案: A

60. 具有变形运动和吞噬功能，可吞噬抗原抗体复合物或细菌的细胞为

A: 嗜碱性粒细胞

B: 嗜酸性粒细胞

C: 淋巴细胞

D: 中性粒细胞

答案: B

61. 根据《中国成人超重和肥胖预防控制指南》体重指数(BMI)判断为肥胖的标准是()

A: $BMI \geq 28.0$

B: $\text{BMI} \leq 18.5$

C: $\text{BMI} \geq 24.0$

D: $\text{BMI} < 21.5$

答案：A

62. 治疗缺铁性贫血的首选药物是

A: 维生素 B12

B: 叶酸

C: 硫酸亚铁

D: 维生素 C

答案：C

63. 可引起儿童良性颅压增高、囟门隆起的药物是

A: 氯霉素

B: 维生素 A

C: 抗组胺药

D: 苯妥英钠

答案：B

64. 对服用抗蠕虫药后出现腹痛或口吐蛔虫的严重感染患者，应加服

A: 噻嘧啶

B: 甲苯咪唑

C: 枸橼酸哌嗪

D: 伊维菌素

答案：A

65. 患者，男，26 岁，自述头痛、咽喉痛、全身乏力、畏寒，偶尔咳嗽，并有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。经检查后，测量口腔体温 37.8℃，脉搏 72 次/分，白细胞计数 $3.7 \times 10^9/L$ 。医生为患者开具的处方如下：

- A: 高热
- B: 中等度热
- C: 正常
- D: 低热

答案：D

66. 某女孩，6 岁，2 个月来反复出现突发突止的意识障碍，表现为突然动作中断，呆立凝视、呼之不应，手中物体掉落。但从不跌倒，持续数秒钟可缓解。

- A: 卡马西平
- B: 苯妥英钠
- C: 丙戊酸钠
- D: 地西泮

答案：C

67. 赵某，男性，60 岁，既往高血压病史 8 年。与邻居吵架后突然起病，言语不清、左侧肢体无力、意识不清。查体：BP210 / 120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激阳性，左侧肢体无法活动，左侧巴宾斯基征阳性。

- A: 硝普钠
- B: 呋塞米
- C: 甘油果糖
- D: 尼莫地平

答案：C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

68. 枸橼酸铋钾所致的主要不良反应是

- A: 性功能减退
- B: 腹痛
- C: 神经毒性
- D: 皮炎

答案：C

69. 药学服务的具体内容不包括

- A: 药学信息收集
- B: 静脉药物配置
- C: 处方的审核与调配
- D: 药品推销

答案：D

70. 以维生素 C 注射液作溶剂溶解后注射的是

- A: 谷胱甘肽
- B: 盐酸烯丙吗啡
- C: 双解磷
- D: 亚硝酸钠

答案：A

71. 患者，女，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190 / 110mmHg，R30 次 / 分，P108 次 / 分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 阵发性室上性心动过速
- B: 室性期前收缩
- C: 心室颤动
- D: 心房颤动

答案：D

72. 宜用常量短期治疗，以免产生依赖性，可用于 IBS 患者止泻的药物是

- A: 地芬诺酯
- B: 匹维溴铵
- C: 环孢素 A
- D: 蒙脱石散

答案：A

73. 促进肾小管对钠的重吸收，引起高血压的药物是

- A: 咖啡因
- B: 糖皮质激素
- C: 重组人促红细胞生成素
- D: 伪麻黄碱

答案：B

74. 用于疼痛治疗、耐受性最好的非甾体抗炎药是

- A: 布洛芬
- B: 阿司匹林
- C: 塞来昔布
- D: 贝诺酯

答案：A

75. 关于帕金森病患者的用药指导，错误的是

- A: 老年患者尽量选用苯海索，除非震颤严重影响生活质量
- B: 金刚烷胺剂量为 50~100mg，2~3 次/日，末次应在下午 4 时前服用

C: 苯海索不宜与单胺氧化酶抑制剂同时服用

D: 对于认知功能减退或因特殊工作之需，力求显著改善运动症状，可选用复方左旋多巴作为治疗首选药

答案：A

76. 由细菌引起的急性卡他结膜炎可选用

A: 0.1%碘苷滴眼剂

B: 0.1%羟苄唑滴眼剂

C: 2%色甘酸钠滴眼剂

D: 四环素眼膏

答案：D

77. 患者，男，72岁，以“间断发热、纳差、精神抑郁半年，再发高热1天”为主诉入院，既往体健，无高血压、糖尿病、冠心病史。入院时查体：T36.9℃，P88次/分，R22次/分，BP112/77mmHg，可触及颈部、锁骨上、腋下多部位浅表淋巴结肿大。经实验室检查、影像学检查，确诊为非霍奇金淋巴瘤。

A: 顺铂+利妥昔单抗+格拉司琼+芬太尼

B: 伊立替康+环磷酰胺+甲氨蝶呤+地塞米松

C: 环磷酰胺+阿霉素+长春新碱+泼尼松

D: 紫杉醇+吉非替尼+环磷酰胺+美司钠

答案：C

78. “药师参与临床药物治疗，提供药学服务的重要方式和途径”的工作是

A: 静脉药物配置

B: 处方调剂

C: 参与临床药物治疗

D: 治疗药物监测

答案: D

79. 下列哪种药物不会引起丙氨酸氨基转移酶 (ALT、GPT) 升高 ()。

A: 硝苯地平

B: 氟康唑

C: 阿昔洛韦

D: 克林霉素

答案: A

80. 反复吸入亚硝酸异戊酯，可解救

A: 氰化氢中毒

B: 丙米嗪中毒

C: 苯丙胺中毒

D: 氯丙嗪中毒

答案: A

81. #NAME?

A: #NAME?

B: #NAME?

C: #NAME?

D: #NAME?

答案: D

82. 首次给药在睡前上床后服用，适用于高血压伴前列腺增生，也用于难治性高血压患者降压药种类是

A: β 受体阻断剂

B: ACEI 和 ARB

C: 钙通道阻滞剂

D: α 受体阻断剂

答案：D

83. 非甾体类抗炎药导致消化性溃疡病的主要机制是（）

A: 影响胃、十二指肠协调运动

B: 抑制胃酸分泌

C: 促进胃酸分泌

D: 破坏胃黏膜屏障

答案：D

84. 阿卡波糖可能导致的不良反应是

A: 消化道反应、过敏和白细胞减少

B: 心力衰竭和水肿

C: 腹胀、肠鸣音亢进

D: 肌痛、关节痛和高血压

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/885002042122012033>