

2024 湖北省《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试真题及答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，女，48 岁，身高 158cm，体重 72kg。最近因感觉易疲劳、怕冷、嗜睡、记忆力逐渐减退等情况前来就医。医生检查发现，患者眼睑和手部皮肤水肿，声音嘶哑、毛发稀落。实验室检查示：血清 TSH 水平升高。确诊为甲状腺功能减退症。

- A: 早餐前 60min，空腹，1 日 1 次
- B: 可降低降糖药疗效
- C: 初始治疗宜采用最小剂量
- D: 与消胆胺同服，可增强疗效

答案：D

2. 可治疗原发性痛经的药物是

- A: 前列腺素类似物
- B: 肾上腺糖皮质激素
- C: 非甾体抗炎药
- D: 钙通道阻滞剂

答案：C

3. “嗜酸性粒细胞增多”可能提示的疾病是

- A: 铅、铋中毒
- B: 过敏性疾病如荨麻疹
- C: 感染性疾病如肺结核
- D: 病毒感染性腹泻

答案：B

4. 需要在服药时多饮水的药物不包括

- A: 抗痛风药
- B: 氨基糖苷类抗生素
- C: 平喘药
- D: 降糖药

答案：D

5. 关于药物 II 期临床试验，叙述正确的是

- A: 试验样本数常见病不少于 2000 例，考察药品在广泛使用条件下的疗效和不良反应。此期不限定单一用药
- B: 治疗作用的初步评价阶段。初步评价药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性。试验对象为目标适应证患者，多发病不少于 300 例，其中主要病种不少于 100 例，要求在同一个医院进行
- C: 试验样本数一般为 20~30 例，试验对象为健康志愿者
- D: 治疗作用的初步评价阶段。初步评价药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性。试验对象为目标适应证患者，试验样本数多发病不少于 300 例，其中主要病种不少于 100 例，要求在 3 个及 3 个以上医院进行

答案：D

6. 及时发现并确定“亮菌甲素事件”显示药物警戒的作用是

- A: 药品上市前风险评估
- B: 药品上市后风险评估
- C: 发现与规避假、劣药品流入市场
- D: 发现药品质量问题

答案：C

7. (2019 年真题) 患者，女，27 岁，确诊慢性乙型肝炎 3 年，近日化验结果：HBV-DNA 2×10^5 opies/ml，ALT122U/L。予以抗病毒治疗首选的药物是

- A: 阿糖腺苷
- B: 利巴韦林
- C: 泛昔洛韦
- D: 恩替卡韦

答案：D

8. 治疗抗肿瘤药物引起的恶心、呕吐等不良反应。可选用的止吐药物是

- A: 维生素 B6
- B: 昂丹司琼
- C: 雷尼替丁
- D: 奥美拉唑

答案：B

9. (2019 年真题) 患者，女，59 岁，绝经后 3 年，近日出现腰背疼痛，负重时疼痛加剧，骨密度 T 值为-3.5，诊断为骨质疏松，每天补充维生素 D800IU，元素钙 500mg，同时给予唑来膦酸治疗。唑来膦酸正确的给药方案是

- A: 5mg 静脉滴注，每年一次
- B: 4mg 静脉滴注，每日次
- C: 5mg 静脉滴注，每周一次
- D: 10mg 口服，每日一次

答案：A

10. 静滴、静注等给药途径的不良反应发生率较高，说明药源性疾病的药物因素是

- A: 生理因素
- B: 药物的使用
- C: 不良生活方式
- D: 药物制剂因素

答案：B

11. 哺乳期妇女泌尿道感染应该选用的药物是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 依托红霉素
- C: 米诺环素
- D: 氨苄西林

答案：D

12. 下列药物中服用后不影响驾驶行为的是（）

- A: 阿米洛利片
- B: 东莨菪碱片
- C: 氟桂利嗪胶囊
- D: 左甲状腺素钠片

答案：D

13. 女性，59 岁，间断咳嗽、咳痰 5 年，加重伴咯血 2 个月。患者表现为低热、乏力、食欲减退、咳白色黏痰、体重逐渐下降。

- A: 肺结核？
- B: 肺炎？
- C: 慢性阻塞性肺病？
- D: 支气管哮喘？

答案：A

14. 适宜餐后服用的是

- A: 普伐他汀
- B: 阿司匹林
- C: 呋塞米
- D: 格列美脲

答案：B

15. 发热持续 3 周以上，体温多次超过 38.3℃，经过至少 1 周深入细致的检查仍不能确诊的

- A: 长期低热
- B: 超高热
- C: 不明原因发热
- D: 中低等度热

答案：C

16. 根据病原体、传播和症状的不同分为上呼吸道感染(上感)和流行性感冒(流感)。上感和流感在一年四季均可发病，尤以冬、春季较为多见。

- A: 急性胰腺炎
- B: 慢性荨麻疹
- C: 急性尿潴留
- D: 严重高血压

答案：C

17. 调剂工作未执行双人核对制度，归属于

- A: 产品缺陷

- B: 操作失误
- C: 管理缺失
- D: 患者经济拮据

答案：C

18. 下列处方用药应该评判为“无适应证用药”的是

- A: 病因未明用药
- B: 忽略药品说明书提示用药
- C: 应用两种或两种以上一药多名的药物
- D: 感冒、咳嗽、无感染，给予阿奇霉素

答案：D

19. 运动员长期使用可提高疼痛忍耐力，但易导致成瘾和呼吸抑制的兴奋剂是

- A: 苯丙酸诺龙
- B: 可待因
- C: 人促红细胞生成素
- D: 氢氯噻嗪

答案：B

20. (2017 年真题) 频繁应用可引起局部组织萎缩的药物是 ()

- A: 西地碘含片
- B: 地塞米松粘贴片
- C: 替硝唑含漱液
- D: 氯己定含漱液

答案：B

21. 指明其资料来源通过超链接指向其材料来源

- A: 合理性
- B: 归因性
- C: 新颖性
- D: 权威性

答案：B

22. 沿疗滴虫性阴道炎首选的药物是()

- A: 吡喹酮栓
- B: 莫匹罗星软膏
- C: 伏立康唑片
- D: 甲硝唑栓

答案：D

23. 有机酸排出减少

- A: 肾血流量减少
- B: 肾小球滤过减少
- C: 肾小管分泌减少
- D: 肾小管重吸收增加

答案：C

24. (2019 年真题) 下列药物中，使用前无需皮试的是

- A: 紫杉醇注射剂
- B: 抑肽酶注射剂
- C: 苄星青霉素注射剂
- D: 抗狂犬病血清注射剂

答案：A

25. 属于 M 受体激动剂的是

- A: 福莫特罗
- B: 乙酰胆碱
- C: 美托洛尔
- D: 异丙托溴铵

答案：B

26. (2017 年真题) 患者女 45 岁。一年前临床诊断为室上性心动过速服用美托洛尔片 25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡幽门螺杆菌阳性。医师处方：埃索美拉唑镁肠溶片 20mgbid，甲硝唑片 0.4gbid，克拉霉素片 50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊 0.6gbid。

- A: 维生素 B6 缺乏
- B: 维生素 A 缺乏
- C: 维生素 B12 缺乏
- D: 维生素 B2 缺乏

答案：C

27. 容易引起脱发的是 ()

- A: 吉非替尼
- B: 氟尿嘧啶
- C: 阿霉素
- D: 博来霉素

答案：C

28. 为保障用药安全，需要进行血药浓度监测的药物是

- A: 罗红霉素
- B: 地高辛
- C: 青霉素
- D: 对乙酰氨基酚

答案：B

29. 对于 ACEI 类药描述错误的是

- A: 唯一的抑制心肌及血管重构药物
- B: 明显降低全身血管阻力
- C: 抑制血管紧张素转化酶 (ACE) 活性
- D: 抑制交感神经活性作用

答案：D

30. 可引起良性颅压增高、囟门隆起

- A: 抗组胺药
- B: 维生素 A
- C: 苯妥英钠
- D: 氯霉素

答案：B

31. (有关物质中毒的特效解毒剂)，有机氟中毒的特效解毒剂是

- A: 乙酰胺
- B: 维生素 K
- C: 氯解磷定
- D: 烯丙吗啡

答案：A

32. 淋巴细胞正常值参考范围是

- A: 0.20~0.40
- B: 0.01~0.05
- C: 0~0.01
- D: 0.03~0.08

答案：A

33. 0.5%硫酸铜溶液洗胃用于解救

- A: 磷化锌中毒
- B: 汞中毒
- C: 苯丙胺中毒
- D: 铅中毒

答案：A

34. 拉氧头孢

- A: 与丙戊酸钠合用可导致血药浓度过低而引发癫痫
- B: 与多种药物存在配伍禁忌，一般应单独给药
- C: 与呋塞米合用可加重肾功能损害
- D: 与氯霉素合用因竞争药物的结合位点而产生拮抗作用

答案：C

35. 可引起视力模糊的是

- A: 右美沙芬
- B: 阿米洛利
- C: 抗过敏药
- D: 东莨菪碱

答案：D

36. 服用抗利尿药时

- A: 禁吸烟
- B: 宜少饮水
- C: 忌用热水送服
- D: 宜多饮水

答案：B

37. 作用于 DNA 化学结构的药物

- A: 放线菌
- B: 顺铂
- C: 培美曲塞
- D: 依托泊苷

答案：B

38. (2015 年真题) 用药后应保持上身直立的药物是 ()。

- A: 阿莫西林
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 硫酸亚铁
- D: 去氮加压素

答案：B

39. 受精后半个月以内

- A: 可产生形态或功能的异常而造成畸形
- B: 几乎见不到药物的致畸作用
- C: 中枢神经系统发育迟缓
- D: 女性生殖系统发育迟缓

答案：B

40. 可用于了解肾小球滤过功能的是

- A: 胆固醇
- B: 尿素氮
- C: 肌酐
- D: 淀粉酶

答案：B

41. 治疗时需长期口服维生素的是

- A: 老年性骨质疏松症
- B: 原发性骨质疏松症
- C: 抗癫痫药所致的骨质疏松症
- D: 妇女绝经后骨质疏松症

答案：C

42. (2018 年真题) 患者, 女, 30 岁, 因感冒所致发热 (体温 38.5℃) 并伴有头痛、全身酸痛到药店购药, 药师应推荐的药品是 ()

- A: 对乙酰氨基酚片
- B: 氯苯那敏片
- C: 酚麻美敏片
- D: 萘甲唑啉滴鼻液

答案：A

43. 可加重痴呆及认知功能受损的是

- A: H
- B: 地西泮
- C: 异丙嗪
- D: 氯苯那敏

答案：A

44. 有关尿沉渣管型和尿沉渣结晶的叙述正确的是

- A: 常见的尿沉渣管型有透明细胞管型、白细胞管型、红细胞管型、上皮细胞管型等
- B: 尿沉渣中的无机物沉渣主要为结晶体，多来自食物代谢的结果

C: 尿沉渣管型是尿液中的沉渣在肾小管内聚集而成，尿液中出现管型是肾实质性病变的证据

D: 正常人尿沉渣中的磷酸盐、尿酸盐、草酸盐最为常见

答案：D

45. 处方中"餐前给药"的外文缩写是

A: qn

B: po

C: pc

D: ac

答案：D

46. 关于蛇咬伤中毒后的一般处理措施，叙述错误的是

A: 用绳索将伤口的近心端 5cm 处捆住，以防止毒液在体内扩散

B: 每隔 15~20min 放松带子 1~2min. 以防止肢体缺血坏死

C: 在伤口上做多个“十”字小切口以便排毒

D: 用 1: 1000 高锰酸钾溶液反复冲洗伤口

答案：D

47. 可用于香豆素类杀鼠药中毒药物是

A: 亚硝酸钠

B: 碘解磷定

C: 乙酰胺

D: 维生素 K1

答案：D

48. 为查询妊娠及哺乳期妇女用药注意事项，可首选的书籍是

A: 《注射药物手册》

- B: 《新编药物学》
- C: 《药物流行病学》
- D: 《药物治疗学：病理生理学的方法》

答案：D

49. 解热且具有抑制血小板凝集作用、可能增加出血危险的是

- A: 阿司匹林
- B: 布洛芬
- C: 吲哚美辛
- D: 贝诺酯

答案：A

50. 血小板计数正常值范围是（ / L）

- A: $(150 \sim 200) \times 10^{12}$
- B: $(100 \sim 300) \times 10^9$
- C: $(50 \sim 100) \times 10^9$
- D: $(200 \sim 250) \times 10^{12}$

答案：B

51. 每次配方尽可能 1 次完成，是针对

- A: 环境整齐、安静
- B: 规范操作、坚持核对
- C: 配备足够的人力
- D: 及时沟通

答案：B

52. (2015 年真题) 患者，男，64 岁，身高 174cm，体重 92kg。既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，临床处方，阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

A: 出现弥漫性肌痛或乏力，同时伴全身不适时，应及时就医

B: 患者使用抗血小板聚集药物时，应注意预防出血

C: 应注意监护血压变化，防止血压过度降低

D: 单硝酸异山梨酯能扩张血管引起头痛，即使可耐受也必须停药

答案：D

53. 癫痫的药物治疗失神发作首选

A: 拉莫三嗪

B: 苯妥英钠

C: 丙戊酸钠

D: 卡马西平

答案：C

54. 毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速做出准确判断，及时果断地采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

A: 二巯丙醇“驱汞”治疗

B: 药用炭吸附中毒物质

C: 弱碱中和强酸

D: 毛果芸香碱拮抗颠茄碱类中毒

答案：B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

55. 患者，女，43 岁。近 3 月来午后低热，剧烈咳嗽，痰中带血，进食少，乏力，消瘦，应用抗菌药及止咳化痰药物无效，×线检查未见异常，血沉未见增快，痰中找到结核菌，临床诊断为肺结核。

- A: 吡嗪酰胺
- B: 利福平
- C: 乙胺丁醇
- D: 异烟肼

答案：B

56. 患者，男，28 岁，2 天前因淋雨后出现发热，体温最高达 39℃，经实验室和胸片检查，临床诊断为社区获得性肺炎，无其他基础疾病，可首选的抗菌药物是

- A: 阿米卡星
- B: 头孢拉定
- C: 亚胺培南西司他汀
- D: 头孢哌酮舒巴坦

答案：B

57. （2016 年真题）患者，女，55 岁，诊断为类风湿性关节炎，既往有十二指肠溃疡病史。医生给予甲氨蝶呤+柳氮磺吡啶治疗。甲氨蝶呤用法用量正确的是（）。

- A: 75mgqd
- B: 7.5mgqod
- C: 7.5mgqw
- D: 7.5mg tid

答案：C

58. 关于癌症疼痛患者止痛药使用原则的说法，错误的是（）

- A: 应个体化用药
- B: 按阶梯给药
- C: 疼痛时用药，不痛时不需用药

D: 提倡无创给药方式，尽量口服

答案：C

59. 下列药物使用方式，正确的是()

A: 氧氟沙星滴眼液打开使用后，继续使用 3 个月

B: 乙酰半胱氨酸泡腾片用 100ml 温开水浸泡溶解后服用

C: 硝酸甘油片在心绞痛发作的紧急情况下嚼碎用冰水送服

D: 酵母片在餐后整片用水送服

答案：B

60. 药师应对处方进行审核、依照处方准确、快速地调配，体现处方的

A: 有效性

B: 经济性

C: 法律性

D: 技术性

答案：D

61. 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

A: 对乙酰氨基酚

B: 美洛昔康

C: 双氯芬酸钠

D: 尼美舒利

答案：A

62. 患者，男，69 岁，BMI27.8kg/m²，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

- A: 缓和治疗
- B: 对症治疗
- C: 姑息治疗
- D: 对因治疗

答案：B

63. 救治磷化锌中毒，不能应用的催吐药是

- A: 硫酸镁
- B: 硫酸钠
- C: 硫酸铜
- D: 阿扑吗啡

答案：D

64. 下列不属于药物警戒工作范畴的是

- A: 药品致死率估计
- B: 发现药物相互作用
- C: 发现药物不良反应
- D: 指导制定临床治疗方案

答案：D

65. 患者，男，26 岁，自述头痛、咽喉痛、全身乏力、畏寒，偶尔咳嗽，并有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。经检查后，测量口腔体温 37.8℃，脉搏 72 次/分，白细胞计数 $3.7 \times 10^9/L$ 。医生为患者开具的处方如下：

- A: 1 次

B: 3 次

C: 4 次

D: 2 次

答案: C

66. 下列著名药学专著中，收录有 5500 余种药物专论、4 万多篇参考文献的是

A: 《中国国家处方集》

B: 《药物事实与比较》

C: 《医师案头参考》

D: 《马丁代尔药物大典》

答案: D

67. 对于铁剂的使用，错误的是

A: 口服铁剂是治疗缺铁性贫血的首选方法？

B: 钙剂可促进铁剂吸收？

C: 口服铁剂宜选用 2 价铁？

D: 为了补足储存铁，铁剂治疗应该在 Hb 正常后至少再补充铁剂 4~6 个月？

答案: B

68. 医师书写处方时经常使用外文缩写，医师在指导用药时需要准确掌握和解释。O

A: 适量

B: 右眼

C: 左眼

D: 是()

答案: D

69. 血清天门冬氨酸氨基转移酶正常参考区间是

- A: 男性 11~50U/L
- B: 成人<50U/L
- C: 成人<40U/L
- D: 男性<40U/L

答案: C

70. 治疗需用 10%葡萄糖注射液 1000ml，现仅有 50%和 5%浓度的葡萄糖注射液，分别取 50%和 5%浓度的葡萄糖注射液多少毫升进行配制

- A: 200ml, 800ml
- B: 111ml, 889ml
- C: 500ml, 500ml
- D: 889ml, 111ml

答案: B

71. 清晨始升高，午后达高峰，凌晨跌低谷，是指

- A: 胰岛 B 细胞的分泌规律
- B: 胃酸的分泌规律
- C: 糖皮质激素的分泌规律
- D: 肝脏合成胆固醇的规律

答案: A

72. (2019 年真题) 患者，男，68 岁，既往体健，因受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天入院。查体：体温 39.1℃，血压 138/80mmHg，心率 102 次/分，呼吸 32 次/分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数 $11.2 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 X 线左肺下叶浸润性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

- A: 阿莫西林克拉维酸钾+阿奇霉素
- B: 左氧氟沙星+阿奇霉素
- C: 阿奇霉素
- D: 多西环素

答案：A

73. 对有过敏倾向和特异质以及有 ADR 家族史的患者，最重要的是

- A: 注意 ADR 症状，尤其是迟发反应
- B: 了解患者及家族的过敏史
- C: 注意定期监测器官功能
- D: 注意特殊人群用药

答案：B

74. 增加胃肠蠕动，影响同服药物吸收

- A: 西咪替丁+格列本脲
- B: 多潘立酮+维生素 C
- C: 青霉素+丙磺舒
- D: 四环素+硫酸亚铁

答案：B

75. 用药期间尿液可呈橘红色的抗结核药物是

- A: 链霉素
- B: 乙胺丁醇

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 利福平

D: 吡嗪酰胺

答案: C

76. 对预防用药错误的策略而言，个人观认为发生用药错误的原因主要是

- A: 环境缺陷
- B: 人员短缺
- C: 工作流程不规范
- D: 人的行为失常

答案：D

77. 可作为急性胰腺炎的症状指标是

- A: 血清淀粉酶降低？
- B: 磷酸激酶升高？
- C: 磷酸激酶降低？
- D: 血清淀粉酶升高？

答案：D

78. 消化性溃疡抗 Hp 的四联疗法正确的是

- A: 兰索拉唑+阿莫西林+克拉霉素+胶体次碳酸铋
- B: 雷尼替丁+阿莫西林+胶体次碳酸铋+甲硝唑
- C: 西咪替丁+胶体次碳酸铋+哌仑西平+替硝唑
- D: 奥美拉唑+甲硝唑+阿奇霉素+胶体次碳酸铋

答案：A

79. 患者，男，34 岁，有吸毒史。因过量使用阿片类药物而致昏迷，送入急诊抢救，表现为针尖样瞳孔、呼吸抑制。可选用的解救药物是

- A: 维生素 K
- B: 纳洛酮
- C: 亚甲蓝

D: 二巯丙醇

答案: B

80. 解救有机磷中毒的是

A: 亚硝酸异戊酯

B: 盐酸戊乙奎醚

C: 二巯丁二钠

D: 单价抗毒血清

答案: B

81. 主要用于抗真菌的药物是

A: 阿糖腺苷

B: 阿糖胞苷

C: 氟尿嘧啶

D: 氟胞嘧啶

答案: D

82. (2020 年真题) 患者, 男, 66 岁, 2 型糖尿病, 长期口服二甲双胍, 格列美脲, 近日查空腹血糖 12.3mmol/L, 糖化血红蛋白 9.0%, 主诊医师加用“甘精胰岛素每日 1 次+门冬胰岛素每日 3 次”, 关于该患者药物治疗方案的说法, 正确的是 ()

A: 甘精胰岛素应避免与二甲双胍联合使用

B: 因采用一日多次胰岛素治疗, 格列美脲应停用

C: 患者为 2 型糖尿病, 加用胰岛素一日 4 次方案不适宜

D: 门冬胰岛素应在三餐前 30 分钟皮下注射

答案: B

83. 下列哪种药物是 WHO 规定的第一阶梯镇痛药物

A: 阿司匹林

B: 可待因

C: 吗啡

D: 芬太尼

答案：A

84. 下列药物中，可影响性功能的药物为

A: 西咪替丁

B: 泮托拉唑

C: 雷尼替丁

D: 法莫替丁

答案：A

85. 以下可提示“高度黄疸，完全梗阻性黄疸”的总胆红素检查结果是

A: $>342 \mu\text{mol/L}$

B: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$

C: $<85.5 \mu\text{mol/L}$

D: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

答案：A

86. 其含量用生育酚当量(RE)表示的是

A: 维生素 E

B: 维生素 B

C: 维生素 D

D: 维生素 C

答案：A

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/885222340114012033>