

护师考试真题及答案

2015 年护师考试及答案

A1 型题：每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1、护士在临床工作中为患者测量脉搏，首选的动脉是

- A、股动脉
- B、桡动脉
- C、颈动脉
- D、肱动脉
- E、足背动脉

正确答案：B

答案解析：测量脉搏最常用的是桡动脉，其次有颞浅动脉、颈动脉、肱动脉、腘动脉、足背动脉、胫后动脉、股动脉等。

2、按照医院饮食的分类，基本饮食除外

- A、普通饮食
- B、软质饮食
- C、半流质饮食
- D、流质饮食
- E、试验饮食

正确答案：E

3、膀胱高度膨胀且又极度衰弱的患者，首次放尿不应超过

A、600ml

B、800ml

C、1000ml

D、1200ml

E、1500ml

精确答案：C

4、鼻饲插管中患者呈现呛咳、发绀，护士精确的处理是

A、嘱患者深呼吸，休息片刻后再继续插管

B、托起患者的头部插管

C、拔出胃管，休息片刻后重新插管

D、嘱患者做吞咽动作

E、用注射器抽吸胃液

正确答案：C

答案解析：插管过程中出现恶心、呕吐症状时，可暂停插入，嘱患者深呼吸；若出现呛咳、呼吸困难、发绀等现象时，表明插入气管，应该立即拔出，休息后重新插管。

5、不能促进局部组织血液循环，预防压疮的措施是

- A、按时用 50% 乙醇按摩受压处
- B、经经常使用温水擦澡，保持皮肤清洁
- C、为虚弱者在受压部位垫气圈
- D、定时翻身、拍背
- E、保持床单干燥、无褶

正确答案：C

6、不属于吸气性呼吸困难的情况是

- A、气管痉挛
- B、气管管腔狭窄
- C、气管异物
- D、喉癌
- E、支气管哮喘

正确答案：E

7、不宜使用热疗的情况是

- A、痛经
- B、肠胀气
- C、末梢循环不良
- D、踝关节扭伤初期
- E、昏迷

正确答案：D

答案解析：软组织损伤、扭伤早期应用冷疗法以减轻局部充血、出血和疼痛。8、长期卧床病人易导致压疮发生，压疮发生的原因应除外

- A、大量出汗
- B、肌肉软弱萎缩
- C、营养不良
- D、床上有碎屑
- E、皮肤弹性差

精确答案：B

9、长期仰卧位的患者最易发生压疮的部位是

- A、坐骨结节处
- B、骶尾部
- C、大转子处
- D、髌部
- E、耳郭

正确答案：B

答案解析：压疮的易发部位：①仰卧位好发枕骨隆凸处、肩胛、肘部、脊椎体隆凸处，骶尾部及足跟。②侧卧位好发耳郭、肩峰部、髌部、大转子、膝部及踝部的内外侧等。③俯卧

位好发肩峰、肋缘突出处、髂前上棘、膝前部、足趾部。④坐位好发坐骨结节等。其中临床最好发的部位是骶尾部。

10、传染病区护士完成隔离病人的操作后，对于隔离衣的悬挂正确的描述是 A、挂在更衣室，清洁面朝外

B、挂在治疗室，清洁面朝内

C、挂在病室，清洁面朝外

D、挂在走廊，清洁面朝外

E、挂在走廊，清洁面朝内

正确答案：D

答案剖析：使用过的断绝衣挂在半净化区，应清洁面朝外；挂在净化区，则应清洁面朝内(净化面朝外)。

11、大手术后患者开始进食，护士应赐与

A、基本饮食

B、软质饮食

C、流质饮食

D、半流质饮食

E、少渣饮食

正确答案：C

答案解析：高热患者和大手术后的患者应给予流质饮食，食物呈液体状，如奶类、米汤等。因所含热量及营养素不足，

只能短期使用。每 2~3 小时供食 1 次，每次 200~300ml；流质饮食还适用于口腔疾患、急性消化道疾患、危重或全身衰竭等患者。

12、大手术后患者宜采用的饮食是

- A、高卵白、高维生素
- B、高热量、低蛋白
- C、低脂肪、低蛋白
- D、高热量、低脂肪
- E、高脂肪、高卵白

正确答案：A

答案解析：大手术后的患者宜采用高蛋白、高维生素饮食。

13、对伤口湿热敷，最需要注意的问题是

- A、防止弄湿床单
- B、敷布每 3~5 分钟更换 1 次
- C、水温为 50~60℃
- D、严格举行无菌操作
- E、热敷时间为 15~20 分钟

精确答案：D

答案解析：湿热敷用于消炎、消肿、解痉和镇痛。水温为 50~60℃；局部及周边涂凡士林，盖单层纱布；敷布每 3~5

分钟更换 1 次，热敷时间 15～20 分钟；观察皮肤颜色，防止烫伤；开放性伤口应按无菌原则操作。

14、房室传导阻滞时，脉搏常为

A、间歇脉

B、缓脉

C、交替脉

D、短绌脉

E、速脉

精确答案：B

答案剖析：房室传导阻滞时可表现为缓脉。缓脉还可见于颅内压增高、甲状腺功用消退等患者。

15、肝硬化腹水患者宜采用的饮食是

A、低盐饮食

B、低脂肪饮食

C、低纤维素饮食

D、高卵白饮食

E、高维生素饮食

正确答案：A

答案剖析：肝软化腹水灾者应赐与低盐饮食，以免加重腹水。

16、高热是指口腔温度在

A、 $\sim^{\circ}\text{C}$

B、 $\sim^{\circ}\text{C}$

C、 37°C 以上

D、 $\sim^{\circ}\text{C}$

E、 41°C 以上

正确答案：D

答案解析：发热(以口腔温度为标准)：低热， $\sim^{\circ}\text{C}$ ；中度热， $\sim^{\circ}\text{C}$ ；高热， $\sim^{\circ}\text{C}$ ；超高热， $^{\circ}\text{C}$ 以上。

17、关于隔离病区护士的行为，下列正确的是

A、掀页撕取避污纸

B、口罩用后污染面向外折叠放入口袋内

C、身着隔离衣进入护士站

D、为患者注射后立即用手整理口罩

E、护理结核患者后立即更换口罩

精确答案：E

答案解析：口罩的使用：罩住口鼻，污染手不可接触。始终保持口罩的清洁干燥。口罩使用后，及时取下并将污染面向内折叠，放入胸前小袋内或小塑料袋内。口罩不能挂在胸前，手不可接触口罩的污染面。若接触严密隔离的病人应每次更换。

治疗室属清洁区，穿隔离衣后不得进入；避污纸使用时用抓取法。

18、关于部分构造炎症后期应用热疗的目的，精确的是

- A、促进浅表炎症局限
- B、促进炎性排泄物吸收消散
- C、使局部血管收缩，使炎症局限
- D、传导发散体内的热量
- E、提高痛觉神经的兴奋性

正确答案：A

答案剖析：热疗法使部分血管扩张，改善血液轮回，加强新陈代谢和白细胞的吞噬功用。炎症初期用热疗法可促进炎性排泄物吸收消散：炎症后期用热疗法，可促进白细胞释放卵白消融酶，消融坏死构造，使炎症范围。

19、关于饮食宜忌的叙述，不精确的是

- A、肝病患者应控制糖分的摄入
- B、脾胃病患者宜食易消化食物
- C、水肿患者宜食低盐、高蛋白饮食
- D、骨折患者应高卵白、高维生素饮食
- E、前列腺增生患者应忌辛辣刺激食物

正确答案：A

- A、促使呼吸道或肺泡的痰液松动，有益咳出
- B、叩击时宜使用单层薄布保护胸廓部位
- C、护士站在患者背侧
- D、叩击力度应轻柔
- E、包管足够的水分摄取，以便稀释痰液

正确答案：D

21、冠心病患者宜采用的饮食是

- A、高热量饮食
- B、低盐饮食
- C、低胆固醇饮食
- D、高盐饮食
- E、低卵白饮食

精确答案：C

答案剖析：高脂血症是冠心病的重要危险因素，如果不加限制地食高脂肪食物，可引起血清脂质升高，可以促使动脉粥样软化的形成。

22、呼吸呈深大、稍快特征的是

- A、呼吸急促
- B、潮式呼吸

D、XXX 呼吸

E、XXX 呼吸

正确答案：D

23、护理职员在临床事情中熏染血源性流行症，最常见的原因是

A、针刺伤

B、侵袭性操作

C、接触传染病病人的体液

D、为流行症病人的净化伤口换药

E、给传染病病人擦浴

正确答案：A

24、护士对断绝衣使用要求的掌握，精确的是

A、每周更换 1 次

B、要保持袖口内、外面清洁

C、必需完全盖住事情服

D、隔离衣受潮后应晾干再使用

E、断绝衣应外面面向外挂在走廊内

正确答案：C

袖口外面属于净化面；使用过的断绝衣应清洁面朝外，挂在半净化区。

25、护士为患者准备坐浴药物时，不慎将高锰酸钾溶液沾到工作服上，欲去除此污渍宜用的溶液是

- A、乙醇
- B、盐酸
- C、过氧化氢
- D、维生素 C 溶液
- E、氢氧化钠

精确答案：D

答案剖析：维生素 C 具有很强的抗氧化性。当维生素 C 溶液与高锰酸钾接触后，便可发生氧化还原反应，维生素 C 还原高锰酸钾，使其消融褪色。

26、护士为住院患者测量血压，其操作不精确的是

- A、测量前嘱患者休息 20~30 分钟
- B、血压计零点、肱动脉平第 3 肋间
- C、袖带平整缠于患者上臂
- D、袖带下缘距肘窝 2~3cm
- E、以每秒 4mmHg 速度放气

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/885303301114011102>