

2024 年海南省崖州区《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库大全带答案（预热题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2016 年真题）可抑制细菌 β -内酰胺酶的是

- A: 替考拉宁
- B: 舒巴坦
- C: 磷霉素
- D: 利福平

答案：B

2. 与 DNA 结合，进而抑制 DNA 和 RNA 合成

- A: 高三尖杉酯碱
- B: 氟尿嘧啶
- C: 顺铂
- D: 紫杉醇

答案：C

3. 患者，男，57 岁，身高 175cm，体重 87kg，诊断为 2 型糖尿病。医生给予二甲双胍片口服，500mg，bid。

- A: 餐后半小时
- B: 餐前即刻或餐时
- C: 餐前半小时
- D: 餐后 1 小时

答案：B

4. 基因重组产品，与天然内源性红细胞生成素作用相似的是()

- A: 链激酶
- B: 叶酸
- C: 尿激酶
- D: 重组人促红素

答案：D

5. 主要用于糖尿病，特别是 1 型糖尿病的治疗的药物是()

- A: 二甲双胍
- B: 磺酰脲类
- C: 胰岛素
- D: A 和 B 均无效

答案：C

6. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、茶碱治疗。

- A: 茶碱血药浓度
- B: 胸部 CT
- C: 血常规
- D: 腹部 B 超

答案：A

7. 属于血小板膜蛋白 IIb/IIIa 受体阻断剂的是

- A: 氯吡格雷
- B: 奥扎格雷
- C: 阿司匹林
- D: 替罗非班

答案：D

8. 对铜绿假单胞菌有较强作用的药物是

- A: 氯唑西林
- B: 阿莫西林
- C: 美西林
- D: 哌拉西林

答案：D

9. 内分泌平衡障碍及精神神经失调所致的失眠

- A: 氯美扎酮
- B: 氟西洋
- C: 夸西洋
- D: 谷维素

答案：D

10. 纠正细胞内缺钾的是

- A: 磺酰脲类
- B: 胰岛素
- C: A 和 B 均无效
- D: 二甲双胍

答案：B

11. 可特异性拮抗肝素抗凝作用的是

- A: 酚磺乙胺
- B: 甲萘氢醌
- C: 氨甲环酸
- D: 鱼精蛋白

答案：D

12. 抑制胃酸分泌作用最强的药物是

- A: 尼扎替丁
- B: 雷尼替丁
- C: 奥美拉唑
- D: 西咪替丁

答案：C

13. (2017 年真题) 属于抗雄性激素的肿瘤药是 ()

- A: 阿那曲唑
- B: 他莫昔芬
- C: 氟他胺
- D: 炔雌醇

答案：C

14. 呋喃妥因主要用于

- A: 消化道感染
- B: 全身感染
- C: 尿路感染
- D: 呼吸道感染

答案：C

15. 卡替洛尔的副作用不包括

- A: 可产生暗黑感
- B: 近视化倾向
- C: 结膜充血
- D: 眼底黄斑部水肿

答案：C

16. 以下哪种心律失常禁用强心苷

A: 心房扑动

B: 心房颤动

C: 室上性心动过速

D: 室性心动过速

答案：D

17. （2015 年真题）治疗侵袭性念珠菌病首选（）。

A: 伏立康唑

B: 氟康唑

C: 氟胞嘧啶

D: 灰黄霉素

答案：B

18. 治疗难辨梭状芽孢杆菌引起的假膜性肠炎，宜选择的药物是

A: 阿奇霉素

B: 万古霉素

C: 利奈唑胺

D: 米诺环素

答案：B

19. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡(A1 期)伴出血。13C 呼气试验：Hp(+)。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次/日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次/日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次/日；注射用蛇毒血凝酶 1U，静脉滴注，1 次/日；替米沙坦 40mg，15 服，1 次/日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次/日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次/日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次/日。

- A: 克拉霉素
- B: 胶体果胶铋胶囊
- C: 埃索美拉唑钠
- D: 阿莫西林

答案：B

20. 属于多烯类的是

- A: 特比萘芬
- B: 制霉菌素
- C: 氟胞嘧啶
- D: 卡泊芬净

答案：B

21. (2019 年真题) 用于治疗水肿性疾病，当起始治疗剂量未达到满意的治疗效果时，可追加剂量，每日最大剂量可达 600mg，但一般应控制在 100mg 以内的利尿剂是 ()

- A: 呋塞米
- B: 托拉塞米
- C: 布美他尼

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 依他尼酸

答案：A

22. 多数 ACEI 的起效时间在 1 小时，作用时间可以维持

A: 12 小时

B: 24 小时

C: 6 小时

D: 36 小时

答案：B

23. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润行导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1/18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列关于多柔比星的说法中错误的是()

A: 曾用过表柔比星的患者可更换多柔比星

B: 对增殖和非增殖细胞均有杀伤作用

C: 属于蒽环类抗肿瘤药物

D: 典型不良反应为骨髓抑制和心脏毒性

答案：A

24. 仅在体内有抗凝血作用的药物是

A: 华法林

B: 尿激酶

C: 噻氯匹定

D: 肝素

答案：A

25. 属于抗流感病毒药的是

A: 阿昔洛韦

B: 恩替卡韦

C: 司他夫定

D: 奥司他韦

答案：D

26. 可用于治疗重度痤疮，但妊娠期妇女避免使用的药物是

- A: 异维 A 酸
- B: 克拉霉素
- C: 特比萘芬
- D: 克罗米通

答案：A

27. （2019 年真题） β -内酰胺酶抑制剂的抑酶活性由强到弱的顺序是（）

- A: 舒巴坦>克拉维酸>他唑巴坦
- B: 他唑巴坦>舒巴坦>克拉维酸
- C: 舒巴坦>他唑巴坦>克拉维酸
- D: 他唑巴坦>克拉维酸>舒巴坦

答案：D

28. 亚胺培南西司他丁一般不宜用于

- A: 社区获得性感染
- B: 对其他药物耐药的革兰阴性杆菌感染
- C: 严重需氧菌与厌氧菌混合性感染
- D: 病原菌未查明严重感染

答案：A

29. （2015 年真题）我国研制的没有“金鸡纳”反应的抗疟药是（）。

- A: 奎宁
- B: 氯喹
- C: 青蒿素
- D: 伯氯喹

答案：C

30. 根据糖皮质激素分泌的昼夜节律，慢性病治疗如何给药对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制较轻

- A: 中午 12 时左右
- B: 上午 8 时左右
- C: 下午 4 时左右
- D: 晚餐前

答案：B

31. 患者，男，45 岁。初始诊断肾病综合征合并严重肝功能不宜选用的糖皮质激素是

- A: 可的松
- B: 泼尼松龙
- C: 氟替卡松
- D: 泼尼松

答案：B

32. 连续应用易产生耐受性的是

- A: 硝苯地平
- B: 硝酸甘油
- C: 地尔硫
- D: 普萘洛尔

答案：B

33. 磺胺类药物应用于新生儿会导致

- A: 腹部不适
- B: 静脉炎

C: 黄疸

D: 血小板减少

答案: C

34. 强心苷中毒所致的心室纤颤宜选用()

A: 地尔硫

B: 普罗帕酮

C: 利多卡因

D: 胺碘酮

答案: C

35. 关于地西泮的叙述，错误的是

A: 是一种长效镇静催眠药物

B: 在临床上可用于缓解炎症引起的反射性肌肉痉挛

C: 抗癫痫作用强，可用于治疗癫痫小发作

D: 抗焦虑作用时间长，是临床上常用的抗焦虑药之一

答案: C

36. 全身用药毒性大，仅局部用的抗病毒药是()

A: 阿昔洛韦

B: 阿糖腺苷

C: 碘苷

D: 金刚烷胺

答案: C

37. 维 A 酸类药物不能用于下述哪种疾病

A: 角化异常性皮肤病

B: 鱼鳞病

C: 光敏性皮肤病

D: 银屑病

答案: C

38. 氨曲南属于

A: 氨基糖苷类

B: 酰胺醇类

C: β -内酰胺类

D: 四环素类

答案: C

39. 具有阿片样作用，长期大量服用可产生欣快感，并可能出现药物依赖性的止泻药是()

A: 地芬诺酯

B: 洛哌丁胺

C: 蒙脱石散

D: 乳果糖

答案: A

40. 属于免疫调节型氨基酸注射液的是()

A: 复方氨基酸注射液(18AA)

B: 赖氨酸注射液

C: 丙氨酰谷氨酰胺注射液

D: 复方氨基酸注射液(20AA)

答案: C

41. 可与奎尼丁发生与 P 糖蛋白有关的相互作用的药物是()

A: 低分子肝素

B: 达比加群酯

C: 华法林

D: 肝素钠

答案：B

42. (2019 年真题) 患者，男，67 岁，为葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症患者，如果使用复方磺胺甲噁唑，可能引发的药源性疾病是 ()

A: 急性溶血性贫血

B: 肌肉震颤

C: 抗生素相关性腹泻

D: 红人综合征

答案：A

43. 治疗绝经后妇女的骨质疏松选用

A: 阿法骨化醇

B: 鲑降钙素

C: 奥利司他

D: 阿仑膦酸钠

答案：D

44. 关于双胍类药物的作用特点描述，错误的是

A: 促进组织摄取葡萄糖

B: 不会降低正常的血糖

C: 不与蛋白结合，不被代谢，尿中排出

D: 抑制胰高血糖素的分泌

答案：D

45. 属于延长动作电位时程类的广谱抗心律失常药物的是 ()

- A: 普罗帕酮
- B: 奎尼丁
- C: 普鲁卡因胺
- D: 胺碘酮

答案：D

46. 阿托品用于全麻前给药的目的是()

- A: 预防心动过缓
- B: 减少麻醉药的用量
- C: 增强麻醉效果
- D: 减少呼吸道腺体分泌

答案：D

47. 因抑制 P-糖蛋白使地高辛浓度增加 70%~100%的是

- A: 呋塞米
- B: 克拉霉素
- C: 硫酸镁
- D: 胺碘酮

答案：D

48. 监测他汀类药所致肌毒性的临床指标的是

- A: 肌酸激酶
- B: 乳酸脱氢酶
- C: 尿淀粉酶
- D: 碱性磷酸酶

答案：A

49. 大剂量使用维生素 K

- A: 肝素
- B: 双香豆素
- C: 维生素
- D: 氨基苯酸

答案：A

50. (2018 年真题) 可用于 1 岁以下婴幼儿急、慢性腹泻, 具有固定和清除多种病原体和毒素药物是 ()

- A: 番泻叶
- B: 洛哌丁胺
- C: 蒙脱石散
- D: 地芬诺酯

答案：C

51. 患者, 男, 19 岁, 既往有癫痫病史 2 年, 长期服用苯妥英钠控制良好。1 周前, 患者无明显诱因感胸骨后烧灼感, 无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体: 腹平软, 无压痛及反跳痛, 肝脾肋下未触及, 肠鸣音正常。胃镜检查提示: 胃食管反流病。医嘱: 西咪替丁胶囊, 400mg, 口服, 4 次/日。

- A: 停药后复发率高
- B: 具有抗雄激素样作用, 剂量过大可出现男性乳房女性化、女性泌乳等
- C: 餐前服用比餐后效果佳
- D: 餐后服用比餐前效果佳

答案：C

52. 与两性霉素 B 合用可减少复发率产生协同作用的药物是 ()

- A: 氟胞嘧啶

B: 灰黄霉素

C: 阿昔洛韦

D: 酮康唑

答案：A

53. 西地那非引起的不良反应有

A: 低血糖

B: 出血

C: 视觉异常

D: 嗜睡乏力

答案：C

54. 选择性直接作用于 M 胆碱受体，引起缩瞳，眼压下降，并有调节痉挛等作用的是

A: 碳酸酐酶抑制剂

B: 前列腺素衍生物

C: α_2 受体激动剂

D: 拟胆碱药

答案：D

55. (2018 年真题) 阿哌沙班属于 ()

A: 环氧酶抑制剂

B: 维生素 K 拮抗剂

C: 凝血因子 X 抑制剂

D: 直接凝血酶抑制剂

答案：C

56. 下列药物中属于缩瞳药的是

- A: 托吡卡胺
- B: 硫酸阿托品
- C: 毛果芸香碱
- D: 氢溴酸后马托品

答案：C

57. 抗高血压药对预防脑卒中的强度依次为()

- A: ACEI>钙通道阻滞药(CCB)> β 受体阻断药>利尿药>ARB
- B: ACEI>钙通道阻滞药(CCB)>ARB>利尿药> β 受体阻断药
- C: 钙通道阻滞药(CCB)>利尿药>ACEI>ARB> β 受体阻断药
- D: 钙通道阻滞药(CCB)>ACEI>利尿药> β 受体阻断药>ARB

答案：C

58. 通过降低血管平滑肌内钠离子浓度，使细胞内钙离子减少的是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 卡托普利
- C: 拉贝洛尔
- D: 肼屈嗪

答案：A

59. 对急性心肌梗死引起的室性心律失常有效，对室上性心律失常基本无效的药物是()

- A: 利多卡因
- B: 苯妥英钠
- C: 胺碘酮
- D: 地高辛

答案：A

60. (2018 年真题) 镇痛药的合理用药原则, 不包括 ()

- A: 尽可能选口服给药
- B: “按时”给药, 而不是“按需”给药
- C: 用药剂量个体化, 根据患者需要由小剂量开始逐渐加大剂量
- D: 按阶梯给药, 对于轻度疼痛者首选弱阿片类药物

答案: D

61. 夫西地酸最常见的不良反应是

- A: 腹部不适
- B: 血小板减少
- C: 黄疸
- D: 静脉炎

答案: D

62. 通过阻断血管紧张素 II 受体而逆转心肌肥厚, 减轻心力衰竭的药物是

- A: 美托洛尔
- B: 地高辛
- C: 氯沙坦
- D: 氨力农

答案: C

63. 患者女, 孕 8 周, 诊断为“甲状腺功能减退症”给予左甲状腺素钠片治疗对该患者的用药指导, 错误的是 ()

- A: 应于早餐后将一日剂量左甲状腺素钠片一次性用温水送服
- B: 左甲状腺素钠极少通过胎盘治疗剂量下对胎儿无不良影响
- C: 服用左甲状腺素钠片期间如出现心悸、多汗或体重下降, 应及时就诊

D: 孕期甲减可能对胎儿造成不良影响,服药期间应监测甲功

答案: A

64. 常引起体位性低血压的是

A: 非那雄胺

B: 普适泰

C: 十一酸睾酮

D: 哌唑嗪

答案: D

65. 神经垂体功能不足引起的中枢性尿崩症具有良好抑制作用的药物是

A: 醋酸去氨加压素

B: 促肾上腺皮质激素

C: 促性腺激素

D: 催乳素

答案: A

66. 患者,男,52岁,BMI28kg/m²,既往有动脉粥样硬化性心血管病、高尿酸血症、痛风病,患者诉昨晚8点起右大脚趾关节处疼痛难忍宜使用的药物是

A: 别嘌醇

B: 非布司他

C: 碳酸氢钠

D: 秋水仙碱

答案: D

67. (2020 年真题) 患者，女，26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺素(FT3、FT4)增高、促甲状腺素(TSH)降低，诊断为甲状腺功能亢进症。医师处方给予抗甲状腺药治疗。

- A: 碘化钾
- B: 特布他林
- C: 普萘洛尔
- D: 利多卡因

答案：C

68. 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：二甲双胍片口服 500mg，bid；阿卡波糖片口服 50mg，tid。

- A: 餐前 2 小时
- B: 餐前 1 分钟
- C: 餐后半小时
- D: 餐后 1 小时

答案：B

69. 广泛用于各种吸虫药的治疗，还能用于绦虫病的药物是

- A: 甲硝唑
- B: 乙胺嘧啶
- C: 三苯双脒
- D: 吡喹酮

答案：D

70. (2020 年真题) 哮喘急性发作首选的药物是

- A: 沙丁胺醇气雾剂
- B: 孟鲁司特片

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 羧甲司坦口服液

D: 布地奈德福莫特罗吸入剂

答案：A

71. 应用华法林时，为掌握好剂量，应测定

- A: 凝血酶原时间
- B: 凝血时间
- C: 部分凝血活酶时间
- D: 出血时间

答案：A

72. 达那唑的适应证不包括

- A: 纤维性乳腺炎
- B: 白细胞减少症
- C: 男性乳房发育
- D: 子宫内膜异位症

答案：B

73. 是碘与表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮经反应生成的复合物。含有效碘 9%~12%。从载体中释出碘，可直接卤化菌体蛋白质，与细菌蛋白质的氨基酸结合，破坏菌体的蛋白质和酶，使微生物代谢功能发生障碍而死亡的广谱强效杀菌药是

- A: 氯己定
- B: 聚维酮碘
- C: 依沙吖啶
- D: 过氧乙酸

答案：B

74. 关于维 A 酸软膏治疗痤疮的说法，错误的是

- A: 为了加强疗效，可以一日多次给药

B: 有明确的致畸性，妊娠期妇女禁用

C: 使用初期可能出现皮肤干燥或脱屑，对紫外光敏感性增强，宜在睡前使用

D: 不宜用于皮肤皱褶部位

答案：A

75. 氨基糖苷类

A: 禁用于早产儿、新生儿

B: 禁用于 8 岁以下儿童

C: 禁用于胆道阻塞患者

D: 禁用于 18 岁以下儿童及青少年

答案：B

76. 具有缩小皮脂腺，抑制皮脂腺活性，减少皮脂分泌的药物()

A: 维 A 酸

B: 阿达帕林

C: 异维 A 酸

D: 壬二酸

答案：C

77. 属于棘白菌素类的是

A: 特比萘芬

B: 氟胞嘧啶

C: 制霉菌素

D: 卡泊芬净

答案：D

78. 不易引起严重乳酸血症的双胍类药物是

- A: 二甲双胍
- B: 苯乙双胍
- C: 阿卡波糖
- D: 甲苯磺丁脲

答案：A

79. 阿糖胞苷属于

- A: 胸苷酸合成酶抑制剂
- B: 二氢叶酸还原酶抑制剂
- C: 核苷酸还原酶抑制剂
- D: DNA 多聚酶抑制剂

答案：D

80. 治疗儿童癫痫，对认知功能和行为影响较小的药物是（）

- A: 乙酰胺
- B: 卡马西平
- C: 苯巴比妥
- D: 丙戊酸钠

答案：B

81. 下列药物中不属于降压药的是（）

- A: 利血平
- B: 阿利克仑
- C: 肼屈嗪
- D: 左旋多巴

答案：D

82. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1 期）伴出血。

- A: 胶体果胶铋胶囊
- B: 克拉霉素
- C: 硝苯地平缓释片
- D: 埃索美拉唑

答案：D

83. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽、咳痰伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”，入院后使用莫西沙星和氨溴索治疗。

- A: 对非典型病原体无效
- B: 对链球菌感染疗效较好
- C: 属于氟喹诺酮类
- D: 对厌氧菌有效

答案：A

84. （2016 年真题）属于促胰岛素分泌剂的是

- A: 二甲双胍
- B: 阿卡波糖
- C: 艾塞那肽
- D: 那格列奈

答案：D

85. 注射液含苯甲醇，新生儿和早产儿禁用的药物是

- A: 雷尼替丁

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 甘草酸二铵

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/886042004100011030>