北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科测试题》模拟练习卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：形成急性血源性骨髓炎大块死骨的原因主要为（　）。A.骨膜血管断裂
B.骨的滋养血管栓塞
C.脓肿直接破坏骨组织
D.病理骨折
E.机体抵抗力差

2、单项选择题：下述哪一项不是小腿筋膜间室（　）。A.胫前间隙
B.胫后浅间隙
C.胫后深间隙
D.胫外侧间隙
E.胫内侧间隙

3、单项选择题：股骨闭合性骨折后，体温可能出现的情况（　）。A.上午正常，下午高热
B.通常不超过 38℃
C.时高时低不规则
D.常在 38.5℃以上
E.一般低于正常

4、单项选择题：有关肱骨外上髁炎，下列哪项不对（　）。A.持物无力，拧毛巾痛
B.肱骨外上髁处局限性压痛
C.X 线片正常
D.Mills 试验（+）
E.Hoffmann 征（+）

5、单项选择题：3 个月女孩，两下肢等长，双侧皮纹不对称，Ortolani 试验阳性，如确诊为发育性髋关节脱位，首选的治疗方法为（　）。A.Pavlik 支具
B.髋外层位尿布法
C.改良式蛙式石膏
D.Von-Rosen 铝板
E.观察待股骨头骨骺出现后再处理

6、单项选择题：有关急性腰扭伤，下列哪项是错误（　）。A.主要症状是腰痛，活动受限
B.局封常有效
C.常伴坐骨神经痛
D.卧硬板床休息有效

E.制动及解痉镇痛药物治疗

7、单项选择题：手外伤清创时处理方法不正确的是（　）。A.争取在 6～8 小时内进行

B.骨折与脱位均尽可能当时予以复位固定

C.对未失活的皮肤尽量充分保留

D.不用止血带

E.注意保护重要的神经和血管

8、单项选择题：青年男性病人，腰痛、僵硬，逐渐出现驼背，X 线片见骶髂关节模糊，间隙消失，可能诊断是（　）。A.慢性腰扭伤

B.腰肌劳损

C.腰椎结核

D.腰椎间盘突出症

E.强直性脊柱炎

9、单项选择题：一患者因车祸致伤，查骨盆挤压分离试验（+），下腹部压痛，腹肌紧张。为排除腹内脏器损伤，下列哪项检查简单可靠（　）。A.血象检查

B.X 线摄片

C.腹腔穿刺

D.B 超

E.CT

10、单项选择题：拇指掌面基底部疼痛及弹响声 1 年，检查该部可触及一小结节，有压痛，伸屈拇指时可感到弹响发生于结节处，最可能诊断是（　）。A.滑囊炎

B.腱鞘囊肿

C.狭窄性腱鞘炎

D.神经瘤

E.皮样囊肿

11、单项选择题：脊髓灰质炎后，有关软组织挛缩畸形的矫正术，正确的是（　）。A.需待骨骼发育完全后方可实行

B.可不拘年龄，争取尽早施行

C.只能单独施行

D.大多在 14～20 岁施行

E.必须在成年后方能施行

12、单项选择题：骨盆截骨术截骨平面在（　）。A.髂前上棘部位

B.髂前下棘部位

C.髂前下棘下方

D.髂前上棘和髂前下棘之间

E.髋臼上缘

13、单项选择题：良性骨肿瘤的 X 线表现为（　）。A.边缘清楚

B.出现葱皮现象

C.骨膜反应明显

D.空腔形成

E.多处呈 I　　B.支具矫形

C.胸锁乳突肌全切除

D.物理疗法

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/886054020021010123