
护 士 肾 内 题

一、单选题 A1 型

(每题只有一个正确答案)

- 1、肾盂肾炎患者住院后，护士嘱其多饮水，目的是 (C)
A、增加血容量
B、降低体温
C、冲洗尿路
D、减少药物不良反应
E、增加食欲
- 2、原发性肾病综合征的主要病因是 (B)
A、遗传因素
B、免疫因素
C、物理因素
D、化学因素
E、营养因素
- 3、在原发性肾病综合征中，关于微小病变肾病的特点，叙述不正确的是 (C)
A、光镜下肾小球基本正常，可见近曲小管上皮严重脂肪变性
B、免疫荧光检查阴性
C、电镜下于系膜区及皮下可见电子致密物
D、镜下血尿发生率低，不出现肉眼血尿
E、对激素治疗敏感，并可自发缓解，但却易复发
- 4、术后一般应指导病人多饮水，其目的是： (D)
A、增加肾脏血液供应
B、防止低血压
C、补充血容量
D、增加尿量
E、促进肾脏修复
- 5、关于动静脉内瘘的描述不正确的是 (C)
A、内瘘血管选择应遵循的原则为先上肢后下肢、先非惯用侧后惯用侧
B、建立动静脉内瘘前应进行血管的保护，并对血管进行充分评估
C、术前遵医嘱停用抗凝血药物
D、术后 24 小时内密切观察患者全身情况、手术局部情况及内瘘通畅情况
E、术后伤口敷料不宜覆盖过多，包扎不宜过紧
- 6、下述哪项不属于肾病综合征尿检查结果 (D)
A、选择性或非选择性蛋白尿
B、尿蛋白(+++)或更多
C、不同程度血尿
D、尿糖(+++)或更多
E、尿纤维蛋白降解产物增多
- 7、单纯性肾病综合征严重水肿者的护理措施是 (C)
A、无需卧床休息
B、长期无盐饮食

-
- C、应尽量避免肌肉注射
D、高蛋白饮食
E、应用免疫抑制剂时应注意测量尿量和血压
- 8、糖皮质激素是治疗肾病综合征的主要用药，用药时应注意观察该药的不良反应。以下属于该药常见不良反应的是：（C）
A、肝功能受损
B、脱发
C、向心性肥胖
D、骨髓抑制
E、恶心、呕吐
- 9、慢性肾衰竭者行血液透析时，护理措施描述不正确的是：（D）
A、消除病人的恐惧心理以达到一个最佳的治疗状态
B、透析间期限制病人的入液量
C、透析间期病人体重变化不宜超过 2.5kg
D、每次透析均应肝素化预防凝血
E、严格无菌操作
- 10、肉眼血尿反复发作，最常见于（C）
A、急进性肾小球肾炎
B、过敏性紫癜肾炎
C、IgA 肾病
D、急性肾小球肾炎
E、狼疮性肾小球肾炎
- 11、引起肾炎性水肿的主要机制是（B）
A、全身毛细血管通透性增加
B、肾小球滤过率下降
C、大量蛋白尿导致低蛋白血症
D、抗利尿激素分泌过多
E、血压增高引起急性心衰
- 12、血尿是指尿离心沉淀后镜检每高倍视野有多少个红细胞（C）
A、1~2 个
B、2 个
C、3 个以上
D、5 个
E、10 个以上
- 13、患儿男，8 岁，急性肾小球肾炎入院，眼睑水肿，洗肉水样尿，疲乏无力，首要的护理措施是（A）
A、卧床休息
B、定期测体重
C、测血压
D、肾热敷保暖
E、限制蛋白质的摄入
- 14、与小儿急性肾小球肾炎有关的主要病原体是（E）
A、柯萨奇病毒 A
B、肺炎链球菌

-
- C、乙型肝炎病毒
D、金黄色葡萄球菌
E、A 组 β 溶血性链球菌
- 15、容易引起急性肾衰竭的外伤是（D）
A、挫伤
B、扭伤
C、贯通伤
D、挤压伤
E、切割伤
- 16、下列是单纯性肾病综合征临床表现的是（D）
A、血尿
B、高血压
C、非凹陷性水肿
D、凹陷性水肿
E、血清补体下降
- 17、关于急性肾炎的治疗下列不正确的是（C）
A、对症治疗
B、急性期 1~2 周内应卧床休息
C、必须马上使用青霉素治疗
D、注意防治合并症
E、禁止肾毒性药物的使用
- 18、下述哪项内容有助于区别肾盂肾炎和膀胱炎（D）
A、尿中有白细胞
B、尿频尿急
C、尿中有红细胞
D、尿中有白细胞管型
E、尿细菌学检查
- 19、慢性肾衰竭维持性透析治疗的指征是（ ）（D）
A、血肌酐 $> 350\mu\text{mol} / \text{L}$
B、血肌酐 $> 442\mu\text{mol} / \text{L}$
C、血肌酐 $> 530\mu\text{mol} / \text{L}$
D、血肌酐 $> 707\mu\text{mol} / \text{L}$
E、血肌酐 $> 884\mu\text{mol} / \text{L}$
- 20、下列关于持续不卧床腹膜透析技术的描述中不正确的是（B）
A、操作间应密闭性良好，门窗关闭
B、居家透析环境没有单独的操作间时应每日紫外线消毒 1 次
C、擦拭短管时不可以使用碘伏或乙醇等化学制剂
D、严格无菌操作
E、观察引流液颜色、性状和量
- 21、为减轻肾病综合征患者长期服用肾上腺皮质激素的不良反应，可采用下列哪项方法（E）
A、减少剂量
B、选用地塞米松
C、联合服用利尿剂
D、联合服用维生素 B6

-
- E、隔日顿服法
- 22、可能导致慢性肾衰竭的发病机制为（E）
- A、原发性肾脏疾病
- B、输入异型血
- C、贫血
- D、水、电解质和酸碱失衡
- E、健存肾单位学说
- 23、急性肾小球肾炎水肿期，选择何种饮食为宜（C）
- A、无盐、高糖、高蛋白
- B、低盐、高糖、高蛋白
- C、低盐、高糖、低蛋白
- D、无盐、高糖、低蛋白
- E、低盐、普通饭
- 24、急性肾盂肾炎抗感染的原则是（C）
- A、在尿液检查之前，首选青霉素
- B、首选激素治疗
- C、根据药敏试验结果可选用相关抗菌药
- D、用药至症状完全消失后停药
- E、轻者可用一种抗菌药物
- 25、下列关于动静脉内瘘使用的描述中不正确的是（C）
- A、每次使用前应认真评估内瘘的情况
- B、穿刺成功后应妥善固定穿刺针，避免脱出
- C、内瘘使用初期应使用 16G 穿刺针，血流量>250ml / min
- D、从远心端到近心端进行阶梯式或纽扣式穿刺，避免吻合口附近穿刺
- E、穿刺处如发生血肿，可压迫止血，并用冰袋冷敷，24 小时以后可热敷
- 26、尿毒症最常见的病因是（B）
- A、原发性高血压
- B、慢性肾小球肾炎
- C、慢性肾盂肾炎
- D、肾动脉硬化
- E、红斑狼疮性肾炎
- 27、急性肾炎的饮食原则为（A）
- A、低盐
- B、低盐低蛋白质
- C、高钙低磷
- D、高糖高钾
- E、限制蛋白质
- 28、急性肾盂肾炎的典型临床表现为（B）
- A、发热，膀胱刺激征，蛋白尿
- B、发热，膀胱刺激征，肾区叩痛，尿中白细胞增高
- C、发热，膀胱刺激征，水肿，尿中白细胞增高
- D、发热，膀胱刺激征，水肿，尿中白蛋白增高
- E、高血压，水肿，膀胱刺激征，尿中白细胞增高
- 29、慢性肾炎病人采用优质低蛋白饮食，较妥的时机是（A）

-
- A、尽早采用
 - B、水肿明显时
 - C、血压明显增高时
 - D、血肌酐增高时
 - E、尿毒症期

30、膀胱内充满尿液，其压力增高，迫使少量尿液自尿道口溢出，称为（D）

- A、真性尿失禁
- B、尿潴留
- C、尿痿
- D、充盈性尿失禁
- E、尿频

31、与急性肾小球肾炎发病有关的细菌（C）

- A、金黄色葡萄球菌
- B、大肠杆菌
- C、链球菌
- D、肺炎双球菌
- E、流感嗜血杆菌

32、多尿是指 24 小时的尿量超过（E）

- A、400ml
- B、1000ml
- C、1500ml
- D、2000ml
- E、2500ml

33、急性肾衰竭少尿期 3 日内患者的饮食要求是（D）

- A、高脂、高糖、高蛋白
- B、高蛋白、高糖、多维生素
- C、低蛋白、高脂、低维生素
- D、低蛋白、低糖、多维生素
- E、无蛋白、高糖、多维生素

34、肾病综合征在并发感染中，应特别注意哪种疾病的发生（C）

- A、肺炎
- B、胃肠炎
- C、原发性腹膜炎
- D、脑膜炎
- E、尿路感染

35、患者女，26 岁。因产后大出血而致急性肾衰竭。测得前一天尿量为 200ml，呕吐物 250ml。估计今天的补液量为（C）

- A、2500ml
- B、2000ml
- C、1000ml
- D、800ml
- E、500ml

36、肾病综合征最常见的并发症是（A）

- A、感染

B、急性肾衰竭

C、高血压

D、低血容量性休克

E、血栓形成

37、急性肾衰竭患者电解质失调，以下哪项危害最为严重（B）

A、低血钠

B、高血钾

C、低血钙

D、高血磷

E、高血镁

38、下列符合急性肾炎的描述是（A）

A、尿检查有大量红细胞

B、水肿明显呈凹陷性

C、血清补体正常

D、血胆固醇增高

E、血浆蛋白下降

39、患者男，30岁。近2个月来腰部有隐痛、钝痛。今天上午7时突然发作阵发性刀割样疼痛，患者辗转不安，呻吟呼痛，面色苍白，镜下血尿，应考虑为（A）

A、肾结石、肾绞痛

B、阑尾炎

C、肠扭转

D、胆囊炎

E、肾肿瘤

40、急性肾衰早期最常见的表现是（A）

A、少尿、尿相对密度低

B、水中毒、电解质紊乱

C、代谢性酸中毒、抽搐

D、血尿素氮升高

E、意识障碍、呼吸困难

41、急性肾衰竭少尿无尿早期主要死亡原因是（C）

A、低钙血症

B、低钠血症

C、高钾血症

D、低钾血症

E、高镁血症

42、急性肾衰竭少尿、无尿早期主要死亡原因是（C）

A、低钠血症

B、低钙血症

C、高钾血症

D、低钾血症

E、高镁血症

43、原发性肾病综合征最常见的并发症和引起死亡的原因是（D）

A、生长延迟

B、急性肾衰竭

-
- C、高凝状态及血栓形成
D、感染
E、电解质紊乱
- 44、肾病综合征最常用的细胞毒性药物是（B）
A、氮芥
B、环磷酰胺
C、硫唑嘌呤
D、苯丁酸氮芥
E、环孢素
- 45、肾活检穿刺后，导尿时尿道出口处最容易感染部位是距尿道出口（D）
A、0. 15cm 处
B、0. 25cm 处
C、0. 35cm 处
D、0. 5cm 处
E、0. 75cm 处
- 46、患儿，8 岁。因面部水肿、头痛、头晕就诊。尿液检查：蛋白(++)。红细胞 20 个 / HP，诊断为急性肾小球肾炎。对其处理应是（E）
A、给镇痛药
B、适当下床活动，防止血栓形成
C、给大剂量青霉素
D、低盐、高糖、高蛋白饮食
E、低盐、高糖、高维生素饮食
- 47、适用于肾衰竭病人的肠内营养制剂是（D）
A、大分子聚合物
B、自制匀浆膳
C、高支链氨基酸配方
D、必需氨基酸配方
E、组件配方
- 48、患者男，45 岁。蛋白尿 8 年，乏力、恶心 2 个月，平时血压偏高，贫血貌，血压 180 / 105mmHg，心肺听诊无异常，血肌酐 1042 μ mol / L，诊断为尿毒症。最有可能的原因是（B）
A、慢性肾盂肾炎
B、慢性肾小球肾炎
C、高血压肾小球动脉硬化
D、慢性间质性肾炎
E、急性肾小球肾炎
- 49、护理肾功能衰竭少尿期患者时，下列哪项措施是正确的（C）
A、大量补液
B、摄入含钾食物
C、禁用库存血
D、及时补充钾盐
E、加强蛋白质摄入
- 50、急性肾小球肾炎尿呈浓茶色，是由于（A）
A、酸性尿中红细胞破坏
B、尿相对密度增高

-
- C、尿酸盐结晶
D、饮水少
E、尿蛋白太高
- 51、下列哪项内容有助于区别肾盂肾炎和膀胱炎 (D)
A、尿频、尿急
B、尿中有白细胞
C、尿中有红细胞
D、尿中有白细胞管型
E、肉眼血尿
- 52、肾结核是 (B)
A、继发于肺结核，经淋巴进入肾脏
B、继发于肺结核，经血行进入肾脏
C、继发于肠结核，经血流进入膀胱
D、膀胱结核逆行感染
E、继发于骨结核，经血流进入膀胱
- 53、患者男，50 岁。经常发生肾绞痛、血尿，疑为肾结石，需做静脉肾盂造影，造影前准备不正确的是 (C)
A、常规肠道准备
B、当天禁止早餐
C、鼓励饮水
D、检查前排尿
E、需做碘过敏试验
- 54、肾结核的主要传播途径是 (B)
A、淋巴循环
B、血液循环
C、呼吸道传播
D、直接蔓延
E、肠道传播
- 55、急性肾小球肾炎患儿恢复正常活动的标准是 (D)
A、尿常规正常
B、血沉正常
C、血压正常
D、尿艾迪计数正常
E、抗链球菌溶血素效价正常
- 56、关于急性肾炎的临床表现，下列哪项是错误的 (C)
A、多数患者都有血尿
B、起病后第 1 周常有高血压
C、水肿为首发症状，常为上行性
D、起病 1~2 周内可发生严重循环充血
E、血压突然升高，合并高血压脑病
- 57、肾结核早期唯一严重的阳性表现是 (A)
A、尿常规有少量红细胞和脓细胞
B、大量血尿
C、肾区包块

-
- D、结核中毒症状
E、肾盂造影有破坏病灶
- 58、肾病综合征患儿高度水肿时护理应注意（D）
A、卧床休息，少搬动
B、每周测量体重 1 次
C、每日洗澡 1~2 次
D、给药时尽量避免肌肉注射
E、饮食无特别忌口
- 59、慢性肾功能衰竭后期患者，一旦出现下列哪种情况提示病情严重（A）
A、少尿、高血钾
B、中度贫血
C、乏力、食欲减退
D、水肿、低钠血症
E、呼气有尿臭味
- 60、肾性水肿早期常发生于（A）
A、眼睑与颜面
B、背部
C、骶部
D、尾骶部
E、下肢
- 61、慢性肾衰竭患者发生贫血的重要原因是（B）
A、脾功能亢进
B、红细胞生成素分泌减少
C、甲状旁腺功能亢进
D、毒素潴留
E、免疫功能降低
- 62、尿毒症最早出现的症状是（B）
A、心血管系统症状
B、胃肠道症状
C、血液系统症状
D、呼吸系统症状
E、神经精神和肌肉系统症状
- 63、可加重肾病综合征的因素是（A）
A、感染
B、焦虑
C、活动增多
D、暴饮暴食
E、蛋白质摄入不足
- 64、患儿，8 岁。因高度水肿，尿蛋白(++++)入院，诊断为肾病综合征，治疗首选的是（B）
A、青霉素
B、肾上腺皮质激素
C、环磷酰胺
D、白蛋白
E、利尿剂

-
- 65、下列关于血液灌流的注意事项不正确的是（D）
- A、灌流器应串联在透析器之前，垂直固定于支架上
 - B、巡视过程中注意观察灌流器内血色有无变暗，动静脉壶内有无凝血块
 - C、严格执行无菌操作，避免感染
 - D、治疗 3 小时灌流器将达到饱和，应及时撤下灌流器
 - E、血液灌流与血液透析联合应用时，抗凝血药用量较单纯血液透析时要大
- 66、病人，男，28 岁。诊断为慢性肾脏病(CKD5 期)，拟行血液透析治疗，现给予留置中心静脉导管后返回病房，护士应注意：（D）
- A、指导病人患侧卧位，防止出血
 - B、使用导管输液，观察是否通畅
 - C、告知病人避免洗头、洗澡，以防止导管淋湿
 - D、指导病人避免剧烈活动以免导管脱出
 - E、指导病人可适当按摩穿刺部位以减轻疼痛
- 67、下列各项中，判断肾小球功能损害最敏感的指标是（A）
- A、内生肌酐清除率
 - B、血尿素氮
 - C、血肌酐
 - D、血尿素
 - E、血尿酸
- 68、急性肾炎小儿可以上学的标准是（B）
- A、尿常规正常
 - B、血沉正常
 - C、血压正常
 - D、尿阿迪计数正常
 - E、抗链球菌溶血素“O”滴度正常
- 69、慢性肾炎病人卧床休息主要是为了（C）
- A、接触焦虑情绪
 - B、减轻心脏负荷
 - C、增加肾血流量
 - D、减少蛋白分解代谢
 - E、减轻膀胱刺激征
- 70、尿毒症患者，血肌酐明显增高，近一周来夜尿量增多，晨起时恶心、呕吐。为减轻晨间呕吐，最有效的护理措施是（E）
- A、加强晨间口腔护理
 - B、饮食少量多餐
 - C、避免刺激性食物
 - D、减少晚餐进食量
 - E、睡前饮水
- 71、肾病产生的血管活性激素有（A）
- A、肾素
 - B、降钙素
 - C、促红细胞生成素
 - D、皮质醇
 - E、 1α 羟化酶

72、病人，男，32 岁。诊断为肾病综合征，今日行肾活检组织检查术，术后推入病房，护士应采取的护理措施是：（B）

- A、为病人留置尿管
- B、指导其进食易消化流食或半流食
- C、密切监测病人心律
- D、嘱其 4 小时后可做适当腰部活动
- E、剧烈腰痛时给予镇痛药口服

73、对肾结核的诊断有决定性意义的检查是（E）

- A、便常规
- B、血生化检查
- C、CT 检查
- D、膀胱镜检查
- E、结核杆菌培养尿液沉渣检查

74、关于急性肾衰竭护理，下列不正确的是（D）

- A、尿量<400ml / d，提示肾衰竭可能
- B、少尿期饮食应取低蛋白
- C、避免使用含钾药物
- D、进入多尿期表示患者已脱离危险
- E、禁用对肾有毒性作用的药物

75、长时间的低血压、低灌注量、酸中毒和大量游离的血红蛋白极易导致（C）

- A、肝衰竭
- B、呼吸衰竭
- C、肾衰竭
- D、脑衰竭
- E、心力衰竭

76、慢性肾衰竭病人应采用的饮食原则（A）

- A、低盐、优质低蛋白饮食
- B、低盐、高糖饮食
- C、低盐、高蛋白饮食
- D、低盐、高钙饮食
- E、饮食清淡、易消化、富有营养

77、下列关于水肿的饮食调护，最重要的是（E）

- A、忌辛辣
- B、忌酒
- C、忌烟
- D、忌膏粱厚味
- E、忌盐

78、为预防急性肾功能衰竭，应从静脉输入碱性溶液以碱化尿液的外伤是（C）

- A、头皮撕脱伤
- B、肋骨骨折
- C、大腿挤压伤
- D、肾挫伤
- E、前臂裂伤

79、关于急性肾衰竭的护理，下列错误的是（D）

-
- A、尿量<400ml / d，提示肾衰竭可能
 - B、少尿期饮食应低蛋白饮食
 - C、避免使用含钾食物
 - D、进入多尿期表示患者已脱离危险
 - E、禁用对肾有毒性作用的药物

80、慢性肾炎肾病型在用氮芥治疗中应特别注意观察（D）

- A、出血性膀胱炎
- B、消化道症状
- C、肝功能损害
- D、白细胞减少
- E、脱发

81、患儿男，5岁。全身水肿，尿少6天，以“原发性肾病综合征”入院，护士进行健康评估时，最重要的评估内容是（C）

- A、饮食情况
- B、大便情况
- C、尿量情况
- D、睡眠情况
- E、水肿情况

82、尿毒症病人心血管系统最常见的表现是（ ）（A）

- A、高血压
- B、尿毒症性心肌病
- C、心力衰竭
- D、尿毒症性心包炎
- E、心律失常

83、慢性肾小球肾炎的疾病进展速度主要取决于：（D）

- A、年龄
- B、性别
- C、疾病严重程度
- D、病理类型
- E、是否接受合理治疗

84、病人，男，75岁。1周来有反复尿频、尿痛，且伴有夜尿增多。检查双肾区无叩痛，尿常规白细胞30 / HP，清洁中段尿培养为大肠埃希杆菌，该细菌造成尿路感染的常见途径为：（D）

- A、直接蔓延
- B、淋巴感染
- C、血行感染
- D、上行感染
- E、下行感染

85、下列泌尿系统疾病中，不出现管型尿的是（D）

- A、急性肾小球肾炎
- B、肾病综合征
- C、急性肾盂肾炎
- D、急性膀胱炎
- E、急性间质性肾炎

86、病人，女，72 岁。间断出现明显肉眼血尿，且下午体温升高，最高 37.5℃。既往健康，结核菌试验为阴性。医生建议行膀胱镜检查，术后出现明显的尿频、尿急等症状，尿细菌培养结果为铜绿假单胞菌。此时护士应指导病人：（A）

- A、鼓励其多饮水，每天饮水量>2000ml
- B、为减少氮质潴留，宜低优质蛋白饮食
- C、加强会阴护理，保持外阴清洁
- D、绝对卧床休息以减轻肾脏负担
- E、通知家属协助护理，采取保护性措施

87、急性肾炎患儿，在疾病早期要求绝对卧床休息，其目的主要是（ ）（A）

- A、预防并发症的发生
- B、维持血压正常
- C、减轻血尿
- D、减轻水肿
- E、增加尿量

88、肾小球肾病的主要临床特点是（C）

- A、肾功能减退
- B、出血性膀胱炎
- C、大量蛋白尿
- D、高血压
- E、尿中纤维蛋白降解产物增加

89、原发性肾病的分类包括（C）

- A、单纯性肾病、先天性肾病
- B、继发性肾病、先天性肾病
- C、单纯性肾病、肾炎性肾病
- D、急性肾病、先天性肾病
- E、继发性肾病、肾炎性肾病

90、尿毒症伴高血钾时，最有效的治疗方法是（D）

- A、输入小苏打
- B、输入钙剂
- C、输入高渗葡萄糖加胰岛素
- D、血液透析
- E、口服钠型阳离子交换树脂

91、活检前应告知病人关于肾活组织检查术的意义，以下描述不正确的是：（C）

- A、判断疾病的预后
- B、判断疾病的进展速度
- C、治疗疾病
- D、确定治疗方案
- E、指导治疗

92、下列有关内瘘术后的说法错误的是（D）

- A、适当抬高患肢，以利减轻水肿
- B、保持袖口宽松，避免受压
- C、术侧禁止测量血压
- D、可在术侧输液、抽血
- E、手术密切观察患者全身状况，手术局部情况及内瘘通畅情况

93、患儿男，7岁。面及眼睑水肿3天，尿少入院，入院前2周患扁桃体炎，T 37.5℃，呼吸80次/分，脉搏24次/分，神志清醒，面部水肿，咽略红，心肺(-)，尿常规：RBC(+++)，蛋白(++)，管型0，WBC 5个/HP。该患儿应考虑为(D)

- A、尿路感染
- B、单纯性肾病
- C、急性肾炎
- D、慢性肾炎
- E、肾炎性肾病

94、慢性肾功能衰竭患者，伴有厌食、恶心、口臭、皮肤瘙痒，以下护理计划内容哪项是正确的(C)

- A、给予低热量饮食
- B、每日口腔护理1次
- C、勤用温水擦洗皮肤
- D、保持病室光线充足
- E、晚间睡前不宜饮水

95、急性肾衰竭时最主要的护理措施是(A)

- A、记录24小时出入液量
- B、测体重
- C、测血压
- D、测体温
- E、尿常规检查

96、慢性肾衰竭病人常出现的首发的症状是：(C)

- A、胸闷、气短
- B、乏力
- C、恶心、呕吐
- D、四肢抽搐
- E、头晕、头痛

97、肾结核最常见的症状是(B)

- A、肾积水
- B、尿频
- C、肾区疼痛
- D、潮热、盗汗
- E、贫血

98、不符合肾病综合征患儿护理措施的是(E)

- A、严重水肿和高血压患者应卧床休息，勤翻身
- B、准确记录24小时液体出入量
- C、臀部垫上橡皮圈或棉圈
- D、每周洗澡1~2次

E、因静脉穿刺困难，可尽量用肌肉注射给药

99、泌尿系统疾病中，24小时尿蛋白定量>3.5g的疾病是(B)

- A、急性肾小球肾炎
- B、原发性肾病综合征
- C、急性肾盂肾炎
- D、急性膀胱炎

E、急性间质性肾炎

100、穿刺人工血管内瘘适宜的角度为（C）

A、15°

B、30°

C、45°

D、60°

E、任意角度

101、肾脏维持水平衡功能的实现，主要依靠的调节活动是（C）

A、肾小球滤过量

B、近端肾小管与髓袢的重吸收水量

C、远端肾小管与集合管的重吸收水量

D、近端肾小管与远端肾小管的重吸收水量

E、肾小管的分泌功能

102、患者女，30岁。发现血压高3年，发热伴咽喉痛3天，肉眼血尿1天，体检：血压20 / 14kPa(150 / 105mmHg)，咽稍红，扁桃体肿大，双下肢无水肿，查尿蛋白(+++)，红细胞满视野，尿比重1.027，无高血压家族史。最可能的诊断是（D）

A、急性肾小球肾炎

B、急进性肾小球肾炎

C、肾病综合征

D、慢性肾小球肾炎

E、隐匿性肾小球肾炎

103、下列关于透析导管的描述不正确的是（A）

A、颈内静脉置管术后不需进行X线胸片检查

B、消毒导管时要严格遵守无菌原则，避免感染

C、上机前检查导管腔内有无凝血块，并用10ml生理盐水脉冲式冲管

D、封管时根据患者的情况遵医嘱选择相应的封管液

E、透析间隔较长的患者，护士应定期为患者重新封管

104、急性肾盂肾炎正确的治疗措施是（C）

A、口服环丙沙星3天

B、口服复方磺胺甲基异噁唑7天

C、根据细菌药物敏感试验选用有效的抗生素治疗2周

D、联合应用2种以上抗生素进行治疗

E、应用中药治疗

105、慢性肾功能衰竭患者出现抽搐，护理措施是（B）

A、纠正电解质紊乱

B、纠正酸碱失衡及低钙

C、使用镇静剂

D、使用抗生素

E、使用镁制剂

106、下列关于更换腹膜透析外接短管的注意事项不正确的是（A）

A、外接短管至少每年更换一次

B、若外接短管及导管有污物，可用棉签蘸取生理盐水进行擦拭

C、碘伏浸泡后必须将短管及直管擦干净，避免碘伏残留

-
- D、止血钳做到一人一用
 - E、注意同时观察直管及外出口皮肤情况

107、单纯性肾病综合征与肾炎性肾病综合征的区别点是（E）

- A、尿蛋白量多少
- B、血浆蛋白高低
- C、水肿程度
- D、血沉是否增快
- E、有无高血压、血尿

108、尿毒症伴高血钾时，最有效的治疗方法是（D）

- A、输入钙剂
- B、输入小苏打水
- C、输入高渗葡萄糖加胰岛素
- D、血液透析
- E、口服钠型阳离子交换树脂

109、患者女，27岁。有反复发作尿频、尿急、尿痛史，肾区叩击痛(+)。下列指导对其不适合的是（E）

- A、多饮水
- B、保持排便通畅
- C、保持外阴清洁
- D、禁用盆浴
- E、经常预防性使用抗菌药物

110、病人，男，38岁。以“慢性肾小球肾炎”为诊断收入院。现病人有明显双眼睑水肿，尿蛋白(+++)，血压 170 / 95mmHg。护士对其进行饮食指导正确的是：（D）

- A、清淡饮食，每日钠盐摄入量为 6g
- B、减少蛋白质的摄入
- C、增加脂肪的摄入，以保证热量充足
- D、每日入液量应根据 24 小时尿量来定
- E、尽量多吃蔬菜及水果

111、肾病综合征的临床表现不包括（D）

- A、高度水肿
- B、高脂血症
- C、大量蛋白尿
- D、高血压
- E、低蛋白血症

112、患者男，22岁。无明显诱因出现双下肢水肿 2 周，尿蛋白(++++)、测血压 142 / 86mmHg，导致其水肿最主要的因素是（A）

- A、肾小球滤过率下降
- B、血浆胶体渗透压下降
- C、继发性醛固酮增多
- D、抗利尿激素增多
- E、有效滤过压降低

113、红斑狼疮患者治疗首选药物是（A）

- A、泼尼松
- B、阿司匹林

-
- C、氯喹
 - D、硫唑嘌呤
 - E、环磷酰胺

114、病人，女，38岁。急性肾衰竭后出现水肿。下列护理措施不正确的是：（A）

- A、多饮水
- B、限制钠盐摄入
- C、记录24小时出入液量
- D、保护受压皮肤
- E、安慰病人，使其保持情绪平稳

115、肾病综合征病人住院后，应严格观察有无并发症的发生，其中不包括：（A）

- A、电解质紊乱
- B、感染
- C、血栓
- D、营养不良
- E、急性肾损伤

116、下列疾病引起梗阻时发生肾积水最快的是（C）

- A、尿道结石
- B、包茎
- C、输尿管结石
- D、前列腺增生症
- E、尿道狭窄

117、肾病综合征的患儿突发腰痛、血尿、少尿，可能的原因是（A）

- A、肾静脉血栓
- B、急性肾衰竭
- C、血压增高
- D、感染加重
- E、肾衰竭

118、肾小球肾病的主要临床特点是（C）

- A、出血性膀胱炎
- B、肾功能减退
- C、大量蛋白尿
- D、高血压
- E、尿中纤维蛋白降解产物增加

119、与急性肾小球肾炎关系最大的细菌是（B）

- A、葡萄球菌
- B、溶血性链球菌
- C、肺炎球菌
- D、大肠杆菌
- E、副大肠杆菌

120、诊断急性肾小球肾炎最重要的依据是（C）

- A、高血压
- B、水肿
- C、血尿
- D、中等量以上的蛋白尿

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/886231120005010051>