专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024福建省马尾区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷200题内部题库及答案（新）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.可出现锥体外系反应的是

A：哌替啶

B：甲氧氯普胺

C：双嘧达莫

D：苯二氮

答案：B

2.长期高磷血症会导致心脏、血管钙化，腹膜透析者必须在进食的同时服用的药物是

A：磷化物

B：铁剂

C：磷结合剂

D：钙结合剂

答案：C

3.下列哪种药物是血液透析和腹膜透析均可清除的药物

A：氯霉素

B：茶碱、普鲁卡因胺

C：苯巴比妥、阿司匹林

D：卡托普利

答案：C

4.代表乙型肝炎病毒e抗原的是

A：HBsAb

B：HBeAb

C：HBcAb

D：HBeAg

答案：D

5.下列药物中，不属于兴奋剂的是

A：利尿剂

B：钙通道阻断剂

C：精神刺激剂

D：β受体阻断剂

答案：B

6.维生素A用于

A：习惯性流产的辅助治疗

B：防治夜盲症

C：防治坏血病

D：防治佝偻病

答案：B

7.抗高血压药物中，保钾利尿药的主要不良反应为()。

A：血钾减低、血钠减低、血尿酸升高

B：血钾增高

C：直立性低血压

D：房屋传导阻滞，心功能抑制

答案：B

8.考察药品在广泛使用条件下的疗效和不良反应试验阶段，属于

A: Ⅱ期临床试验

B: Ⅲ期临床试验

C: Ⅰ期临床试验

D: Ⅳ期临床试验

答案：D

9.缺铁性贫血、肾性贫血可呈现

A: 白细胞增多

B: 淋巴细胞增多

C: 红细胞计数减少

D: 血小板减少

答案：C

10.利尿降压药的常见不良反应是

A: 首剂现象

B: 水、电解质紊乱

C: 咳嗽

D: 体位性低血压

答案：B

11.在中成药活胃胶囊、神曲胃痛片、陈香白露片、复方陈香味片、复方田七胃痛片中，所含有的共同组分是

A: 氢氧化铝

B: 氧化镁

C: 碳酸氢钠

D: 碳酸镁

答案：C

12.急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔前可使用

A：2%过氧化氢溶液

B：3%过氧化氢溶液

C：2%酚甘油滴耳液

D：3%酚甘油滴耳液

答案：C

13.心力衰竭的妊娠期妇女禁用

A：β受体阻断剂

B：RAAS抑制剂

C：强心苷

D：利尿剂

答案：B

14.长期服用可引起男性性功能障碍的药物是

A：非布司他

B：甲硝唑

C：西咪替丁

D：奥美拉唑

答案：C

15.静脉注射阿昔洛韦的适宜溶媒是

A：5%葡萄糖注射液

B：50%葡萄糖注射液

C：复方氨基酸注射液

D：0.9%氯化钠注射液

答案：D

16.临床试验观测的指标只限于实验设计内容，其他临床指标容易被忽视，属于

A：观察时间短

B：病例数目少

C：考察不全面

D：管理漏洞

答案：C

17.药物相互作用有发生在体内的药动学、药效学方面的作用；亦有发生在体外的配伍变化，如引起理化反应使药品出现混浊、沉淀、变色和活性降低。

A：抗酸药合用四环素类

B：用药时同服甲氧氯普胺

C：磺胺类药与青霉素合用

D：阿司匹林合用格列美脲

答案：D

18.易经乳汁分泌药物的特性是

A：分子量大

B：脂溶性高

C：蛋白结合率高

D：弱酸性

答案：B

19.香豆素类杀鼠药中毒的特效解毒剂是

A：青霉胺

B: 维生素K

C: 纳洛酮

D: 乙酰胺

答案：B

20.口服或静滴β受体阻断剂用于解救

A: 麦角胺中毒

B: 异烟肼中毒

C: 亚硝酸盐中毒

D: 瘦肉精中毒

答案：D

21.药品不良反应按照程度分为轻度、中度、重度三级。

A: 没有临床症状，无需治疗

B: 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无需治疗

C: 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害

D: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

答案：D

22.帕金森病患者跌倒的最常见原因为（）

A: 神经精神障碍

B: 不安腿综合征

C: 姿势反射障碍

D: 体位性低血压

答案：C

23.药师审核处方"用药与病症诊断不相符"工作中，所遇到的典型问题不包括

A: 过度治疗用药
B: 联合用药
C: 无适应证用药
D: 有禁忌证用药
答案：B

24.应用 α-葡萄糖苷酶抑制药时注意事项错误的是
A: 服用后常致胀气，可缓慢增加剂量和控制饮食减轻
B: 餐后服用可减少胃肠道刺激
C: 与胰岛素或磺脲类药联合应用，可增加发生低血糖的危险
D: 非磺酰脲类胰岛素促泌剂与 α-葡萄糖苷酶抑制药合用易出现低血糖现象
答案：B

25.不得将咨询档案等患者的资料用于商业目的
A: 及时回答不拖延
B: 保护患者的隐私
C: 解释的技巧
D: 特别关注特殊人群
答案：B

26.含铁量高，服用后起效快的药品是
A: 乳酸亚铁
B: 葡萄糖酸亚铁
C: 富马酸亚铁
D: 硫酸亚铁
答案：C

27.对乙酰氨基酚过量的特殊解毒剂

A：纳洛酮

B：二巯丁二钠

C：谷胱甘肽

D：乙酰半胱氨酸

答案：D

28.使用消化性溃疡治疗药物的注意事项,因长期应用可导致腹泻或便秘的药物是

A：硫糖铝

B：铋剂

C：铝碳酸镁

D：丙谷胺

答案：C

29.患者，女，54岁。诊断为类风湿关节炎2年，目前服用甲氨蝶呤(15mgqw)和塞来昔布(200mgqd)。患者因担心药品不良反应用药规律时断时续近日出现腕关节肿胀和疼痛加重晨僵明显加用泼尼松10mgqd。

A：定期就诊评估病情,调整治疗案

B：多晒太阳适量补充钙剂、维生素D预防骨质疏松

C：早期治疗、遵医嘱规律用药

D：一旦症状改善,应即刻停药

答案：D

30.为了避免夜间排便，泻药硫酸镁应该

A：餐前服用

B：清晨服用

C：餐后服用

D: 睡前服用

答案：B

31.抗菌谱广，属于碳青霉烯类的药物是

A: 头孢哌酮

B: 氨曲南

C: 克拉维酸

D: 亚胺培南

答案：D

32.患者，女，57岁，最近因失眠来门诊就医。经医生咨询，患者反映以前没有过失眠现象，近期因工作原因导致压力加大，心理负担过重，白天想睡觉，晚上却无法入睡，每天睡眠不足5h。医生给予患者建议平时要注意多增加运动，缓解压力，并开具了如下处方：地西泮片：5mg×20／5mgqd

A: 白色，右上角应有标注

B: 淡红色

C: 淡黄色

D: 淡绿色

答案：A

33.蒽环类药物的主要毒副作用是（）

A: 溶血性尿毒症

B: 肺纤维化

C: 心脏毒性

D: 出血性膀胱炎

答案：C

34.患老年高血压并发心力衰竭，宜选用的药物是

A：非洛地平

B：氢氯噻嗪

C：缬沙坦

D：美托洛尔

答案：B

35.患者，男性，55岁，近期感觉乏力、疲倦、心悸、气短，经常头晕、头疼、困倦。经医生检查发现，患者皮肤干燥、指甲扁平。实验室检查示Hb72g／L。诊断为缺铁性贫血，处方为乳酸亚铁口服。

A：肾毒性

B：心脏相关风险

C：胃肠道反应

D：肝毒性

答案：C

36.中度药品不良反应是指

A：没有临床症状，无须治疗

B：指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害

C：指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

D：指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无须治疗

答案：C

37.患者,女,69岁,近一个月出现入睡困难,白天有头昏、疲倦等不适感,尝试非药物治疗无改善,推荐的药物治疗方案是()

A：唑吡坦5mgpoqn

B：苯巴比妥100mgpoqn

C：地西泮5mgpoqn

D: 氯硝西泮 2mgpoqn

答案：A

38.表现为“牛肉样舌”的疾病为()

A: 白血病

B: 缺铁性贫血

C: 再生障碍性贫血

D: 巨幼细胞性贫血

答案：D

39.某患者需要注射维生素 B

A: 3/4 支

B: 3/2 支

C: 1/2 支

D: 1 支

答案：C

40.（2019 年真题）正常剂量氯化钾的妊娠毒性分级是

A: X 级

B: B 级

C: A 级

D: C 级

答案：C

41.美托洛尔和肾上腺素的相互作用属于()。

A: 排泄

B: 与血浆蛋白结合

C: 作用于同一受体的拮抗作用

D: 酶诱导作用

答案：C

42.女性，32岁，3年来月经量增多，乏力、心悸。体检面色较苍白。血红蛋白80g／L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞7×109／L，血小板120×109／L，血清铁300μg／L。

A: 钙剂可促进铁剂吸收

B: 碳酸氢钠抑制铁剂吸收

C: 正常人维持体内铁平衡需要每日从食物中摄取铁2～2.5mg

D: 尽量空腹服用亚铁盐，以促进其吸收

答案：B

43.患者，男，58岁，患2型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片0.5gtidpo、瑞格列奈片1mgtidpo、阿托伐他汀片20mgqdpo等药物治疗。

A: 一旦出现低血糖症状，应立即口服葡萄糖水、糖块、巧克力等

B: 阿托伐他汀钙片可在一天中任何固定时间给药

C: 二甲双胍肠溶片应于餐后服用

D: 瑞格列奈片应于餐前服用

答案：C

44.药品通用名容易混淆的抗真菌药是

A: 阿糖腺苷

B: 氟尿嘧啶

C: 氟胞嘧啶

D: 阿糖胞苷

答案：C

45.静脉滴注给予万古霉素，滴注时间应该控制的时间是

A：2小时以上

B：1小时以上

C：4小时以上

D：6小时以上

答案：A

46.（2017年真题）患者，男52岁，身高168cm，体重85kg，痛风病史6年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖7.8mmol/L（正常值:3.9～6.1mmol/L），餐后血糖148mmo/L（正常值:<7.8mmol/L），血尿酸580μmol/L（正常值:男性180～440μmol/L），LDL-c3.7mmo/L（正常值:2.1~3.1mmo/L）肌酐清除率100ml/min。颈动脉彩超提示:动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断2型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症.

A：甘精胰岛素

B：二甲双胍

C：格列齐特

D：阿卡波糖

答案：D

47.不宜与葡萄柚汁合用的药物是

A：辛伐他汀

B：硫酸亚铁

C：磺胺类药物

D：左旋多巴

答案：A

48.(肾功能不全者的药物排泄机制)心力衰竭导致药物经肾排泄减少

A：肾小管重吸收增加

B：肾小管分泌减少

C：肾小球滤过减少

D：肾血流量减少

答案：D

49.糖尿病合并肾病患者首选的口服降血糖药为

A：格列喹酮

B：格列美脲

C：格列吡嗪

D：格列齐特

答案：A

50.肝功能不全患者宜选用的药物是

A：经肝肠循环消除的药物

B：肝毒性小、经肾代谢的药物

C：经肝肾双途径消除的药物

D：肾毒性小、经肝代谢的药物

答案：B

51.成年人血清中三酰甘油含量是

A：0.56～1.70mmol/L

B：1.03～2.07mmol/L

C：3.1～5.7mmol/L

D：2.1～3.1mmol/L

答案：A

52.有关抗菌药物的局部应用，说法错误的是

A：耳部革兰阴性菌感染应首选氨基糖苷类药物局部滴耳

B：对于全身给药难以到达的感染部位，可局部加用抗菌药物

C：眼部感染应首选眼药水滴定治疗

D：青霉素类、头孢菌素类药物不适宜局部应用

答案：A

53.乙型肝炎病毒e抗体为

A：乙型肝炎病毒感染早期血清中出现的一种特异性血清标记物

B：不能抑制HBV的增殖，可反映肝细胞受到HBV侵害后的一项指标

C：不能抑制HBV的增殖，出现在HBsAg转阴之后，证明人体对HBsAg有一定的免疫清除率的指标

D：为一种保护性抗体，表明人体具有一定免疫力的指标

答案：C

54.新生儿体内水溶性药物排出较慢、容易中毒，其主要机制是患儿总体液量占体重的

A：80%～85%

B：75%～80%

C：65%～70%

D：70%～75%

答案：B

55.不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免呛入气管的药物是

A：聚乙二醇粉剂

B：磷酸可待因糖浆

C：吲哚美辛胶囊

D：非洛地平缓释片

答案：A

56.用于锑、铅、汞、砷中毒的解救药物是()。
A: 盐酸烯丙吗啡
B: 二巯基丁二钠
C: 氯丙嗪
D: 谷胱甘肽
答案：B

57.以下药物中，可引起粒细胞减少症的是()。
A: 吲哚美辛
B: 甲氨蝶呤
C: 环磷酰胺
D: 巯嘌呤
答案：A

58.是归纳、综合、整理后的出版物，使用最为广泛
A: 二级信息源资料
B: 网站信息
C: 三级信息源资料
D: 期刊论文
答案：C

59.患者，女，24岁，患有缺铁性贫血并伴有慢性腹泻，实验室检查：Hb55g/L，血清铁12μg/L，首选的治疗方案是（）
A: 注射维生素B12
B: 静脉滴注铁剂
C: 雄性激素治疗
D: 口服铁剂及维生素C

答案：B

60.结核杆菌生命力顽强，且易产生耐药性，临床采用标准化学治疗方案

A：3HRZE／9HR

B：2HRZE／4HR

C：2HRZE／4HR

D：2HRE／7HR

答案：C

61.可引起头晕、失眠、抑郁、幻觉、心动过缓、低血压，严重者可诱发支气管哮喘的兴奋剂是

A：蛋白同化激素

B：B受体阻断剂

C：人生长激素

D：精神刺激剂

答案：B

62.尿液是人体泌尿系统排除的代谢废物，正常人每日排出尿液1000～3000ml。其中97%为水分，而在3%的固体物质中，主要含有两大类物质：有机物（尿素、尿酸、肌酐等蛋白质代谢产物）和无机物（氯化钠、磷酸盐、硫酸盐、铵盐等）。

A：尿沉渣管型

B：尿沉渣白细胞

C：尿沉渣磷酸盐

D：尿沉渣结晶

答案：A

63.下列为二级信息源的药学文献

A：药物信息手册

B：药学杂志

C：中国国家处方集

D：中国药学文摘

答案：D

64.高血压伴痛风患者慎用的药物是（）

A：普萘洛尔

B：硝苯地平

C：氢氯噻嗪

D：卡托普利

答案：C

65.患者，男52岁，身高168cm，体重85kg，痛风病史6年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖7.8mmol/L(正常值:3.9～6.1mmol/L),餐后血糖148mmo/L(正常值:<7.8mmol/L),血尿酸580μmol/L(正常值:男性180～440μmol/L),血ldlc3.7mmo/L(正常值:2.1~3.1mmo/L)肌酐清除率100ml/min。颈动脉彩超提示:动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断2型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症.

A：甘精胰岛素

B：二甲双胍

C：阿卡波糖

D：格列齐特

答案：C

66.可能导致γ-谷氨酰转移酶升高的药物是

A：胰岛素
B：阿司匹林
C：氯氮平
D：苯妥英钠
答案：D

67.老年性骨质疏松的"三联药物"治疗
A：长期口服维生素D
B：钙制剂+维生素D+双膦酸盐
C：单独用双膦酸盐
D：用甲状旁腺激素
答案：B

68.心衰治疗中能够快速控制体液潴留的药物是（）
A：β受体阻断剂
B：阿托品
C：肾上腺素
D：利尿剂
答案：D

69.伴痛风者禁用()。
A：ACEI
B：利尿剂（噻嗪类）
C：利尿剂（袢利尿药）
D：非二氢吡啶类钙通道阻滞剂
答案：B

70.患者，男，28岁。咳嗽、咳痰，血常规提示白细胞及中性粒细胞正常，予阿奇霉素抗感染为

A: 有禁忌证用药

B: 联合用药不适宜

C: 无适应证用药

D: 过度治疗用药

答案：C

71.某患者，男，71岁，既往有血脂异常，胆固醇7.7mmol/L，甘油三酯2.3mmol/L，肝功能正常，患者连续服用氟伐他汀和非诺贝特5个月，检测肝功能AST142U/L(正常值为40U/L)，ALT126(正常值为40U/L)，磷酸激酶CPK2000U/L(正常值为25～200U/L)。依据上述复查结果判断患者

A: 肝脏毒性

B: 心脏毒性

C: 肌肉毒性

D: 肾脏毒性

答案：C

72.用于紧急避孕的药物是

A: 左炔诺孕酮

B: X睾酮

C: 黄体酮

D: 罗格列酮

答案：A

73.作为退热药，布洛芬的优势是

A: 可诱发变态反应

B：镇痛作用较强

C：具有解热镇痛消炎作用

D：对胃肠道的不良反应较轻

答案：D

74.（2013版中国居民膳食营养素参考摄入量》建议，65岁及以上老年人推荐维生素D摄入量为

A：2000～4000IU（50～100μg）/d

B：400IU（10μg）/d

C：8001200IU（20～30μg）/d

D：600IU（15μg）/d

答案：D

75.《药物事实与比较》属于

A：药品不良反应

B：药物相互作用

C：药品标准

D：药物综合信息

答案：D

76.下列关于药物对孕妇的影响哪一项是错误的

A：孕妇不应过量服用含咖啡因的饮料

B：孕妇患有结核、糖尿病应绝对避免药物治疗以防止胎儿畸形

C：受精后3周～3个月接触药物最易发生先天畸形

D：受精后的半个月内几乎见不到药物的致畸作用

答案：B

77.脑出血

A: 2～3周
B: 4～5周
C: 1～2周
D: 2～4周
答案：D

78.检查片剂的硬度属于
A: 视觉试验
B: 嗅觉试验
C: 触觉试验
D: 听觉试验
答案：C

79.某女性，32岁，2天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见WBC15×109/L，中性粒细胞百分比85%，尿分析见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。
A: 抗菌药物在尿和肾内的浓度要高
B: 首选针对革兰氏阳性菌的药物
C: 选用肾毒性小、副作用少的抗菌药物
D: 如该患者为妊娠期，可选用氨苄青霉素
答案：B

80.患者，女，55岁，关节痛半年，临床诊断为类风湿关节炎，既往有十二支肠溃疡病史，应首选的NSAID类药物是
A: 塞来昔布
B: 双氯芬酸
C: 布洛芬
D: 吲哚美辛

答案：A

81.患者，女，64岁，患2型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片0．59tidpo、瑞格列奈片1mgtidpo、阿托伐他汀钙片20mgqdpo等药物治疗。

A: 一旦出现低血糖症状，应立即口服葡萄糖水、糖块、巧克力等

B: 阿托伐他汀钙片可在一天中任何固定时间给药

C: 瑞格列奈片应于餐前服用

D: 二甲双胍肠溶片应于餐后服用

答案：D

82.属于胃食管反流病的食管外症状的是（）（消化性溃疡病的治疗）

A: 上腹部烧灼感

B: 反流

C: 哮喘

D: 烧心

答案：C

83.对氟乙酰胺中毒进行解毒的药物是()。

A: 阿托品

B: 毒扁豆碱

C: 乙酰胺

D: 卡马西平

答案：C

84.（2019年真题）患者，男，34岁，有吸毒史。因过量使用阿片类药物昏迷入急诊抢救，表现为针尖样瞳孔、呼吸抑制，可选用的解救药物是

A: 纳洛酮

B: 二巯丙醇

C: 维生素K

D: 亚甲蓝

答案：A

85.茶碱、咖啡因、可卡因等容易引起癫痫发作，属于

A: 药源性神经损害

B: 药源性肾损害

C: 药源性肝损害

D: 药源性血损害

答案：A

86.（2019年真题）患者，男，72岁。诊断:高血压，心力衰竭，肋软骨炎。

A: 应定期监测血压、心率

B: 应定期监测地高辛血药浓度

C: 应注意观察是否有黑便

D: 在患者症状好转后，应立即停用比索洛尔

答案：D

87.患者，女，55岁，因“反复发作胸骨后疼痛2年，伴反酸、胃灼热、间断积食”来诊，食管测压提示食管下段括约肌压力小于6mmHg，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病。医师处方：奥美拉唑20mgbid强化抑酸治疗。

A: 戒烟酒

B: 避免高脂饮食

C：控制体重

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/887042062046010024