

## 骨科护理选择题

### 骨科试题

#### 一、选择题：

##### A 型题

1. 闭合性骨折转运前最重要的是：D

A . 使用止痛药 B . 抬高患肢 C . 做好手法复位 D . 伤肢固定  
E . 保持肢体功能位

2. 急性血源性骨髓炎的好发部位是：E

A . 骨髓腔 B . 骨皮质 C . 骨膜下 D . 骨髓 E . 干骺端

3. 骨折与脱位都会出现的体征是：A

A . 畸形 B . 弹性固定 C . 异常活动 D . 骨擦音 E . 关节部位空虚

4. 稳定性骨折是：A

A . 横断骨折 B . 斜形骨折 C . 螺旋形骨折 D . 粉碎性骨折 E . 撕脱性骨折

5. 骨恶性肿瘤最多见的是：D

A . 骨瘤 B . 骨软骨瘤 C . 骨血管瘤 D . 骨肉瘤

6. 骨折牵引术的作用不包括：C

A . 骨折复位作用 B . 骨折固定作用 C . 防止骨质脱钙 D . 矫正畸形  
E . 解除肌肉痉挛

7. 病人诉石膏型内肢体疼痛，错误的处理是：A

A . 向疼痛处填塞棉花 B . 抬高肢体 C . 调整肢体体位 D . 疼痛处石膏型开窗  
E . 可更换石膏

8. 经过正确治疗和护理，成人骨折达到骨性愈合一般需要：D

A 1 周

B 2-3 周

C 4-8 周

D 8-12 周

E 12-16 周

9. 骨关节结核时，让病人双手抱紧健侧膝部，骨盆平路，则患髋

与膝呈屈曲状态,此时为：C

A．杜加试验阳性 B．拾物试验阳性 C．托马斯征阳性 D．浮髌试验阳性 E．直腿抬高试验阳性

10. 下列骨折哪项属不完全骨折：A

A．青枝骨折 B．粉碎性骨折 C．螺旋形骨折 D．嵌插性骨折

11. 女性，65 岁，因股骨颈骨折行皮牵引，应采取的体位：A

A．外展中立位 B．内收中立位 C．外展外旋位 D．内收内旋位

E．双腿并拢功能位

12. 男性，33 岁，车祸造成左股骨干开放性骨折，接诊时首先应注意的并发症是：C

A．神经损伤 B．伤口感染 C．失血性休克 D．损伤性骨化 E．缺血性骨坏死

13. 早期急性骨髓炎典型的临床征象是：A

A 高热、近关节处压痛 B 高热及骨干中部有压痛 C 高热及关节处有压痛 D 低热、轻度压痛 E 高热、关节积液

14. 骨折患者功能锻炼，晚期运动的重点是：C

A 患肢肌肉舒缩锻炼 B 患肢骨折近端关节运动为主 C 以重点关节为主的全身锻炼 D 患肢骨折远端关节运动为主 E 所有关节应禁止活动

15. 12 岁少年，1 年来在一般性活动中反复发生右肩关节前脱位 4 次。

其主要原因是：C

A．缺少自我保护意识 B．年龄较小 C．初次脱位未行固定

D．体质较差 E．右侧肩关节习惯性脱位

16. 女性，28 岁。因脊柱结核致截瘫 1 月。粪便秘结，每 3~4 日排便 1 次。有排尿失禁现象。双下肢肌力明显减退，浅感觉麻木。其截瘫指数应计为：D

A．1 B．2 C．3 D．4 E．5

17. 7 岁男孩，高热寒颤 5h，左下肢活动受限。左胫骨上端剧痛，且有深压痛。血白细胞计数  $21 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 90%。X 线片未见异常。4 日前有左膝部碰伤史。可能是：B

A．左膝化脓性关节炎 B．急性血源性骨髓炎 C．急性蜂窝织炎

D . 膝关节结核 E . 创伤性关节炎

18. 女性，60 岁。跌倒致右股骨颈骨折，现给予持续皮牵引处理。

该病人最易发生的并发症是：D

A . 休克 B . 右坐骨神经损伤 C . 髌关节创伤性关节炎

D . 右股骨头缺血性坏死 E . 骨化性肌炎

19. 某病人跌倒时右手掌撑地，当时右腕剧痛，渐肿胀，活动障碍，局部呈"餐叉"畸形。可能发生了：A

A . 桡骨远端伸直型骨折 B . 桡骨远端屈曲型骨折 C . 腕骨骨折

D . 掌骨骨折 E . 腕关节扭伤

20. 男性，25 岁，外伤后出现肘部关节肿胀，可以帮助鉴别肱骨髁上骨折和肘关节后脱位的表现是：D

A . 手臂功能障碍 B . 肘部剧烈疼痛 C . 是否可摸到尺骨鹰嘴

D . 肘后三点失去正常关系 E . 跌倒后因手掌撑地而受伤

21.杜加征阳性的临床意义是： D

A、 肱骨上端骨折

B、 锁骨肩峰端骨折

C、 髌关节后脱位

D、 肩关节前脱位

E、 肘关节后脱位

22.膝部术后膝关节应屈曲： A

A、 15°

B、 30°

C、 45°

D、 60°

E、 90°

23.甲沟炎形成甲下脓肿时应采用：E

A、 热敷

B、 外敷药物

C、 切开引流

D、 穿刺抽脓

E、拔甲术

24.罗先生，男，34岁，因蹦极外伤至截瘫，卧床已3个月，病人一般状况差，骶尾部可见一面积为2cm~4cm、较深的创面，有脓液流出，创面周可见少量黑色坏死组织。以下护理措施最恰当的是：E A、用50%酒精按摩创面及周围皮肤 B、用厚层滑石粉包扎

C、用生理盐水冲洗后，自然干燥

D、仅用红外线照射即可

E、剪去坏死组织，用0.02%呋喃西林冲洗后，外敷药物

25.断离肢体的保存方法是：D

A、无菌单包裹后室温保存

B、无菌单包裹后冷冻保存

C、浸泡于2~4℃的无菌溶液中

D、无菌单包裹外套塑料袋干冻冷藏

E、无菌单包裹浸泡于2~4℃的生理盐水中

26.下列不属于骨折专有体征的是：A

A、功能障碍

B、骨擦音

C、骨擦感

D、反常运动

E、畸形

27.开放性骨折伴活动性出血，处理应首先：C

A、快速输液，补足血容量

B、药物止痛

C、止血

D、固定骨折

E、包扎伤口

28.石膏绷带包扎，错误的方法是：E

A、患肢保持功能位

B、包扎处用手指扶托肢体

C、动作敏捷，用力均匀

- D、边缘部分应予修齐
- E、伤口部位在未干涸前开窗

29.瘫痪病人的护理措施中不正确的是： D

- A、做好心理护理
- B、保持瘫痪肢体功能位
- C、防止褥疮发生
- D、早期使用留置导尿
- E、预防便秘

30.压缩性骨折常见于： C

- A、股骨干骨折
- B、肱骨干骨折
- C、椎体骨折
- D、桡骨骨折
- E、肋骨骨折

31.急性血源性骨髓炎的护理措施不包括： D

- A、观察并发症的发生
- B、患肢固定于功能位
- C、加强全身支持疗法
- D、体温正常后即可停用抗生素
- E、炎症控制后指导功能锻炼

32.腰椎间盘突出症最常发生于： D

- A、腰 1~2 椎
- B、腰 2~3 椎
- C、腰 3~4 椎
- D、腰 4~5 椎
- E、腰 5~骶 1

33.一般骨折病人的首选的检查项目是： A

- A、X 线摄片
- B、CT 检查
- C、B 超

D、血液一般检查(血常规)

E、磁共振成像

34.骨折晚期并发症有： C

A、血管损伤

B、骨筋膜室综合征

C、关节僵硬

D、脂肪栓塞

E、神经损伤

35.骨折现场抢救，错误的是： B

A、重点检查有无内脏损伤

B、开放性骨折应现场复位

C、取清洁布类包扎伤口

D、就地取材，固定伤肢

E、平托法搬移脊柱骨折病人

36.跌倒时手掌撑地不可能造成的损伤有： E

A、肱骨踝上骨折

B、肩关节前脱位

C、肘关节脱位

D、伸直型桡骨远端骨折

E、屈曲型桡骨远端骨折

37.下列哪项是骨折早期的并发症： A

A、血管神经损伤

B、关节僵硬

C、创伤性关节炎

D、缺血性肌挛缩

E、延迟愈合

38.骨科病人的护理诊断： E

A、焦虑

B、躯体移动障碍

C、排便异常

D、有感染的危险

E、以上都是

39.肢体长时间只有固定，而没有指导功能锻炼易导致的并发症是：

E

A、缺血性肌挛缩

B、创伤性关节炎

C、骨折延迟愈合

D、骨化性肌炎

E、关节僵硬

40.章先生，28 岁，车祸致小腿胫腓骨骨折，行石膏管型固定后

4h

病人诉患肢剧痛，体格检查：肢端苍白、触之发凉、足趾活动受限，应考虑：A

A、血管受压

B、骨折断端移位

C、病人卧位不当

D、伤口疼痛

E、继发感染

41.护理瘫痪病人以下哪项不妥：D

A、鼓励咳嗽排痰

B、预防褥疮和肺炎

C、预防泌尿道感染

D、避免

瘫痪肢体活动 E、鼓励多饮水

42.男性，17 岁，从高处坠落，臀部着地致胸 12、腰 1 椎体压缩性骨折，导致骨折的原因是：B

A.直接暴力

B.间接暴力

C.肌肉牵拉

D.骨骼劳损

E.骨骼疾病

43.脊柱骨折患者急救运送方法，正确的是：B

A 用软担架运送 B 三人平托放于硬板运送 C 二人抱持运送 D 一人抱持运送 E 一人背负运送

44.骨折牵引时，预防过渡牵引的措施是：C

A 加强患肢的锻炼 B 尽可能减轻牵引重量 C 定时测定肢体长度  
D 防止牵引针左右移动 E 定时放松牵引装罝

45.闭合性骨折在运送前最重要的是：C

A 使用止痛剂 B 做好手法复位 C 伤肢固定 D 抬高患肢 E 保持肢体功能位

46.骨折长期卧床患者放罝足部保护架的主要目的：C

A 有利于擦浴 B 易于观察血运 C 避免足背长期受压 D 便于功能锻炼 E 方便床褥整理

47.关于石膏固定患者护理的叙述正确的是：B

A 若石膏上有血迹，应立即打开石膏检查  
B 搬运石膏未干的肢体时，要用手掌托扶  
C 石膏被污染时，可用清水冲洗  
D 包裹石膏的患肢疼痛时，可自行服用止痛剂  
E 为加速石膏干固，烘烤石膏的温度过高越好

48.腰椎间盘突出症引起坐骨神经痛，向下肢放射的典型部位是：

E A 髂部以下整个腿痛

B 大腿后侧和小腿内侧痛

C 大腿前侧、小腿内侧和足背内侧痛

D 小腿后侧和足底部痛

E 从下腰部向臀、下肢、足背或足外侧放射

49.截瘫患者长期卧床所致的主要并发症：C

A 缺血性挛缩、神经受压症状

B 肌肉萎缩、关节强直

C 坠积性肺炎、尿路感染、褥疮

D 皮肤过敏、水疱、糜烂

E 消化道出血、腹痛、腹胀

50.骨折现场急救正确的是：D

A 骨折都应初步复位后再临时固定

B 对骨折端外漏者应先复位后固定，以免继续感染

C 只是怀疑骨折可不必要固定，注意妥当搬运

D 一般应将骨折肢体在原位做临时固定

E 绷带包扎即可，不用夹板，以免触动伤肢后加重损伤

51.缺血性肌挛缩常继发的损伤是：D

A 肱骨干骨折 B 桡骨下端骨折 C 肘关节脱位 D 肱骨髁上骨折

E 肩关节脱位

52.患者男性，20岁。踝关节扭伤，为防止皮下出血和组织肿胀，在

早期应选用：C

A 局部按摩 B 红外线照射 C 湿冷敷 D 湿热敷 E 放络热水袋

53.患者男性，40岁，胫骨骨折石膏管型固定后8小时，患肢疼痛难忍，检查：肢端苍白，温度降低，足趾不能活动。应考虑：D

A 骨折端移位 B 垫衬不妥 C 继发感染 D 血管受压 E 体位不当

54.属于不稳定性骨折的是：E

A 嵌插骨折 B 青枝骨折 C 横骨折 D 裂缝骨折 E 斜骨折

55.骨折的治疗原则中，除复位、固定还有：B

A 抗感染 B 功能锻炼 C 内外用药 D 物理治疗 E 止痛

56.骨折愈合期约需：C

A 2-3周

B 4-8周 C 8-12周 D 6个月 E 2-4年

57.最容易引起骨折不连续的移位，是：C

A 成角移位 B 侧方移位 C 旋转移位 D 分离移位 E 缩短移位

58.骨折临床愈合后，骨痂的改造塑性，取决于：B

A 多次手法复位，不利于骨折愈合

B 肢体活动和负重所形成的压力

C 骨牵引过渡可能造成延迟愈合或不愈合

D 内固定和外固定不充分不利于愈合

E 适当功能锻炼有利于愈合

59.骨折引起脂肪栓塞是由于：C

A 病人肥胖 B 脂肪肝 C 骨筋膜室压力过大 D 创伤的应激作用

E 静脉压力增高

60.骨折后最易发生骨缺血性坏死的部位是：A

A 股骨头 B 肱骨头 C 桡骨远端 D 锁骨远端 E 胫骨内踝

61.按骨折程度分类的是：B

A 病理性骨折 B 完全性骨折 C 稳定性骨折 D 陈旧性骨折 E 开放性骨折

62.某患者用 upper 肢作剧烈投掷动作时，造成肱骨内上髁骨折，其原因属：C

A 直接暴力 B 间接暴力 C 肌肉牵拉 D 骨骼病变 E 长期劳损

63.骨折晚期造成关节僵硬、肌肉萎缩的主要原因：E

A 关节面对合不良 B 局部血供差 C 骨折程度重 D 局部神经损伤

E 缺乏有效的功能锻炼

64.关节脱位是指：C

A 关节囊破裂 B 外伤后关节失去功能 C 关节面失去正常的对合关系 D 关节的结构破坏 E 关节分离

65.脊髓型颈椎间盘突出症的诊断依据：是 D

A 颈肩痛、手麻 B 一侧或双侧上肢麻，持物不稳

C 头痛、眼痛，吞咽困难，面部出汗异常

D 四肢麻木或四肢瘫、病理反射、脊髓造影有梗阻，MRI 示有椎间盘后突，硬膜囊受压

E 颈肩痛，手部肌肉减弱、上肢麻木，吞咽困难者。

66.X 线对骨折的检查主要目的是：B

A 确定有无合并伤 B 确定骨折部位和类型，指导治疗

C 必须拍正、侧位片 D 必须在临床检查之后进行拍片

E 必须加健侧对照

67.腰椎间盘突出最易发生的部位是：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/887103143030006040>