

2024 年福建省诏安县《执业药师之西药学专业二》考试真题题库及一套参考答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 变异型心绞痛宜选用

- A: 普萘洛尔
- B: 硝苯地平
- C: 地尔硫
- D: 维拉帕米

答案：B

2. 属于雌激素类退乳药的是()

- A: 睾酮
- B: 甲羟孕酮
- C: 己烯雌酚
- D: 他莫昔芬

答案：C

3. 维生素 C 的主要适应证是

- A: 治疗脂溢性皮炎
- B: 防治坏血病
- C: 治疗佝偻病
- D: 治疗厌食症

答案：B

4. 下列选项中，属于四环素禁用的人群有()

- A: 中、老年人
- B: 妊娠期妇女
- C: 精神病患者
- D: 月经期妇女

答案：B

5. 须用专属性极强的解毒剂右雷佐生保护心肌的药物是

- A: 吉非替尼
- B: 环磷酰胺
- C: 曲妥珠单抗
- D: 多柔比星

答案：D

6. 神经垂体功能不足引起的中枢性尿崩症具有良好抑制作用的药物是

- A: 催乳素
- B: 醋酸去氨加压素
- C: 促肾上腺皮质激素
- D: 促性腺激素

答案：B

7. 可用于慢性活动性肝炎的治疗()

- A: 赖氨酸
- B: 复方氨基酸注射液(18AA)
- C: 精氨酸
- D: 复方氨基酸注射液(3AA)

答案：D

8. 袢利尿药中，最易引起耳毒性，且可发生永久性耳聋的药物是()

- A: 布美他尼
- B: 托拉塞米
- C: 依他尼酸
- D: 呋塞米

答案：C

9. 治疗各种人类血吸虫病的首选药物是

- A: 吡喹酮
- B: 乙胺嗪
- C: 酒石酸锑钾
- D: 左旋咪唑

答案：A

10. α 肾上腺素受体分布占优势的效应器是

- A: 皮肤黏膜血管
- B: 肾血管
- C: 骨骼肌血管
- D: 冠状血管

答案：A

11. 体内缺乏维生素 E 会导致

- A: 脚气病
- B: 夜盲症
- C: 佝偻病
- D: 不孕症

答案：D

12. 患者，男，60岁。入院诊断为：高胆固醇血症、支原体肺炎。医师拟选用克拉霉素治疗支原体肺炎，同时需进行调血脂治疗，不宜与克拉霉素合用的调血脂药是

- A: 依折麦布
- B: 氟伐他汀同德
- C: 辛伐他汀
- D: 非诺贝特

答案：C

13. 米索前列醇可以

- A: 与前列腺素 E 受体结合，降低胃壁细胞的胃酸分泌
- B: 在胃内直接中和胃酸
- C: 抑制 H^+ , K^+ -ATP 酶活性，使壁细胞内的 H^+ 不能转运到胃腔中，阻断了胃酸分泌的最后步骤
- D: 竞争性的拮抗组胺与胃壁细胞上的 H 受体结合，抑制基础胃酸分泌及由组胺和食物刺激后引起的胃酸分泌

答案：A

14. (2018 年真题) 关于胶体果胶铋用药教育的说法, 错误的是 ()

- A: 胶体果胶铋使用后口中可能有氨味
- B: 胶体果胶铋使用后大便可能会变黑
- C: 妊娠期妇女禁用胶体果胶铋
- D: 胶体果胶铋宜与牛奶同时服用

答案：D

15. 别嘌醇抗痛风的作用机制是

- A: 抑制粒细胞浸润和白细胞趋化
- B: 可促进尿酸分解，将尿酸转化为一种溶解性更好的尿囊素

C: 抑制黄嘌呤氧化酶，阻止次黄嘌呤和黄嘌呤代谢为尿酸

D: 抑制近端肾小管对尿酸盐的重吸收，使尿酸排出增加

答案：C

16. 四环素联用钙剂使

A: 口服吸收减少

B: 肝毒性增加

C: 调整抗凝血药的剂量

D: 增加麦角中毒的风险

答案：A

17. 可用于治疗阴茎勃起功能障碍的药物是

A: 丙酸睾酮

B: 米非司酮

C: 他达拉非

D: 炔诺酮

答案：C

18. 属于 IA 类抗心律失常药

A: 普萘洛尔

B: 奎尼丁

C: 利多卡因

D: 胺碘酮

答案：B

19. 变异型心绞痛不宜选用

A: 硝苯地平

B: 普萘洛尔

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 维拉帕米

D: 地尔硫

答案: B

20. 不易导致便秘和腹泻不良反应的抗酸药是

A: 铝碳酸镁

B: 三硅酸镁

C: 氢氧化铝

D: 碳酸钙

答案: A

21. (2021 年真题) 常与 ACEI 联用, 在协同降压的同时, 兼具防治高钾血症的中效利尿剂是 ()

A: 乙酰唑胺

B: 螺内酯

C: 氢氯噻嗪

D: 甘油果糖

答案: C

22. (2018 年真题) 关于奥司他韦作用特点的说法, 错误的是 ()

A: 1 岁以上儿童可以使用奥司他韦

B: 治疗流感时, 首次使用奥同他韦应当在流感症状出现后的 36 小时以内

C: 奥司他韦可用于甲型和乙型流感的治疗

D: 应严格掌握奥司他韦适应证, 不能用于流感的预防

答案: D

23. 下列药物按作用机制分类, 属于抗纤溶药的是

- A: 氨甲苯酸
- B: 凝血酶
- C: 维生素 K
- D: 酚磺乙胺

答案：A

24. 下列属于长效和强效的特异性胃肠道脂肪酶抑制剂的药物是

- A: 黄体酮
- B: 环孢素
- C: 奥利司他
- D: 米非司酮

答案：C

25. 治疗阴道滴虫病的首选药物是()

- A: 甲硝唑
- B: 克林霉素
- C: 呋喃妥因
- D: 多黏菌素

答案：A

26. 通过刺激胰岛 β 细胞分泌胰岛素，存在"继发失效"问题的降血糖药()

- A: 艾塞那肽
- B: 阿卡波糖
- C: 二甲双胍
- D: 格列本脲

答案：D

27. 用于功能性子宫出血、妊娠早期先兆流产、习惯性流产的是

- A: 硝苯地平
- B: 噻嘧啶
- C: 绒促性素
- D: 米非司酮

答案：C

28. 下述药物中兼有角质溶解和抑制真菌作用的是

- A: 阿莫罗芬
- B: 苯甲酸
- C: 咪康唑
- D: 特比萘芬

答案：B

29. 临床用于军团菌病、支原体肺炎、空肠弯曲菌肠炎等首选的治疗药物是

- A: 红霉素
- B: 头孢米诺
- C: 阿奇霉素
- D: 四环素

答案：A

30. 心律失常者慎用的治疗浅表真菌感染的药物是

- A: 制霉菌素
- B: 益康唑
- C: 两性霉素 B
- D: 咪康唑

答案：D

31. (2019 年真题) 患者，女，52 岁，因“闭经 1 年，潮热、情绪波动、严重失眠半年”就诊，临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为：戊酸雌二醇片，每日 1 次，每次 1mg，醋酸甲羟孕酮片，每日 1 次，每次 2mg。

- A: 血脂异常
- B: 血栓性静脉炎
- C: 骨质疏松症
- D: 泌尿系统感染

答案：B

32. 阿糖胞苷、吉西他滨属于()

- A: 胸腺核苷合成酶抑制剂
- B: 二氢叶酸还原酶抑制剂
- C: 核苷酸还原酶抑制剂
- D: DNA 多聚酶抑制剂

答案：D

33. 以脉冲方式从垂体中释放出来，在血液循环中的半衰期只有 7~12min 的药物是

- A: 醋酸去氨加压素
- B: 催乳素
- C: 促性腺激素
- D: 促肾上腺皮质激素

答案：D

34. 属于 I B 类抗心律失常药

- A: 奎尼丁

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 胺碘酮
- C: 普萘洛尔
- D: 利多卡因

答案：D

35. 不属于抗乙型肝炎病毒的药品是

- A: 干扰素- α
- B: 拉米夫定
- C: 泛昔洛韦
- D: 恩替卡韦

答案：C

36. 糖皮质激素用于原发性肾上腺皮质功能不全宜选择的给药方法是

- A: 一般剂量长期疗法
- B: 隔日一次给药法
- C: 小剂量替代疗法
- D: 大剂量冲击疗法

答案：C

37. 防止耐药现象的发生，持续用药须有 12h 以上间歇期

- A: 哌唑嗪
- B: 硝酸甘油
- C: 依那普利
- D: 氨氯地平

答案：B

38. (2018 年真题) 可作为心血管不良事件一级和二级预防的药物是 ()

- A: 塞来昔布
- B: 阿司匹林
- C: 双氯芬酸
- D: 对乙酰氨基酚

答案：B

39. 属于孕激素类的是

- A: 甲地孕酮
- B: 他莫昔芬
- C: 睾酮
- D: 己烯雌酚

答案：A

40. 吡喹酮的抗虫作用首选用于

- A: 丝虫
- B: 牛肉绦虫
- C: 蛔虫
- D: 血吸虫

答案：D

41. 可用于治疗非霍奇金淋巴瘤的单克隆抗体是

- A: 西妥昔单抗
- B: 贝伐单抗
- C: 英夫利昔单抗
- D: 利妥昔单抗

答案：D

42. 大环内酯类抗生素()

- A: 红霉素
- B: 克拉霉素
- C: 万古霉素
- D: 克林霉素

答案：C

43. 连续使用应间隔 4h 以上

- A: 羟甲唑啉
- B: 麻黄碱
- C: 酚甘油滴耳液
- D: 赛洛唑啉

答案：A

44. (2020 年真题) 患者，女，72 岁。持续性心房颤动，为预防脑卒中，宜选用的药物是

- A: 氯吡格雷
- B: 华法林
- C: 奥美拉唑
- D: 双氯芬酸

答案：B

45. 叶酸与维生素 B12 联用治疗

- A: 溶血性贫血
- B: 小细胞低血红蛋白性贫血
- C: 再生障碍性贫血
- D: 巨幼细胞贫血

答案：D

46. 鲑降钙素对骨质疏松症进行治疗期间，为防继发性甲状旁腺功能亢进需要补充

- A: 维生素 D
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 铁剂
- D: 钙剂

答案：D

47. 用于疥疮和阴虱病的药物是()

- A: 硼酸
- B: 林旦
- C: 维 A 酸
- D: 过氧苯甲酰

答案：B

48. 某患者新诊断为退行性膝关节炎，既往有磺胺过敏史，不宜选用的非甾体抗炎药是（）

- A: 塞来昔布
- B: 吲哚美辛
- C: 双氯芬酸
- D: 布洛芬

答案：A

49. 主要用于青光眼急性发作短期控制的药物是()

- A: 布美他尼
- B: 依托塞米
- C: 依他尼酸
- D: 乙酰唑胺

答案：D

50. 全身性红斑狼疮宜用

- A: 泼尼松
- B: 倍他米松
- C: 氢化可的松
- D: 地塞米松

答案：A

51. 为阳离子表面活性剂，有广谱杀菌、抑菌作用，吸附在细菌胞壁后，改变其表面结构和渗透平衡，使胞浆内成分渗漏，高浓度时可使胞浆凝固，抑制细胞壁修复而呈杀菌作用，且不易产生耐药性的消毒防腐药是

- A: 聚维酮碘
- B: 氯己定
- C: 过氧乙酸
- D: 依沙吖啶

答案：B

52. 婴儿和哺乳期妇女禁用()作为泻药。

- A: 硫酸镁
- B: 酚酞
- C: 聚乙二醇 4000
- D: 乳果糖

答案：B

53. 属于 CYP3A4 底物 / 抑制剂，可能会增加他汀类药物肌肉不良反应危险性的是

- A: 利福平
- B: 烟酸
- C: 地高辛
- D: 红霉素

答案：D

54. 可与硝酸酯类药物发生相互作用的是

- A: 呋塞米
- B: 丙酸睾酮
- C: 坎利酮
- D: 伐地那非

答案：D

55. 患者，女，60岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊，塞来昔布胶囊，碳酸氢钠治疗

。

- A: 抑制肾小管对尿酸盐的重吸收，使尿酸排出增加
- B: 抑制黄嘌呤氧化酶，阻滞尿酸的生成
- C: 促进尿酸分解，将尿酸转化为溶解性好的尿囊素
- D: 抑制粒细胞浸润和白细胞趋化，减轻炎症症状

答案：D

56. 有类磺胺反应的NSAID是

- A: 阿司匹林
- B: 塞来昔布
- C: 吲哚美辛
- D: 对乙酰氨基酚

答案：B

57. 2 岁以下儿童腹泻，禁用的药品是()。

- A: 双八面体蒙脱石散
- B: 双歧三联活菌胶囊
- C: 地衣芽孢杆菌胶囊
- D: 洛哌丁胺片

答案：D

58. (2016 年真题) 用于治疗低磷血症的药物是

- A: 碳酸钙
- B: 葡萄糖
- C: 三磷酸腺苷
- D: 二磷酸果糖

答案：D

59. 以下属于胰高糖素样肽-1 受体激动剂的是

- A: 吡格列酮
- B: 瑞格列奈
- C: 利拉鲁肽
- D: 二甲双胍

答案：C

60. 与奥美拉唑-替硝唑合用的三联疗法治疗胃溃疡

- A: 红霉素
- B: 万古霉素
- C: 克拉霉素
- D: 克林霉素

答案：C

61. 亚胺培南西司他丁一般不宜用于

- A: 病原菌未查明严重感染
- B: 严重需氧菌与厌氧菌混合性感染
- C: 对其他药物耐药的革兰阴性杆菌感染
- D: 社区获得性感染

答案：D

62. 与其他抗真菌药无交叉耐药性的棘白霉素类抗真菌药是

- A: 氟胞嘧啶
- B: 阿糖胞苷
- C: 卡泊芬净
- D: 两性霉素

答案：C

63. 对胰岛素产生耐受者选用

- A: 格列本脲
- B: 二甲双胍
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 胰岛素

答案：A

64. 华法林应用过量可选用的拮抗药是

- A: 氨基己酸
- B: 维生素 K1
- C: 葡萄糖酸钙
- D: 鱼精蛋白

答案：B

65. 不明原因的腹痛、阑尾炎、胃肠道梗阻患者禁用()

- A: 聚乙二醇 4000
- B: 乳果糖
- C: 硫酸镁
- D: 甘油

答案：B

66. 皮肤念珠菌病可选用()

- A: 阿达帕林
- B: 酮康唑
- C: 维 A 酸
- D: 林旦霜

答案：B

67. 仅作为吸入给药的平喘药是()

- A: 特布他林
- B: 布地奈德
- C: 沙美特罗
- D: 沙丁胺醇

答案：C

68. 严重肝病时应减量慎用、肾功能减退时可按原治疗量使用的是

- A: 红霉素
- B: 青霉素
- C: 氟胞嘧啶
- D: 异烟肼

答案：A

69. 主要作用于革兰阴性菌的半合成青霉素是

- A: 匹氨西林
- B: 青霉素 V
- C: 美西林
- D: 苯唑西林

答案：C

70. 兰索拉唑属于

- A: H₂ 受体阻断药
- B: M 受体阻断药
- C: 胃泌素受体阻断药
- D: H⁺, K⁺-ATP 酶抑制剂

答案：D

71. (2020 年真题) 治疗难辨梭状芽孢杆菌引起的假膜性肠炎，宜选择的药物是

- A: 万古霉素
- B: 利奈唑胺
- C: 米诺环素
- D: 阿奇霉素

答案：A

72. 可用于静脉给药的胰岛素/胰岛素类似物是()

- A: 甘精胰岛素注射液
- B: 预混胰岛素注射液
- C: 普通胰岛素注射液
- D: 精蛋白锌胰岛素注射液

答案：C

73. 患者，男，45岁，因“咳嗽、咳痰1周，发热2天”入院，诊断为社区获得性肺炎，两次痰培养为金黄色葡萄球菌(MSRA)，适合选用的是

- A: 苜星青霉素
- B: 万古霉素
- C: 双氯西林
- D: 阿莫西林

答案：B

74. 对磺胺类药物过敏者可以选用的利尿剂是()

- A: 布美他尼
- B: 依托塞米
- C: 依他尼酸
- D: 乙酰唑胺

答案：C

75. 患者，男性，46岁，经常头痛，头晕近8年。2天来头痛加重，伴有恶心、呕吐送往急诊。查体：神志模糊，血压230/120mmHg。尿蛋白(++)，尿糖(+)。入院治疗，经处理，血压仍为202/120mmHg，且气急不能平卧，心率108次/分，早搏3次/分。两肺底有湿啰音。

- A: 在避光输液瓶中使用
- B: 紧急时可静脉注射
- C: 使用5%葡萄糖注射液配制后保存与应用不应超过24小时
- D: 可使用微量输液泵

答案：B

76. 竹红菌甲素属于

- A: 重金属元素及其化合物
- B: 补骨脂素及其衍生物
- C: 其他光敏剂
- D: 肾上腺皮质激素类

答案：C

77. 维生素 D 缺乏时会导致()

- A: 成人佝偻病
- B: 坏血病
- C: 脚气病
- D: 角膜软化症

答案：A

78. 属于嘌呤核苷合成酶抑制剂的是

- A: 吉西他滨
- B: 巯嘌呤
- C: 长春瑞滨
- D: 甲氨蝶呤

答案：B

79. 为治疗阴道滴虫病的首选药物是

- A: 吡喹酮
- B: 三苯双脒
- C: 乙胺嘧啶
- D: 甲硝唑

答案：D

80. 属于胆碱酯酶抑制药的是

- A: 石杉碱甲
- B: 金刚烷胺
- C: 司来吉兰
- D: 溴隐亭

答案：A

81. 长期慢性便秘者不宜长期大量使用的药物是

- A: 番泻叶
- B: 利那洛肽
- C: 欧车前
- D: 多库酯钠

答案：A

82. 下列药品中，属于酰胺类的脑功能改善及记忆障碍药是

- A: 胞磷胆碱
- B: 吡拉西坦
- C: 多奈哌齐
- D: 利斯的明

答案：B

83. 下列对孕激素作用的描述，哪一项是不正确的()

- A: 大剂量抑制卵巢排卵
- B: 抑制子宫平滑肌的收缩
- C: 促进女性性器官的发育成熟
- D: 促进乳腺腺泡发育，为哺乳做准备

答案：C

84. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1 期）伴出血。

- A: 克拉霉素
- B: 胶体果胶铋胶囊
- C: 硝苯地平缓释片
- D: 埃索美拉唑

答案：D

85. 糖皮质激素禁用于严重高血压患者是因为

- A: 水钠潴留
- B: 促进胃酸分泌及胃蛋白酶分解
- C: 抑制蛋白质合成
- D: 抑制免疫功能，只抗炎不抗菌

答案：A

86. 用于抗乙肝病毒的药物是

- A: 拉米夫定
- B: 西多福韦
- C: 扎那米韦
- D: 阿昔洛韦

答案：A

87. 下列关于单克隆抗体抗肿瘤药物的描述，错误的是

- A: 静脉滴注可致患者发生过敏样反应或其他超敏反应
- B: 优点是选择性“杀灭”，就是只对癌细胞起作用而对正常体细胞几乎没有伤害
- C: 对癌细胞和正常体细胞都有“杀灭”作用

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 贝伐单抗作用机制较为特殊，作用于血管内皮生长因子

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/887112102050010024>