

2024 河南省华龙区《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题大全含答案【考试直接用】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 抑制 HIV 整合酶的催化活性，可防止感染早期 HIV 基因组共价插入或整合到宿主细胞基因组上，该类药物是

- A: 非核苷类反转录酶抑制药
- B: 蛋白酶抑制药
- C: 核苷类反转录酶抑制药
- D: 整合酶抑制剂

答案：D

2. 患者女，55 岁。晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院，查体：138 / 90mmHg，心率 120 次 / 分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

- A: 6 天
- B: 8 天
- C: 2 天
- D: 4 天

答案：D

3. 因抑制 P-糖蛋白使地高辛浓度增加 70%~100%的是

- A: 硫酸镁
- B: 克拉霉素
- C: 呋塞米

D: 胺碘酮

答案：D

4. 作用更为持久和抑制新骨形成的作用极低，可长期滞留于骨组织中，半衰期最长可达 300 日的第二代钙代谢调节药是

A: 帕米膦酸二钠

B: 依替膦酸二钠

C: 阿仑膦酸钠

D: 唑来膦酸

答案：A

5. 属于 5-HT₂ 受体阻断剂的止吐药是 ()。

A: 阿瑞吡坦

B: 维生素 B

C: 托烷司琼

D: 甲氧氯普胺

答案：C

6. 用于各种原因引起的干咳，成人一次 10~15mg 的药物是

A: 右美沙芬

B: 地塞米松

C: 苯丙哌林

D: 可待因

答案：A

7. (2021 年真题) 影响熊去氧胆酸的吸收，不宜同时服用的药物 ()

A: 双歧杆菌三联活菌

B: 昂丹司琼

C: 利那洛肽

D: 氢氧化铝

答案: D

8. 替比夫定的作用靶点是

A: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶

B: 神经氨酸酶

C: 脱氧核糖核酸聚合酶

D: HIV-1 反转录酶

答案: C

9. 长期、单一应用 β

A: 支气管痉挛

B: 暂时性低血糖

C: 耐药性

D: 头痛

答案: C

10. 属于芳香化酶抑制剂，用于治疗乳腺癌

A: 卡莫氟

B: 甲氨蝶呤

C: 来曲唑

D: 喜树碱

答案: C

11. 育龄女性在无防护的性生活或避孕失败 72 小时内,宜使用的口服紧急避孕药是 ()

A: 炔雌醇去氧孕烯 (30g/150g)

B: 左炔诺孕酮 (1

C: 复方醋酸环丙孕酮 (35 μ g/2mg)

D: 十一酸睾酮 (40mg)

答案: B

12. 选择性抑制延髓咳嗽中枢，并具有微弱的阿托品样作用，适用于各种原因引起的无痰干咳的药物是

A: 福尔可定

B: 右美沙芬

C: 喷托维林

D: 苯丙哌林

答案: C

13. 无抗结核作用的是

A: 乙胺丁醇

B: 吡嗪酰胺

C: 异烟肼

D: 红霉素

答案: D

14. β -内酰胺类抗生素的抗菌机制是

A: 抑制细菌细胞壁的合成

B: 影响叶酸代谢

C: 抑制蛋白质合成的全过程

D: 影响胞浆膜的通透性

答案: A

15. 可用于配合防治肝性脑病的泻药为

- A: 甘油
- B: 酚酞
- C: 乳果糖
- D: 硫酸镁

答案：C

16. 具有较强的 M 受体阻断作用，能直接解除膀胱逼尿肌痉挛，改善膀胱储尿功能的药物是

- A: A 型肉毒毒素
- B: 西地那非
- C: 奥昔布宁
- D: 睾酮

答案：C

17. H₁ 受体拮抗剂的各项叙述，错误的是

- A: 可用于治疗变态反应性失眠
- B: 主要用于治疗变态反应性疾病
- C: 可用于治疗妊娠呕吐
- D: 主要代表药有法莫替丁

答案：D

18. 为高渗溶液，静脉给药后可提高血浆渗透压的药物是

- A: 螺内酯
- B: 甘油果糖
- C: 甘露醇
- D: 阿米洛利

答案：C

19. 对于高胆固醇血症造成高危心肌梗死的患者，作为一线治疗药物应选择()

- A: 烟酸
- B: 阿昔莫司
- C: 洛伐他汀
- D: 非诺贝特

答案: C

20. 关于替加环素的使用，错误的是

- A: 8 岁以下儿童禁用替加环素
- B: 肾功能不全或接受血液透析患者无需对替加环素进行剂量调整
- C: 替加环素抑制 CYP1A2、2C8、2C9、2C19、2D6 和 3A4 介导的药物代谢
- D: 替加环素是 P—gp 的底物

答案: C

21. 抢救糖尿病酮症酸中毒和高血糖高渗性昏迷患者宜选用

- A: 低精蛋白锌胰岛素
- B: 普通胰岛素
- C: 格列喹酮
- D: 二甲双胍

答案: B

22. 属于 IB 类钠通道阻滞剂的抗心律失常药是()

- A: 普鲁卡因胺
- B: 利多卡因
- C: 胺碘酮
- D: 维拉帕米

答案：B

23. 下列可引起糖尿病患者血糖过低，而对非糖尿病患者无降血糖作用的抗心律失常药物是

- A: 胺碘酮
- B: 普萘洛尔
- C: 美西律
- D: 地尔硫革

答案：B

24. 临床上常用于溶解取出的药物是

- A: 1%新霉素
- B: 4%硼酸甘油
- C: 5%碳酸氢钠
- D: 3%过氧化氢

答案：C

25. 甲氧苄啶联用环孢素使

- A: 白细胞减少风险增加
- B: 半衰期缩短
- C: 肾毒性增加
- D: 抗凝作用增强

答案：C

26. 适用于磺酰脲类降糖药治疗不理想的 2 型糖尿病患者的药物是

- A: 骨化三醇
- B: 葡萄糖酸钙
- C: 利拉鲁肽

D: 瑞格列奈

答案: D

27. (2020 年真题) 患者，女，26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺素(FT3、FT4)增高、促甲状腺素(TSH)降低，诊断为甲状腺功能亢进症。医师处方给予抗甲状腺药治疗。

A: 甲巯咪唑

B: 普萘洛尔

C: 碳酸锂

D: 丙硫氧嘧啶

答案: A

28. 使用羟甲唑啉滴鼻液期间，可能发生的不良反应是

A: 一过性针刺感

B: 心率加快

C: 流泪

D: 鼻黏膜充血

答案: B

29. 止泻药()

A: 地芬诺酯

B: 甘油

C: 硫酸镁

D: 乳果糖

答案: A

30. 可引起性欲减退的是

- A: 哌唑嗪
- B: 普适泰
- C: 非那雄胺
- D: 十一酸睾酮

答案：C

31. 下列药物中不用于抗心律失常的是

- A: 胺碘酮
- B: 比索洛尔
- C: 单硝酸异山梨酯
- D: 美西律

答案：C

32. 下述药物中长期使用易产生耐受性的是()

- A: 白三烯受体阻断药
- B: M 受体拮抗剂
- C: β
- D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案：C

33. 起效缓慢,可增加心力衰竭和女性骨折风险的口服抗糖尿病药物是
()

- A: 艾塞那肽
- B: 利拉鲁肽
- C: 罗格列酮
- D: 瑞格列奈

答案：C

34. 抑制血管平滑肌和心肌细胞 Ca

- A: 硝苯地平
- B: 利血平
- C: 肼屈嗪
- D: 氢氯噻嗪

答案：A

35. 吗啡的镇痛作用机制主要是

- A: 加重呼吸抑制
- B: 增强镇静作用
- C: 诱发精神错乱
- D: 增强止痛效果

答案：B

36. 毛花苷丙经弱碱水解去乙酰化的产物是

- A: 地高辛
- B: 去乙酰毛花苷（西地兰 D）
- C: 毛花苷丙（西地兰 C）
- D: 洋地黄毒苷

答案：B

37. 属于抗雌激素类的抗肿瘤药是

- A: 炔雌醇
- B: 他莫昔芬
- C: 阿那曲唑
- D: 氟他胺

答案：B

38. 下列哪种药物长期使用将引起药物性鼻炎()

- A: 抗组胺药
- B: 肥大细胞膜稳定剂
- C: 糖皮质激素
- D: 减鼻充血药

答案：D

39. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药(具体不详)治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次 / 日。

- A: 不会导致 Q~T 间期延长及室性心律失常
- B: 不会促进乙酰胆碱的释放
- C: 不会导致锥体外系反应
- D: 不会导致催乳素增多

答案：B

40. 常引起体位性低血压的是

- A: 非那雄胺
- B: 普适泰
- C: 十一酸睾酮
- D: 哌唑嗪

答案：D

41. (2016 年真题) 属于胆固醇吸收抑制剂的是

- A: 依折麦布
- B: 阿托伐他汀

C: 非诺贝特

D: 阿昔莫司

答案: A

42. 对抗新产生的血栓应首选

A: 右旋糖酐

B: 尿激酶

C: 肝素

D: 华法林

答案: B

43. 急性室性心律失常可选用

A: 阿托品

B: 硝苯地平

C: 美西律

D: 利多卡因

答案: D

44. 格列本脲的作用特点是

A: 直接抑制肝糖原分解和糖原异生

B: 提高靶细胞对胰岛素的敏感性

C: 增强胰岛素的作用

D: 抑制胰高血糖素的分泌

答案: A

45. (2020 年真题) 抗血小板药西洛他唑属于

A: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂

B: 整合素受体阻断剂

C: 维生素 K 拮抗剂

D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案：D

46. (2021 年真题) 作为大手术、外伤或脓毒血症引起的严重肾功能衰竭以及急慢性肾功能衰竭患者肠外营养支持的药物是 ()

A: 丙氨酰谷氨酰胺注射液

B: 赖氨酸注射液

C: 复方氨基酸注射液 (18AA)

D: 复方氨基酸注射液 (9AA)

答案：D

47. (2018 年真题) 碳酸钙用于肾衰竭患者降低血磷时, 适宜的服药时间是 ()

A: 餐中

B: 清晨或睡前

C: 餐后 2h

D: 餐前即刻

答案：A

48. 强心苷类中毒的症状不包括

A: 嗜睡

B: 红-绿、蓝-黄辨认异常

C: 心律失常

D: 心肌强力收缩

答案：D

49.（2017 年真题）主要降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是（）

- A: 利血平
- B: 依折麦布
- C: 阿昔莫司
- D: 瑞舒伐他汀

答案：D

50.（2019 年真题）关于右美沙芬药理作用及临床评价的说法，正确的是（）

- A: 口服吸收缓慢，主要经肝脏代谢，作用时间长
- B: 主要用于干咳，但左旋右美沙芬有镇痛作用
- C: 镇咳作用弱于可待因
- D: 通过阻断肺-胸膜的牵张感受器产生的肺迷走神经反射而起到镇咳作用

答案：B

51.（2021 年真题）属于时间依赖型抗菌药物，抗菌谱窄，仅对需氧革兰阴性菌有（）

- A: 阿米卡星
- B: 头孢他啶
- C: 氨苄西林
- D: 氨基曲南

答案：D

52. 弱效（使 LDL-ch 水平降低 $<30\%$ ）的他汀类调血脂药

- A: 小剂量氟伐他汀
- B: 依折麦布

C: 小剂量阿托伐他汀

D: 大剂量阿托伐他汀

答案: A

53. (2018 年真题) 关于钙通道阻滞剂 (CCB 类) 药物的说法, 错误的是 ()

A: CCB 类对冠状动脉痉挛所致的变异型心绞痛无效

B: 对既往有脑卒中病史的老年高血压患者, 优先选择 CCB 类降压药

C: 红霉素可显著增加硝苯地平或非洛地平的生物利用度

D: CCB 类主要扩张小动脉, 对小静脉和毛细血管作用较小, 可导致下肢或脚踝水肿

答案: A

54. 属于雌激素受体拮抗剂的抗肿瘤药是

A: 他莫昔芬

B: 丙酸睾酮

C: 炔雌醇

D: 阿那曲唑

答案: A

55. 在应用螺内酯后应用哪种氨基酸可出现严重并可致命的高钾血症

A: 苯丙氨酸

B: 谷氨酸

C: 色氨酸

D: 精氨酸

答案: D

56. 其缓释片剂应与食物同服的是

- A: 红霉素
- B: 阿奇霉素
- C: 氟曲南
- D: 克拉霉素

答案：D

57. 需要皮下注射的糖尿病治疗药物是

- A: 阿卡波糖
- B: 艾塞那肽
- C: 那格列奈
- D: 二甲双胍

答案：B

58. 维生素 K 参与下列哪些凝血因子活化()

- A: II、VII 因子
- B: VII、XI、VII、IX 因子
- C: II、VII、IX、X 因子
- D: II、VIII、XI、IV 因子

答案：C

59. 对伴有大量痰液并阻塞呼吸道的病毒性感冒患者，在服用氨溴索的同时，不宜联合应用的药品是

- A: 利巴韦林
- B: 感冒颗粒
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 右美沙芬

答案：D

60. (2015 年真题) 属于 A 型单胺氧化酶抑制剂的是 ()。

- A: 文拉法辛
- B: 阿米替林
- C: 氟西汀
- D: 吗氯贝胺

答案: D

61. 假膜性肠炎或食物中毒应首选的微生物制剂是 ()

- A: 粪肠球菌
- B: 酪酸菌
- C: 双歧三联活菌
- D: 枯草杆菌

答案: B

62. 防止急性血栓形成的首选药物是

- A: 香豆素类
- B: 维生素 B12
- C: 维生素 K1
- D: 肝素

答案: D

63. 人体主要的热能来源是

- A: 葡萄糖
- B: 维生素
- C: 氨基酸
- D: 果糖

答案: A

64. 属于抗孕激素药，用于终止早孕的是

- A: 甲地孕酮
- B: 米非司酮
- C: 黄体酮
- D: 左炔诺孕酮

答案：B

65. 属于钙通道阻滞剂，静脉注射用于终止阵发性室上性心动过速的是
()

- A: 普鲁卡因胺
- B: 苯妥英钠
- C: 利多卡因
- D: 维拉帕米

答案：D

66. 干扰核酸生物合成的药物是 ()

- A: 高三尖杉酯碱
- B: 顺铂
- C: 多柔比星
- D: 氟尿嘧啶

答案：D

67. 钾离子竞争性酸抑制剂的作用机制是

- A: 竞争性拮抗组胺与胃壁细胞上的 H₂受体结合
- B: 通过二硫键与质子泵的巯基呈不可逆性的结合
- C: 通过竞争胃壁细胞膜腔面的钾离子来发挥作用
- D: 抑制乙酰胆碱 M 受体

答案：C

68. 与氯吡格雷合用，竞争 CYP2C19，使用氯吡格雷患者血栓不良反应事件增多的药物是

- A: 雷贝拉唑
- B: 奥美拉唑
- C: 西咪替丁
- D: 泮托拉唑

答案：B

69. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食，增强运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片 20mg / d 治疗。

- A: 100mg
- B: 40mg
- C: 20mg
- D: 80mg

答案：D

70. 对铜绿假单胞菌作用较强的头孢菌素是()

- A: 头孢拉定
- B: 头孢唑林
- C: 头孢噻吩
- D: 头孢哌酮

答案：D

71. 可用于治疗非霍奇金淋巴瘤的单克隆抗体是

- A: 贝伐单抗
- B: 利妥昔单抗

C: 英夫利昔单抗

D: 西妥昔单抗

答案: B

72. (2018 年真题) 可用于治疗非何杰金 (非霍奇金) 淋巴瘤的单克隆抗体是 ()

A: 利妥昔单抗

B: 西妥昔单抗

C: 曲妥珠单抗

D: 贝伐珠单抗

答案: A

73. 基因重组产品, 与天然内源性红细胞生成素作用相似的是 ()

A: 叶酸

B: 尿激酶

C: 链激酶

D: 重组人促红素

答案: D

74. 外耳道红肿局部治疗可选用 ()

A: 赛洛唑啉

B: 伪麻黄碱

C: 2% 酚甘油

D: 3% 硼酸乙醇

答案: C

75. 特布他林的平喘作用维持时间是

A: 3~5 分钟

B: 10~12 小时

C: 4~6 小时

D: 10~20 分钟

答案：C

76. 下列属于重组人促红素的禁忌证的是()

A: 低血压

B: 中性粒细胞减少

C: 难以控制的高血压

D: 心律失常

答案：C

77. 氯化钾的禁忌证是

A: 急、慢性肾功能不全

B: 应用强心苷类药

C: 妊娠期高血压疾病

D: 急性脱水

答案：A

78. 不可用于治疗白细胞减少的药物是

A: 腺嘌呤

B: 利可君

C: 利伐沙班

D: 糖皮质激素

答案：C

79. 可用于烧伤及伤后感染的是

A: 磺胺甲噁唑

- B: 磺胺嘧啶
- C: 磺胺米隆
- D: 柳氮磺吡啶

答案：C

80. 用于功能性子宫出血、妊娠早期先兆流产、习惯性流产的是

- A: 硝苯地平
- B: 米非司酮
- C: 绒促性素
- D: 噻嘧啶

答案：C

81. 维生素 A 的适应证不包括

- A: 夜盲症
- B: 甲状旁腺功能不全引起的低钙血症
- C: 角膜软化
- D: 干眼病

答案：B

82. 属于阴道局部用药的是

- A: 阿霉素
- B: 地屈孕酮
- C: 环磷酰胺
- D: 聚甲酚磺醛

答案：D

83. 对脑血管扩张作用较强的药物是()

- A: 尼莫地平

B: 硝苯地平

C: 非洛地平

D: 尼索地平

答案：A

84. 属于胆固醇吸收抑制剂的是()。

A: 阿托伐他汀

B: 非诺贝特

C: 依折麦布

D: 阿昔莫司

答案：C

85. 可增加溶血性尿毒症的发生危险的是

A: 氯丙嗪

B: 他莫昔芬

C: 维生素 C

D: 红霉素

答案：B

86. 可用于各种类型癫痫的药物是

A: 乙琥胺

B: 阿司匹林

C: 丙戊酸钠

D: 保泰松

答案：C

87. 较常引起外周神经炎的抗癌药是

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 巯嘌呤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/887132166046010024>