

2024 年福建省延平区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试真题【模拟题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 可引起血清尿素氮增高的是

- A: 严重肝病
- B: 急性胰腺炎
- C: 胃溃疡
- D: 肾衰竭

答案：D

2. （2019 年真题）患者，女，67 岁，出现认知功能障碍 5 年诊断为阿尔茨海默病，予以美金刚治疗。下列药物中，可增加美金刚血药浓度的是

- A: CYP3A4 抑制剂
- B: 氯化铵
- C: 碳酸氢钠
- D: CYP2D6 抑制剂

答案：C

3. 患者于 1 周前无诱因出现咳嗽，咳嗽为阵发性，痰少，呈白色黏液性，不易咳出，同时出现发热，体温多在夜间升高，38℃左右，无畏冷、寒战、胸痛、咳血等，于卫生院治疗后，未见好转，并有气喘、气促，活动后呼吸困难等症状。入院治疗诊断为：肺炎。

- A: 医疗机构从业人员
- B: 60 岁上的老人

C: 3 岁以上儿童

D: 慢性病患者及体弱多病者

答案: C

4. 老年人使用可导致甲状腺功能异常、肺毒性或 Q—T 间期延长，不宜作为心房颤动一线用药的是

A: 地高辛

B: 福辛普利

C: 胺碘酮

D: 美托洛尔

答案: C

5. 患者，女，24 岁，患有缺铁性贫血并伴有慢性腹泻，实验室检查：Hb55g/L，血清铁 12 μg/L，首选的治疗方案是()

A: 静脉滴注铁剂

B: 雄性激素治疗

C: 注射维生素 B

D: 口服铁剂及维生素 C

答案: A

6. 毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速作出准确判断，及时采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

A: 吸氧

B: 催吐、洗胃

C: 静脉补液

D: 导泻与洗肠

答案：B

7. 关于胃黏膜保护剂胃舒平的服药方式，正确的是

- A: 餐后服用
- B: 宜多饮水，减轻刺激
- C: 直接吞咽
- D: 餐前服用，充分咀嚼后咽下

答案：D

8. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热 (39.1℃)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查，T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ (参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$)，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 分泌性腹泻
- B: 动力性腹泻
- C: 消化不良性腹泻
- D: 感染性腹泻

答案：D

9. 关于癌症疼痛患者止痛药使用原则的说法，错误的是()

- A: 按阶梯给药
- B: 疼痛时用药，不痛时不需用药
- C: 提倡无创给药方式，尽量口服
- D: 应个体化用药

答案：B

10. 患儿，女，4岁半。身高110cm，体重15kg。一天前发热（39.1℃），咽喉痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗，发病20h左右出现腹泻，约2~5h，一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐1次。体格检查：T38.8℃，P118次/分，R28次/分。咽位充血，出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \sim 10 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 每次腹泻后均要少量多次喂水，直至腹泻停止？
- B: 若症状不能改善，可及时加用诺氟沙星？
- C: 若患儿腹泻加重，可口服自制补液盐进行补液？
- D: 应给予少量、多次、清淡饮食？

答案：B

11. 因胰腺功能不全引起的消化不良性腹泻适宜选用

- A: 胃蛋白酶
- B: 胰酶
- C: 双八面体蒙脱石
- D: 碳酸氢钠

答案：B

12. 肾素抑制剂

- A: 依普利酮
- B: 阿米洛利
- C: 阿利吉仑
- D: 雷米普利

答案：C

13. 舒肝丸与甲氧氯普胺合用

- A: 两者合用作用相反，互相降低药效
- B: 合用后增加毒性，出现药物中毒
- C: 合用抑制呼吸，易致呼吸衰竭
- D: 合用后抑制后者吸收，降低疗效

答案：A

14. 从事药学服务的药师应具备沟通能力。此项要求的重要性不是

- A: 可杜绝投诉事件
- B: 可提高公众对药师的认知度
- C: 是药师实施药学服务的基础
- D: 可使患者获得有关用药指导

答案：A

15. 归属于药历“患者基本情况”内容的是

- A: 医保和费用支付情况
- B: 联合用药
- C: 临床诊断
- D: 主要实验室检查数据

答案：A

16. 有关抗菌药物的局部应用，说法错误的是

- A: 对于全身给药难以到达的感染部位，可局部加用抗菌药物
- B: 眼部感染应首选眼药水滴定治疗
- C: 耳部革兰阴性菌感染应首选氨基糖苷类药物局部滴耳
- D: 青霉素类、头孢菌素类药物不适宜局部应用

答案：C

17. 必须立即用清水冲洗至少 5 分钟的是

- A: 毛发被毒物污染
- B: 眼内污染毒物
- C: 皮肤污染酚类毒物
- D: 眼内进入固体腐蚀性颗粒

答案：B

18. IV 级临床研究的结论或 II、III 级临床研究的推论属于

- A: C 级
- B: E 级
- C: B 级
- D: D 级

答案：A

19. 患者，男，72 岁，以“间断发热、纳差、精神抑郁半年，再发高热 1 天”为主诉入院，既往体健，无高血压、糖尿病、冠心病史。入院时查体：T36.9℃，P88 次 / 分，R22 次 / 分，BP112 / 77mmHg，可触及颈部、锁骨上、腋下多部位浅表淋巴结肿大。经实验室检查、影像学检查，确诊为非霍奇金淋巴瘤。

- A: 抗肿瘤药物选择在每个疗程的第一天给药
- B: 根据患者的体重计算抗肿瘤药物给药剂量
- C: 抗肿瘤药物均采用静脉给药
- D: 每 21 天为 1 个疗程

答案：B

20. 以下临床联合用药中，药物相互作用主要影响药效学的是

- A: 维生素 C 与多潘立酮同服吸收减少
- B: 昆布片同服异烟肼导致药效降低

C: 四环素同服硫酸亚铁降低疗效

D: 氢氯噻嗪减弱甲苯磺丁脲的降糖作用

答案：D

21. 氨基糖苷类药物引起的典型药源性疾病是

A: 胃肠道反应

B: 神经系统疾病

C: 血液系统疾病

D: 肌病

答案：B

22. 口服可治疗肝豆状核变性病的是

A: 依地酸钙钠

B: 二巯丙醇

C: 青霉胺

D: 二巯丁二钠

答案：C

23. 引起"肾病患者清除减慢，服用呋喃妥因血药浓度升高，可引起周围神经炎"是

A: 性别

B: 遗传因素

C: 年龄

D: 基础疾病

答案：D

24. 患者，男，57 岁，化验结果：TC4.6mmol/L(参考值 <5.2mmol/L)，TG11.0mmol/L(参考值 0.56——1.70mmol/L) 尿酸 508umol/L(参考值 <420umol/L)，应首选的调脂药物为()

- A: 考来烯胺
- B: 依折麦布
- C: 非诺贝特
- D: 烟酸

答案：C

25. 不可随意间断用药、停药、换药

- A: 规律
- B: 适量
- C: 早期
- D: 联合

答案：A

26. 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg。1 天前开始发热，体温 39.1℃，咽部稍痛，无咳嗽、无吐泻。家长在家选用退热药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，每间隔 2~3 小时排 1 次大便，量少，黄色黏液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，咽部微充血，出现轻微脱水症状；双肺呼吸音清，腹平软，肝、脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9 / L$ ，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 感染性腹泻
- B: 动力性腹泻
- C: 分泌性腹泻
- D: 消化不良性腹泻

答案：A

27. 属于 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂的是

- A: 文拉法辛
- B: 阿米替林
- C: 氟西汀
- D: 吗氯贝胺

答案：A

28. 肌肉注射给药的外文缩写是

- A: ivgtt
- B: im
- C: i.h
- D: iv

答案：B

29. 患者，女，62 岁，医师处方如下：患者：××X，性别：女，年龄：62 岁。临床诊断：2 型糖尿病高血压 2 级高脂血症 PCI 术后。

- A: 氯吡格雷
- B: 二甲双胍
- C: 氨氯地平
- D: 阿卡波糖

答案：A

30. 属于药物信息服务最重要的咨询服务方法步骤是

- A: 形成答案并以口头形式提供给询问者
- B: 对文献进行评价、分析和整理
- C: 确立有效的检索方法、查阅文献
- D: 对问题进行确定并归类

答案：B

31. 患者，男，30 岁，因反复发作呼吸困难，咳嗽、胸闷入院。每年春季发作，持续 3 年，查体：双肺满布哮鸣音，HR80 次 / 分，律齐，无杂音。

- A: 阻塞性肺气肿
- B: 支气管哮喘
- C: 慢性支气管炎合并肺气肿
- D: 慢性支气管炎

答案：B

32. II 期临床试验很难发现"低于 1%发生频率"的不良反应，缘于

- A: 观察时间短
- B: 考察不全面
- C: 病例数目少
- D: 管理漏洞

答案：C

33. 应用利托那韦等蛋白酶抑制剂后，需要多饮水的主要目的是

- A: 防止形成尿道结石或肾结石
- B: 加快排泄，减小肾毒性
- C: 防止电解质紊乱
- D: 防止腹泻导致的脱水

答案：A

34. 对于铁剂的使用，正确的为

- A: 为迅速纠正患者贫血症状，初始治疗用大剂量
- B: 口服铁剂宜选用 3 价铁
- C: 待血红蛋白恢复正常后，即可停止服用

D: 碳酸氢钠抑制铁剂吸收

答案：D

35. 患者，男，58 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀片 20mg qdpo 等药物治疗。

A: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片

B: 停用瑞格列奈片

C: 停用二甲双胍肠溶片

D: 停用阿托伐他汀钙片

答案：C

36. 患者，女，50 岁，体重 60kg，因咳嗽、咳痰伴发热就诊，查体：体温 38.5℃、双肺可闻及湿性啰音，查血常规提示：WBC 12.4×10

A: 55ml/min

B: 47ml/min

C: 70ml/min

D: 65ml/min

答案：B

37. (2016 年真题) 医师书写处方时经常使用外文缩写，药师在指导用药时需要准确掌握和解释

A: 适量

B: 右眼

C: 左眼

D: 立即

答案：B

38. 根除幽门螺杆菌治疗的首选抗菌药是

- A: 呋喃唑酮
- B: 左氧氟沙星
- C: 四环素
- D: 阿莫西林

答案：D

39. 脑梗死的分期，急性期

- A: 1~6 个月
- B: 15 天
- C: 2~3 个月
- D: 1 个月内

答案：D

40. 患者，男，64 岁，因“右足肿痛”就诊。查体：右足第一跖趾关节红肿、触痛明显。化验结果：血尿酸 $588.1 \mu\text{mol/L}$ 。诊断为“急性痛风性关节炎”。患者既往有高血压、高胆固醇血症、冠心病病史，目前正服用氢氯噻嗪片 25mgqd、美托洛尔缓释片 47.5mgqd、赖诺普利片 20mgqd、辛伐他汀片 10mgqd、阿司匹林肠溶片 100mgqd。

- A: 氢氯噻嗪和阿司匹林
- B: 美托洛尔和赖诺普利
- C: 氢氯噻嗪和辛伐他汀
- D: 美托洛尔和辛伐他汀

答案：A

41. 患者，男，58 岁，有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史，2 年前接受冠脉支架植入术。近日，患者先后在心内科、消化科、骨科就诊，开具药品如下：

- A: 阿托伐他汀钙用于冠心病的治疗，需长期规律用药
- B: 如大便次数规律（如每日 1 次），聚乙二醇 4000 散可按需使用
- C: 美托洛尔会影响阿司匹林的抗血小板活性，应停用
- D: 同时使用双氯芬酸钠与阿司匹林会增加消化道出血风险，两药不宜合用

答案：C

42. 对某些患者应教会正确量取内服液体制剂，是针对

- A: 交代药品贮存条件与方法
- B: 交代用药注意事项
- C: 交代药物的用量
- D: 交代用药途径及用药方法

答案：C

43. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。

日前体检：身高 160cm，体重 70kg；白细胞 $8.0 \times 10^9/L$

- A: 非诺贝特
- B: 格列齐特
- C: 辛伐他汀
- D: 二甲双胍

答案：D

44. 处方中外文缩写 mcg 代表（）

- A: 餐后
- B: 微克
- C: 必要时
- D: 临睡时

答案：B

45. 患者，男，28 岁，主诉：发作性四肢抽搐 2 年，加重 2 月，化验结果显示 TSH 增高，FT3，FT4 减低，临床诊断为甲状腺功能减退，欲使用左甲状腺素钠治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是

- A: 100mg，qd，睡前顿服
- B: 100mg，qd，晚餐后顿服
- C: 100 μ g，qd，早餐前半小时，顿服
- D: 100 μ g，qd，早餐后半小时，顿服

答案：C

46. 医师咨询"他汀类药物合用伊曲康唑或环丙沙星等"，属于

- A: 药物相互作用
- B: 新药信息
- C: 给药途径
- D: 禁忌证

答案：A

47. 大剂量或连续使用顺铂可导致

- A: 直接肾毒性
- B: 肾小管阻塞
- C: 不可逆性肾小管坏死
- D: 肾间质纤维化

答案：C

48. 治疗胃病的药物

- A: 硝酸甘油
- B: 去氨加压素
- C: 胃黏膜保护剂

D: 甘草合剂

答案: C

49. I 期临床试验是初步的临床药理学及人体安全性评价。试验对象主要为健康受试者，样本数一般只有

A: 12~13 例

B: 20~30 例

C: 20~24 例

D: 10~18 例

答案: B

50. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A: 慢乙酰化者服异烟肼半衰期延长至 2~4.5 小时

B: 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重的中枢神经系统疾病

C: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停

D: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮，药理效应增强

答案: B

51. 使用抗过敏药治疗荨麻疹的患者，拟进行变应原皮试的时间是在

A: 停用所用药物之后

B: 停用抗过敏药 36~48 小时后

C: 停用抗过敏药之后

D: 停用抗过敏药 48~72 小时后

答案: D

52. 有助于药师明确被问询问题的咨询服务方法步骤是

- A: 对问题进行确定并归类
- B: 确立有效的检索方法、查阅文献
- C: 对文献进行评价、分析和整理
- D: 形成答案并以口头形式提供给询问者

答案：C

53. 可用于治疗夜盲症的药物是

- A: 复合维生素 B
- B: 维生素
- C: 维生素 A
- D: 维生素 C

答案：C

54. 患者，男，60 岁，呈典型的“面具脸”“慌张步态”及“写字过小征”表现，确诊为帕金森病患者同时患有消化道溃疡，不宜选用的治疗药物是

- A: 多奈哌齐
- B: 氟西汀
- C: 卡马西平
- D: 左旋多巴

答案：D

55. 左旋多巴治疗震颤麻痹时宜减少食用的是

- A: 脂肪
- B: 蛋白质
- C: 食醋
- D: 食盐

答案：B

56. (2017 年真题) 下列药物使用方式, 正确的是 ()

- A: 酵母片在餐后整片用水送服
- B: 氧氟沙星滴眼液打开使用后, 继续使用 3 个月
- C: 乙酰半胱氨酸泡腾片用 100ml 温开水浸泡溶解后服用
- D: 硝酸甘油片在心绞痛发作的紧急情况下嚼碎用冰水送服

答案：C

57. (2015 年真题) 用于紧急避孕药的药物是 ()。

- A: 甲睾酮
- B: 黄体酮
- C: 左炔诺孕酮
- D: 罗格列酮

答案：C

58. (引起药源性肾病的药物) 大剂量或连续使用顺铂可导致

- A: 直接肾毒性
- B: 不可逆性肾小管坏死
- C: 肾小管阻塞
- D: 肾间质纤维化

答案：B

59. 高血压合并冠心病, 偶发窦性心动过速宜选用的药物是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 非洛地平
- C: 缬沙坦
- D: 美托洛尔

答案：D

60. 患者，男，55 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，医师建议首先改变生活方式（控制饮食等）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀 20mg/d 治疗。

A: 20mg

B: 80mg

C: 60mg

D: 40mg

答案：B

61. 餐后服用可以增加吸收的药物是（）

A: 头孢拉定胶囊

B: 磷酸铝凝胶

C: 左甲状腺素钠片

D: 维生素 B2 片

答案：D

62. 使尿液呈碱性，可增加抗菌活性、减轻肾毒性，食醋则会加重其毒性作用的是

A: 头孢菌素类

B: 林可霉素类

C: 氨基糖苷类

D: 大环内酯类

答案：C

63. 有机磷中毒的特效解毒剂是

A: 乙酰胺

B: 烯丙吗啡

C: 氯磷定

D: 维生素 K1

答案: C

64. 属于非麻醉性强效镇咳药，起效迅速，抑制外周传入神经，也可部分抑制咳嗽中枢的药物的是

A: 苯丙哌林

B: 右美沙芬

C: 羧甲司坦

D: 可待因

答案: A

65. 在现代社会，药学信息的收集已不困难，但很容易出现信息量大但杂乱无章和重复的现象。药师必须通过专业的药学信息检索，对众多良莠不齐的药物信息进行客观、合理的分析评价，去伪存真，挑出有专业证据的高质量信息，指导临床合理用药。

A: 药物事实与比较

B: 美国药典药物信息

C: 马丁代尔药物大典

D: 医师案头参考

答案: C

66. (2019 年真题) 患者，女，35 岁，复杂部分发作性癫痫病史 12 年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6 个月前因癫痫控制不佳提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊，患者同时患有 2 型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素 B。

- A: 卡马西平
- B: 二甲双胍
- C: 丙戊酸钠
- D: 阿卡波糖

答案：A

67. 以下血浆脂质水平检查结果中，不能判断为高脂血症的是

- A: 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-ch) 高于同年龄正常值
- B: 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-ch) 高于同年龄正常值
- C: 三酰甘油(TG) 高于同年龄正常值
- D: 总胆固醇(Tc) 高于同年龄正常值

答案：C

68. 头痛，伴颈部僵硬、恶心、发热和全身痛，可能有

- A: 脑膜炎
- B: 脑肿瘤
- C: 脑血管意外
- D: 动脉瘤

答案：A

69. 患者，男，65 岁，诊断为持续性心房纤颤，医生处方胺碘酮和华法林治疗。患者既往有高血压、糖尿病、冠心病和高脂血症，目前正在服用贝

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

那普利、美托洛尔、二甲双胍、阿卡波糖、辛伐他汀等药物治疗。根据患者用药情况,药师提出的合理化药物治疗建议,不包括()

A: 因为胺碘酮和贝那普利存在临床意义的相互作用,建议换成氨氯地平 CCB 降压药

- B: 胺碘酮能增加华法林的抗凝活性,在逐渐降低胺碘酮剂量的时候,注意随时根据 INR 值调整华法林的剂量
- C: 胺碘酮可以显著抑制 CYP2D6,减慢美托洛尔的代谢,应该根据患者心率和血压调整美托洛尔剂量
- D: 患者在复律成功后,尽可能以最小的胺碘酮剂量维持治疗

答案: A

70. 阿糖腺苷属于

- A: 抗过敏药
- B: 抗病毒药
- C: 抗肿瘤药
- D: 抗真菌药

答案: B

71. 可能导致因心力衰竭和呼吸衰竭而死亡的是的是

- A: 蛋白同化激素
- B: 精神刺激剂
- C: 药品类易制毒化学品
- D: 肽类激素

答案: C

72. 在与患者进行沟通的过程中,切忌的事项是

- A: 可提供一些宣传资料
- B: 尽量提供更多的信息
- C: 尽量避免使用专业术语
- D: 认真聆听

答案: B

73. 癫痫持续状态的好发年龄段是

- A: 65 岁以上
- B: 6 岁以内
- C: 55 岁以上
- D: 1 岁以内及 65 岁以上

答案：D

74. 荨麻疹患者常出现

- A: 血小板增多
- B: 嗜酸性粒细胞增多
- C: 血红蛋白减少
- D: 中性粒细胞增多

答案：B

75. 百日咳的临床表现是

- A: 可有低热或高热，清瘦、轻咳、盗汗，有黄绿色痰
- B: 多为轻咳或干咳，偶见少量薄白痰，并伴有背痛、发热、头痛、咽喉痛
- C: 多发生于儿童，为阵发性剧烈痉挛性咳嗽伴有鸡鸣样吸气吼声，病程可达 2~3 个月
- D: 有慢性咳嗽，伴有大量脓痰及反复咯血

答案：C

76. 下列不属于鼻黏膜肿胀的用药与健康提示内容是

- A: α 受体激动剂口服一般连续使用不超过 2 周
- B: 妊娠及哺乳期妇女禁用肾上腺素受体激动剂
- C: 驾车司机、高空作业者、精密仪器操作者在服用或滴药后 4 小时内不宜从事本职工作

D: 应用肾上腺素 α 受体激动剂时，应采用间断给药

答案：A

77. 患者，男，体检发现血清尿素氮升高、血肌酐升高，其他生化指标正常，该患者最可能患有

A: 心脏疾病

B: 肝脏疾病

C: 肾脏疾病

D: 血液疾病

答案：C

78. 可减轻鼻窦、鼻腔黏膜血管充血，解除鼻塞症状，有助于保持咽鼓管和窦口通畅的鼻黏膜血管收缩药是

A: 颠茄浸膏片

B: 菠萝蛋白酶

C: 阿司匹林

D: 伪麻黄碱

答案：D

79. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热 (39.1°C)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查， $T38.8^{\circ}\text{C}$ ，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/\text{L}$ (参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$)，粪便镜检可见红、白细胞。

A: 每次腹泻后均要少量多次喂水，直至腹泻停止

B: 应给予少量、多次、清淡饮食

C: 若症状不能改善，可及时加用诺氟沙星

D: 若患儿腹泻加重，可口服自制补液盐进行补液

答案：C

80. 患者，男，58 岁，体重 68kg，高血压病史 5 年。5 天前出现咳嗽、咳痰，伴发热，入院查体 BP：120/80mmHg，T38.9℃。化验结果：白细胞计数 $14.6 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 86%。胸片示：右下肺纹理增粗，诊断为社区获得性肺炎，青霉素皮试阳性。

A: 莫西沙星

B: 头孢吡肟

C: 氨苄西林

D: 阿莫西林

答案：A

81. 沿静脉出现迂回线状色素沉着的是

A: 博来霉素

B: 氟尿嘧啶

C: 白消安

D: 柔红霉素

答案：B

82. 患者，48 岁，胸痛部位在心前区，为压迫性疼痛，发作数秒钟，含服硝酸甘油 1~2 秒疼痛即消失。

A: 左旋氨氯地平

B: 曲美他嗪

C: 普伐他汀

D: 哌唑嗪

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/887136045050010024>