

2024 河北省双滦区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题大全附答案（预热题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 实施静脉注射给药时，不宜选用 0.9% (g / ml) 氯化钠注射液做溶媒溶解的药品是

- A: 氟罗沙星
- B: 头孢菌素
- C: 苯妥英钠
- D: 阿昔洛韦

答案：A

2. 比沙可啶适用于

- A: 习惯性便秘
- B: 低张力性便秘
- C: 急性便秘
- D: 功能性便秘

答案：A

3. 使用前应用原药进行皮试的药物是

- A: 左氧氟沙星片
- B: 注射用头孢曲松钠
- C: 注射用阿莫西林
- D: 阿奇霉素片

答案：B

4. 患者，女，40 岁，既往有风湿性心脏病病史，近 2 年来出现劳累性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

- A: 肺动脉栓塞
- B: 支气管哮喘
- C: 急性左心衰竭
- D: 慢性支气管炎急性发作

答案：C

5. 阿片类中毒出现呼吸抑制时给予（）

- A: 去甲肾上腺素
- B: 有机硫类
- C: 苯妥英钠
- D: 阿托品

答案：D

6. 以质量调整生命年或者质量调整预期寿命为量化指标所开展的药物经济学评价方法属于查

- A: 成本-效益分析
- B: 最小成本分析
- C: 成本-效果分析
- D: 成本-效用分析

答案：D

7. 与两性霉素 B 合用在体外有拮抗作用

- A: 强心苷
- B: 链霉素

C: 碳酸氢钠

D: 酮康唑

答案：D

8. 癌症患者采用伊立替康化疗后出现水样腹泻时，应立即给予

A: 双歧杆菌

B: 小檗碱

C: 昂丹司琼

D: 洛哌丁胺

答案：D

9. 应用铁剂的影响因素正常人对铁剂的吸收率为

A: 0.4

B: 10%~30%

C: 10%~20%

D: 0.3

答案：C

10. 减少不良反应的配伍用药是

A: 青蒿素与乙胺嘧啶或磺胺多辛联用延缓抗药性

B: 应用地高辛与氢氯噻嗪

C: 阿托品联用吗啡镇痛

D: 纳洛酮用于解救吗啡中毒

答案：C

11. 患者，女，65 岁，诊断为房性心律失常，给予胺碘酮治疗。近日，因胃溃疡开始用西咪替丁，出现窦性心动过缓症状。

A: 一次 0.01-0.03g, 一日 3-4 次，根据耐受程度调整剂量

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 首次 0.2-0.3g, 必要时 2h 后加服 0.1-0.2g

C: 一日 0.4-0.6g, 分 2-3 次; 1-2 周后减至一日 0.2-0.4g

D: 一次 0.25-0.5g, q4h

答案: C

12. 以下关于调剂资格的叙述正确的是

A: 具有专科(药学或相关专业)以上学历即可从事处方调剂

B: 具有中专(药学专业)以上学历即可从事处方调剂

C: 具有本科(药学或相关专业)以上学历即可从事处方调剂

D: 具有执业药师资格或取得药学专业技术职务任职资格者可从事处方调剂

答案: D

13. 口服避孕药对机体代谢的影响, 正确的为

A: 低密度脂蛋白升高

B: 甘油三酯降低

C: 糖耐量异常

D: 高密度脂蛋白降低

答案: C

14. 能增强华法林的抗凝作用的食物是

A: 韭菜

B: 维生素 K

C: 地瓜

D: 芒果

答案: D

15. 填报 ADR / ADE 报告描述的时间

- A: 采取措施干预不良反应的时间
- B: 患者疾病发病时间
- C: 药品不良反应动态变化的相关症状体征、检查及干预措施结果
- D: 患者用药记录

答案：A

16. 欲了解更多的药品不良反应信息，可优先查阅的文献是

- A: 《新编药理学》
- B: 《梅氏药物副作用》
- C: 《中华人民共和国药典》
- D: 《中国国家处方集》

答案：B

17. (2017 年真题) 治疗中度痤疮宜选用 ()

- A: 阿昔洛韦软膏
- B: 氢化可的松软膏
- C: 维 A 酸乳膏
- D: 复方苯甲酸酊

答案：C

18. 治疗胃食管反流病，艾司奥美拉唑的正确服药时间是

- A: 症状发作时、餐后 1.5h 和睡前
- B: 三餐前 30min
- C: 早餐前 30min
- D: 餐后、睡前

答案：C

19. 属于 B 级的药物是

- A: 阿莫西林
- B: 葡萄糖
- C: 万古霉素
- D: 沙利度胺

答案：A

20. 可引起“双硫仑样反应”，给药期间、给药结束 1 周内应禁止饮酒的是

- A: 阿米卡星
- B: 阿奇霉素
- C: 莫西沙星
- D: 头孢哌酮

答案：D

21. 泡腾片的注意事项是

- A: 不宜在口中久含，以免影响其掩盖药物味道、控制药物在一定部位释放的目的
- B: 不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免引起窒息
- C: 用后应漱口
- D: 宜用温开水送服，直接服用会黏附在咽喉和食管壁上引起刺激、恶心等不适

答案：B

22. 误服药物、服药过量以及滥用药物均可引起药物中毒。常见的致中毒药物包括西药、中药和农药。随着化学制药工业的不断发展，如果管理和解救措施跟不上，药物中毒的危害即将越来越严重。

- A: 毒扁豆碱
- B: 毛果芸香碱

C: 纳洛酮

D: 新斯的明

答案: B

23. 维 A 酸与过氧苯甲酰联合应用治疗痤疮时，正确的用法是

A: 将两种药物的凝胶或乳膏充分混合后同时应用？

B: 睡前应用过氧苯甲酰凝胶，晨起洗漱后应用维 A 酸凝胶或乳膏？

C: 睡前应用维 A 酸凝胶或乳膏，晨起洗漱后应用过氧苯甲酰凝胶？

D: 两药的凝胶或乳膏间隔 2 小时交替使用？

答案: C

24. 具有强大的抗凝血因子 Xa 功能及微弱的抗凝血酶作用，可用于预防深静脉血栓形成的药物是

A: 阿加曲班

B: 阿替普酶

C: 氯吡格雷

D: 那屈肝素钙

答案: D

25. 患者，男，54 岁，以“咳嗽、不适、呼吸困难和喘息、咳痰逾 3 日”就诊，患者无基础疾病，近 1 周内未服用药物，诊断为支气管炎。

对该患者的经验治疗应选择

A: 头孢克洛颗粒剂

B: 复方甲氧那明胶囊

C: 阿奇霉素分散片

D: 美托洛尔片

答案: B

26. 用药时宜限制饮水的药物是（）

- A: 环丙沙星片
- B: 利托那韦片
- C: 苯溴马隆胶囊
- D: 胶体果胶铋胶囊

答案：D

27. 下列药物中，不属于兴奋剂的是

- A: 精神刺激剂
- B: 钙通道阻断剂
- C: β 受体阻断剂
- D: 利尿剂

答案：B

28. 通常用于妊娠高血压患者紧急降压的药物是

- A: 赖诺普利
- B: 呋塞米
- C: 硝苯地平
- D: 缬沙坦

答案：C

29. 氯霉素可引起

- A: 再生障碍性贫血
- B: 听神经障碍
- C: 癫痫发作
- D: 锥体外系反应

答案：A

30. (2019 年真题) 患者，女，56 岁，身高 156cm，体重 61kg。空腹血糖 7.8mmol/L，餐后血糖 11.2mmol/L，糖化血红蛋白 6.7%。

- A: 增加现用降糖药的剂量
- B: 增加一种口服降糖药
- C: 换用其他作用机制的口服降糖药
- D: 换用胰岛素治疗

答案：D

31. (用药导致的血常规异常) 抗真菌药

- A: 血红蛋白量增多
- B: 嗜酸性粒细胞减少
- C: 血小板减少
- D: 中性粒细胞减少

答案：D

32. 患者，女，35 岁，因感冒所致流涕、咳嗽发热等症状到药店购药，药师应推荐的药品是()

- A: 萘甲唑啉滴鼻液
- B: 氯苯那敏片
- C: 对乙酰氨基酚片
- D: 酚麻美敏片

答案：D

33. 药师最基本的技能是

- A: 沟通技能
- B: 自主学习能力
- C: 调剂技能
- D: 药品管理技能

答案：C

34. 治疗时需长期口服维生素的是

- A: 原发性骨质疏松症
- B: 抗癫痫药所致的骨质疏松症
- C: 妇女绝经后骨质疏松症
- D: 老年性骨质疏松症

答案：B

35. 患者女,56 岁,既往有高血压、高脂血症病史,长期服用依那普利片、阿托伐他汀钙片。现因上腹痛 2 周,伴黑便数日就诊。患者自诉 3 周前因膝关节痛,服用布洛芬,疼痛未缓解,自行加用萘普生。胃镜检查显示:胃窦小弯侧有一约 7mm 溃疡,幽门螺杆菌 (Hp) 阳性。肾功能未见异常

- A: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) + 阿莫西林 + 克拉霉素
- B: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) + 枸橼酸铋钾 + 阿莫西林 + 甲硝唑
- C: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) + 枸橼酸铋钾 + 克拉霉素 + 左氧氟沙星
- D: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) + 枸橼酸铋钾 + 阿莫西林 + 克拉霉素

答案：B

36. 服用抗结核药异烟肼时, 不

- A: 吸烟
- B: 吃鱼
- C: 饮酒
- D: 喝茶

答案：B

37. I 期临床试验样本数为

A: 100~300 例

B: 常见病 $\geq$ 2000 例

C: 常见病 $\geq$ 1000 例

D: 20~30 例

答案: D

38. 紫外线加速一些药品的氧化、分解，归属于

A: 空气

B: 日光

C: 温度

D: 湿度

答案: B

39. 老年高血压高血压患者的降压目标

A: <140 / 90mmHg

B: <130 / 80mmHg

C: <150 / 90mmHg

D: <120 / 80mmHg

答案: C

40. 患者,男,60 岁,因水泡型足癣到药店购药药师应推荐的药品是()

A: 利巴韦林软膏

B: 特比萘芬乳膏

C: 氢化可的松软膏

D: 10%樟脑软膏

答案: B

41. 缺铁性贫血最早和最常见的症状是

- A: 食欲不振
- B: 头晕
- C: 乏力、困倦、活动耐力减退
- D: 记忆力减退

答案：C

42. 可有效治疗功能性消化不良的药物是

- A: 氯雷他定
- B: 泮托拉唑
- C: 赛庚啶
- D: 氯苯那敏

答案：B

43. 长期应用苯二氮类药物不能突然停止使用，是因为（）

- A: 后遗效应
- B: 毒性反应
- C: 药物依赖
- D: 首剂效应

答案：C

44. 吸烟后使平喘作用减退、维持时间缩短的药物是

- A: 胰岛素
- B: 氯丙嗪
- C: 呋塞米
- D: 西咪替丁

答案：C

45. 可改善睫状肌功能和增加睫状肌血流量，改善眼部调节功能的药物是

- A: 玻璃酸钠滴眼液
- B: 七叶洋地黄双苷滴眼液
- C: 羟甲基纤维素钠滴眼液
- D: 聚乙烯醇滴眼液

答案：B

46. 季节性过敏性鼻炎的主要诱因是

- A: 冷
- B: 光线
- C: 热
- D: 花粉

答案：D

47. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别，并要求制药企业应在药品说明书上标明等级。A~X 级致畸系数递增。有些药物有两个不同的危险度等级，一个是常用剂量的等级，另一个是超常剂量等级。

- A: 卡马西平
- B: 奥美拉唑
- C: 氯化钾
- D: 红霉素

答案：D

48. 孕妇使用四环素可使胎儿牙齿黄染、牙釉质发育不全，骨生长障碍，发生的时间是

- A: 妊娠 3 个月内

- B: 妊娠 2 个月后
- C: 妊娠 5 个月后
- D: 妊娠 4~9 个月

答案: C

49. 以下所列药物中，最可能引起血小板减少的是

- A: 硝酸甘油
- B: 维生素 E
- C: 阿司匹林
- D: 呋塞米

答案: C

50. 适宜进餐时给药，可以减少脂肪吸收率的药物是

- A: 多潘立酮
- B: 氢氧化铝
- C: 甲氧氯普胺
- D: 奥利司他

答案: D

51. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件。处方按其性质分为法定处方和医师处方。《处方管理办法》还将处方分为麻醉药品处方、急诊处方、儿科处方、普通处方等。印刷用纸根据实际需要颜色区分，并在处方右上角以文字注明。

- A: 麻醉药品处方印刷用纸为淡红色、右上角标注"麻醉"
- B: 儿科处方印刷用纸为淡黄色、右上角标注"儿科"
- C: 中药处方印刷用纸为白色，右上角标注"中"
- D: 二类精神药品处方印刷用纸为白色，右上角标注"精二"

答案: D

52. 长期大剂量应用头孢哌酮治疗慢性感染，需要监测的临床指标是

- A: 血脂
- B: 血糖
- C: 凝血功能
- D: 血压

答案：C

53. 右心衰竭最常见的症状是

- A: 端坐呼吸
- B: 腹胀、食欲不振、恶心、呕吐
- C: 劳力性呼吸困难
- D: 夜间阵发性呼吸困难

答案：B

54. 静脉滴注给予万古霉素，滴注时间应该控制的时间是

- A: 2 小时以上
- B: 4 小时以上
- C: 1 小时以上
- D: 6 小时以上

答案：A

55. 切勿嚼碎、咀嚼，宜在进餐时用水吞服，不宜睡前吞服的 IBS 治疗药物是

- A: 环孢素 A
- B: 蒙脱石散
- C: 地芬诺酯
- D: 匹维溴铵

答案：D

56. (2016 年真题) 患者，男，70 岁，两周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院、目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是（）。

- A: 利伐沙班
- B: 肝素
- C: 阿司匹林
- D: 氯吡格雷

答案：C

57. 对口腔黏膜有麻醉作用，产生麻木感，需整片吞服，不可咀嚼的镇咳药是

- A: 右美沙芬
- B: 色甘酸钠
- C: 苯丙哌林
- D: 可待因

答案：C

58. 骨髓造血功能较为活跃，某些药物可引起贫血、粒细胞减少、过敏性紫癜等

- A: 血液系统
- B: 运动系统
- C: 内分泌系统
- D: 水盐代谢

答案：A

59. 抗肿瘤药物引起骨髓抑制，白细胞下降多开始于用药后

- A: 第 7 天
- B: 第 14 天
- C: 第 5 天
- D: 第 3 天

答案：A

60. 高三酰甘油血症，首选的治疗药物是

- A: 贝特类
- B: ω -3 脂肪酸
- C: 烟酸
- D: 他汀类

答案：A

61. 抗氧化，减少再灌注期氧自由基的产生

- A: 阿司匹林
- B: 秋水仙碱
- C: 别嘌醇
- D: 丙磺舒

答案：C

62. 为保障用药安全，需要进行血药浓度监测的药物是

- A: 地高辛
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 罗红霉素
- D: 青霉素

答案：A

63. (2016 年真题) 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。

- A: 美托洛尔缓释片
- B: 贝那普利片
- C: 阿司匹林肠溶片
- D: 氨氯地平片

答案：B

64. 患儿，男，10 个月，1 天前出现腹泻，大便 7 次 / 日，黄色水样便，量多，未见黏液脓血便，伴发热，体温 38~39℃，时有呕吐 / 3 次，日。大便常规：WBC1-3 / HP。

- A: 3~4 小时
- B: 24 小时
- C: 2~3 小时
- D: 0.5~2 小时

答案：C

65. 胶囊壳染料可引起固定性药疹

- A: 药物制剂因素
- B: 生活和饮食习惯
- C: 生理因素
- D: 药物的使用

答案：A

66. 下列具有肝药酶诱导作用的药物中，所抑制的酶系类型最多的是

- A: 苯妥英钠
- B: 苯巴比妥
- C: 利福平
- D: 卡马西平

答案：C

67. 杨某，男性，25 岁，间断上腹痛 2 年，表现为两餐之间出现上腹痛，持续至下餐进餐后缓解，以秋冬季多发。

- A: 胃溃疡？
- B: 十二指肠溃疡？
- C: 浅表性胃炎？
- D: 萎缩性胃炎？

答案：B

68. 患者，女，18 岁，近半年来食欲亢进，多汗，体重明显减轻，伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤，心率 104 次 / 分。化验结果：血清促甲状腺激素（TSH） $<0.1\text{mU/L}$ ，FT3、FT4 明显升高，肝、肾功能基本正常，白细胞计数正常。诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是

- A: 碘化钾治疗，定期复查
- B: 甲状腺全切除手术
- C: 注意休息与补充营养，使用甲巯咪唑治疗
- D: 选用放射性 ^{131}I 治疗

答案：C

69. 患者男性，45 岁，反复发作夜间呼吸困难 1 个月，加重 1 天就诊。体格检查：血压 180 / 110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率 130 次 / 分。

- A: 慢性支气管炎还是急性支气管炎
- B: 支气管哮喘还是心源性哮喘
- C: 肺炎还是肺间质纤维化
- D: 肺心病还是冠心病

答案：B

70. 肝病患者慎用的药品不包括

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 氯丙嗪
- C: 多粘菌素
- D: 甲氨蝶呤

答案：C

71. (肾功能不全者的抗菌药物给药方案调整)肾功能中度损害时，抗菌药减低至正常剂量的

- A: $1/5 \sim 1/2$
- B: $1/7 \sim 1/5$
- C: $3/5 \sim 3/4$
- D: $1/10 \sim 1/5$

答案：A

72. 患者，男，72 岁，以“间断发热、纳差、精神抑郁半年，再发高热 1 天”为主诉入院，既往体健，无高血压、糖尿病、冠心病史。入院时查体：T36.9℃，P88 次/分，R22 次/分，BP112/77mmHg，可触及颈部、锁骨上、腋下多部位浅表淋巴结肿大。经实验室检查、影像学检查，确诊为非霍奇金淋巴瘤。

- A: 右雷佐生
- B: 维生素 B6
- C: 美司钠
- D: 苯海拉明

答案：D

73. 黏液水肿性昏迷的治疗，首选药物为

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: T
- B: L-T
- C: T
- D: L-T

答案：C

74. 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方，氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他丁片 40mgpoqd。

- A: 阿司匹林肠溶片
- B: 美托洛尔缓释片
- C: 贝那普利片
- D: 氨氯地平片

答案：C

75. 提示"药物都应保存在原始包装中，并不要将瓶外的标签撕掉"，是针对

- A: 药品贮存
- B: 药品有效期
- C: 特殊剂型用法
- D: 特殊装置药品

答案：A

76. 向患者提供的用药咨询的主要内容是

- A: 服药后预计疗效起效时间及维持时间
- B: 有否替代药物或其他疗法
- C: 漏服后的补救方法
- D: 输液药物稳定性和配伍的理化性质变化

答案：D

77. 可帮助人短时间内急速降低体重的是

- A: 肽类激素
- B: 麻醉药品
- C: 蛋白同化激素
- D: 利尿剂

答案：D

78. 急性阿片类及急性乙醇中毒的特殊解毒剂

- A: 纳洛酮
- B: 谷胱甘肽
- C: 乙酰半胱氨酸
- D: 二巯丁二钠

答案：A

79. 舒筋活络酒不宜联用的是

- A: 氢氧化铝
- B: 苯巴比妥
- C: 可待因
- D: 阿托品

答案：B

80. 视疲劳所呈现的显著临床特征是

- A: 泪液减少
- B: 眼睑沉重、痉挛
- C: 视物时症状加重
- D: 复视

答案：C

81. 临床试验观测的指标限于实验设计内容，其他临床指标容易忽视，属于

- A: 管理漏洞
- B: 考察不全面
- C: 观察时间短
- D: 病例数目少

答案：B

82. 下列情况不宜选用的抗高血压药，直立性低血压不宜选用

- A: ACEI
- B: 非二氢吡啶类钙拮抗剂
- C: 哌唑嗪
- D: 利尿药

答案：C

83. （2016 年真题）对于有睡眠障碍的抑郁症患者，适宜选用的抗抑郁药是（ ）。

- A: 雷美尔通
- B: 地西泮
- C: 米氮平
- D: 佐匹克隆

答案：C

84. 容易氧化的药物是

- A: 胃蛋白酶
- B: 牛痘菌苗

C: 青霉素类

D: 阿扑吗啡

答案: D

85. 嗜酸性粒细胞增多可能提示的疾患是

A: 过敏性疾病如荨麻疹

B: 感染性疾病如肺结核

C: 铅、钡中毒

D: 病毒感染性腹泻

答案: A

86. 查找药物信息的正确顺序是()。

A: 二级信息源→三级信息源→一级信息源

B: 二级信息源→一级信息源→三级信息源

C: 三级信息源→二级信息源→一级信息源

D: 一级信息源→二级信息源→三级信息源

答案: C

87. 禁用阿扑吗啡催吐的毒物是()。

A: 磷化锌

B: 麻黄碱

C: 阿片类药物

D: 麦角胺

答案: C

88. 判别"大三阳"区别于"小三阳"的主要检查项目是

A: HBeAg(+)

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 抗-HBs(+)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/887151010046010024>