


# 急性心力衰竭



# 概述

## 心力衰竭


指各种心脏结构或功能性疾病导致心室充盈及（或）射血能力受损而引起的一组综合征。  
临床表现以呼吸困难和无力而致体力活动受限和水肿

# 概述

## 急性心力衰竭

指心脏在短期内发生心肌收缩力明显降低和（或）心室负荷突然增加，导致心排量急剧下降，体循环或肺循环急性淤血和组织灌注不足的临床综合征。

# 分类



- ❖ 急性心衰通常危及生命并需要紧急治疗。
- ❖ 急性心力衰竭可以表现为急性起病（先前不知有心功能不全的病人新发生的急性心力衰竭）或慢性心力衰竭急性失代偿。
- ❖ 任何突发的心脏解剖结构或功能损害，导致心排量急骤减低和肺静脉压突然升高的因素，均可引起急性左心衰

# 相关因素

## 急性左心衰 相关因素

急性弥漫性心肌损害

急性压力负荷过重

急性容量负荷过重


急性心室舒张受限

# 发病机理


- ❖ 主要的病理生理基础为心脏收缩力突然严重减弱，心排血量急剧减少，或左室瓣膜性急性反流，左室舒张末压迅速升高，肺静脉回流不畅。由于肺静脉压快速升高，肺毛细血管压随之升高使血管内液体渗入到肺间质和肺泡内形成急性肺水肿。

# 临床表现


急性左心衰




# 急性肺水肿



# 心肺查体




# 血压变化



# 轻症病人

- 阵发性夜间呼吸困难
- 病人睡后突然胸闷，气急，被迫坐起
- 两肺明显哮鸣音
- 在坐起咳出泡沫样黏痰后可渐好转

# 心源性昏厥



# 心源性休克

心率快，尿少

收缩压降至80mmHg  
以下，脉压<20mmHg

心源性休克

皮肤湿冷，面色苍白  
或紫绀，尿量少


烦躁不安，反应迟钝，表情淡漠



2024/12/25


编辑版

# 辅助检查



# 急性左心衰诊断

## 急性左心衰



# 鉴别诊断

鉴

别

诊

断

晕厥

支气管  
哮喘

非心源性  
肺水肿

# 治疗

- 本病为危重急症
- 要迅速积极针对病因、诱因、病理生理变化综合治疗
- 目标是减轻心脏负荷，增加心排量，缓解肺淤血，改善、维持组织的充分供氧

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/888136033100006123>