
妇产科护理题-历年真题精选五

1、关于母乳喂养下列错误的是()

- A. 母乳经济，实惠
- B. 定时，定量进行母乳喂养
- C. 产后 30 分钟内早吸吮
- D. 母乳喂养促进母子感情
- E. 母乳喂养预防产后出血

2、新生儿娩出后 1 分钟，Apgar 评分 4~7 分()

- A. 重度新生儿窒息
- B. 急性胎儿窘迫
- C. 轻度新生儿窒息
- D. 慢性胎儿窘迫
- E. 新生儿产伤

3、胎儿娩出后 3 分钟，产妇出现多量阴道活动性流血，最可能是()

- A. 阴道静脉破裂
- B. 宫颈裂伤
- C. 宫缩乏力
- D. 胎盘部分剥离
- E. 凝血功能障碍

4、关于子宫破裂的描述，下列错误的是()

- A. 多发生于多产妇
- B. 全腹部压痛,反跳痛
- C. 子宫破裂后,应积极做好剖宫产术前准备
- D. 出现休克征象
- E. 胎儿进入腹腔后,胎心听得更清楚

5、下列哪一项不是先兆子宫破裂的临床征象()

- A. 胎心音先加快后减慢
- B. 下腹拒按,并出现排尿困难
- C. 出现多个痉挛性缩复环
- D. 持续性腹痛,产妇烦躁不安
- E. 出现一个环状凹陷

6、病理性缩复环,常见于下列哪一种情况()

- A. 双胎
- B. 巨大儿
- C. 梗阻性难产
- D. 胎膜早破
- E. 羊水过少

7、先兆子宫破裂的临床表现应除外()

- A. 病理性缩复环
- B. 血尿
- C. 子宫强直性收缩
- D. 血压下降
- E. 产妇烦躁不安

8、脐带脱落的时间()

- A. 3~7 天
- B. 8~10 天
- C. 1~2 天
- D. 11~14 天
- E. 2 周以后

9、引起胎膜早破的病因，下列正确的是()

- A. 胎膜发育不良
- B. 下生殖道感染
- C. 说法均正确
- D. 多胎妊娠
- E. 创伤

10、关于分娩时子宫破裂，下列正确的是()

- A. 大量阴道出血
- B. 子宫破裂后可听到胎心，触摸不到肢体
- C. 子宫底迅速上升
- D. 患者全腹部压痛, 反跳痛
- E. 宫缩无力

11、先兆子宫破裂与重型胎盘早剥所共有的临床表现是()

- A. 剧烈腹痛
- B. 子宫呈板状硬, 宫缩无间歇
- C. 伴有头盆不称
- D. 都伴有多量阴道出血
- E. 均有外伤史

12、当出现先兆子宫破裂时，遵医嘱应立即注射()

- A. 抗生素
- B. 硫酸镁
- C. 地塞米松
- D. 哌替啶
- E. 缩宫素

13、某女，足月自然产后 3 天，出现下腹痛，体温正常，恶露多，有臭味，子宫底脐上 1 指，子宫体软，应考虑为()

- A. 宫颈炎
- B. 子宫内膜炎
- C. 盆腔结缔组织炎
- D. 输卵管炎
- E. 急性盆腔腹膜炎

14、用阴道窥器能了解下列哪一项()

- A. 子宫的大小
- B. 阴道壁软硬度
- C. 阴道壁粘膜有无充血
- D. 宫颈软硬度
- E. 附件炎症

15、引起宫缩乏力性出血的情况不包括下列哪一项()

- A. 产程延长，产妇过度消耗
- B. 脐带附着在胎膜上
- C. 全身状态不佳，如贫血
- D. 子宫过度膨胀
- E. 膀胱充盈

16、某女，初孕妇。于娩出胎儿后，突然出现原因不明的休克并出现烦躁不安，寒战，呕吐等。经过前驱症状之后，出现呛咳，呼吸困难，

发绀,抽搐,数分钟后死亡。该患者最()

- A. 胎盘植入
- B. 先兆子宫破裂
- C. 重度子痫
- D. 羊水栓塞
- E. 产后出血

17、与羊水栓塞无关的致病因素是()

- A. 宫缩过强
- B. 中期妊娠引产
- C. 前置胎盘
- D. 胎盘早剥
- E. 宫缩乏力

18、哪项是判断卵巢有无排卵刮取子宫内膜的时间()

- A. 经后 5 天
- B. 月经期
- C. 经前 1~2 天
- D. 经前 5 天
- E. 经后 1~2 天

19、不属先兆子宫破裂的临床表现为()

- A. 子宫出现病理性缩复环
- B. 腹壁下清楚触及胎儿肢体
- C. 子宫收缩加强
- D. 胎心音 90 次 / 分
- E. 子宫下段压痛

20、分娩时子宫破裂正确的是()

- A. 大量阴道出血
- B. 用缩宫素促使胎儿娩出
- C. 子宫底迅速上升
- D. 患者全腹部压痛, 反跳痛
- E. 子宫破裂后听不到胎心, 也不能触摸到肢体

21、某女, 35 岁。生育史: 0-0-0-0, 妊娠足月临产, 滞产, 胎儿, 胎盘娩出后, 出现间歇性阴道流血, 量较多, 混有血块。检查: 子宫体柔软, 轮廓不清, 其出血原因最大可能是()

- A. 子宫胎盘卒中
- B. 软产道损伤
- C. 子宫收缩乏力
- D. 凝血功能障碍
- E. 胎盘早剥

22、关于新生儿哺乳，下列哪一项是正确的()

- A. 出生后 3 天，因母乳分泌不足，可以牛乳喂养
- B. 新生儿哺乳以母乳喂养，按需哺乳为好
- C. 牛乳中含有母乳的全部营养物质
- D. 早产儿最好全吃母乳
- E. 两次喂奶之间喂开水一次

23、分段诊刮顺序正确的是()

- A. 先刮宫颈内口，后刮宫颈外口
- B. 先刮宫腔，后刮子宫颈管
- C. 先刮宫颈外口，后刮宫颈内口
- D. 同时进行
- E. 先刮子宫颈管，后刮宫腔

24、某女，顺产后 3 天，体温 37.8℃，咳嗽，肺部有湿啰音，恶露无臭味，子宫无压痛，母乳喂养良好，会阴伤口愈合佳。考虑为()

- A. 产褥感染
- B. 乳腺感染
- C. 呼吸道感染
- D. 急性宫颈炎
- E. 泌尿道炎

25、羊水栓塞最早出现的症状是()

- A. 产后大出血
- B. 急性呼吸衰竭
- C. 猝死
- D. 急性肾衰竭
- E. 急性 DIC

26、子宫破裂的护理诊断，下列不合适的是()

- A. 功能障碍性悲哀
- B. 组织液流量改变
- C. 疼痛
- D. 预感性悲哀
- E. 胎儿受损的危险

27、初产妇，临产前静脉滴注缩宫素，破膜后不久突然出现烦躁不安，呛咳，呼吸困难，发绀，数分钟后死亡。本病例最可能的诊断是()

- A. 低纤维蛋白原血症
- B. 羊水栓塞
- C. 重度妊高征—子痫
- D. 重型胎盘早剥
- E. 妊娠合并心衰

28、引起严重产褥期感染的病原体是()

- A. 支原体
- B. 大肠埃希菌
- C. 溶血性链球菌
- D. 肺炎链球菌
- E. 大肠杆菌

29、哪一项不合适下列疾病对应的检查方法()

- A. 宫颈糜烂--宫颈刮片
- B. 子宫颈癌--宫颈黏液检查
- C. 子宫内膜癌--分段诊刮
- D. 滴虫性阴道炎--白带悬滴法
- E. 不孕症--输卵管通畅检查

30、关于子宫下段破裂的叙述正确的是()

- A. 胎体触及不清
- B. 胎头拨露继而着冠
- C. 病理性缩复环随宫缩上升
- D. 强烈腹痛后宫缩停止，胎心消失
- E. 可伴有血尿

31、产褥感染最常见的细菌是()

- A. 溶血性链球菌
- B. 厌氧菌与需氧菌的混合感染葡萄球菌
- C. 厌氧性链球菌
- D. 白色念球菌
- E. 需氧性链球菌

32、产后出血是指()

- A. 胎盘娩出后 24 小时阴道出血量超过 500ml
- B. 胎盘娩出后 12 小时阴道出血量超过 500ml
- C. 胎儿娩出后 12 小时阴道出血量超过 500ml
- D. 胎儿娩出后 24 小时阴道出血量超过 500ml
- E. 阴道出血量超过 500ml

33、新生儿娩出后 1 分钟，Apgar 评分 0~3 分()

- A. 重度新生儿窒息
- B. 急性胎儿窘迫
- C. 轻度新生儿窒息
- D. 慢性胎儿窘迫
- E. 新生儿产伤

34、导致子宫破裂的原因，无关的是()

- A. 各种不适当的阴道助产手术

- B. 宫缩剂使用不当
- C. 胎位异常
- D. 宫体部瘢痕破裂
- E. 急性羊水过多

35、有关晚期产后出血的定义，下列描述正确的是()

- A. 分娩 48 小时后至产褥期内发生的子宫大量出血
- B. 胎儿娩出后至产后 10 天内发生子宫大量出血
- C. 胎儿娩出后至产褥期内发生的子宫大量出血
- D. 分娩 24 小时后至产褥期内发生的子宫大量出血
- E. 胎盘娩出后至产后 6 周内发生的子宫大量出血

36、与产后宫缩乏力性出血无关的因素是()

- A. 严重贫血
- B. 脐带绕颈
- C. 产程延长
- D. 巨大胎儿
- E. 羊水过多

37、下列哪一项有关盆腔检查的注意事项是错误的()

- A. 凡有阴道出血者均不做阴道检查
- B. 患者臀下的垫单一人一换

- C. 对未婚女子一般不做阴道检查
- D. 检查物品应消毒一人一换
- E. 嘱患者检查前先排尿

38、产褥病率的主要原因是()

- A. 上呼吸道感染
- B. 产褥感染
- C. 泌尿系感染
- D. 生殖道感染
- E. 乳腺感染

39、胎膜早破是()

- A. 胎膜在规律宫缩后
- B. 胎膜在潜伏期破裂
- C. 胎膜在临产前破裂
- D. 胎膜破裂发生在活跃期
- E. 胎膜破裂发生在第一产程末

40、初产妇，胎儿娩出后无阴道流血，胎盘娩出后阴道流血不断，时多时少，1小时内出血量超过600ml，血压80/50mmHg，脉搏126次/分，此时应采取的紧急措施是()

- A. 为阴道血肿，立即处理

- B. 检查凝血功能，并输纤维蛋白原
- C. 为宫颈裂伤，立即缝合
- D. 静注麦角新碱加强宫缩
- E. 快速输液, 输血

41、手术产新生儿为预防颅内出血，下列哪一项是错误()

- A. 严密观察呼吸, 面色及哭声
- B. 遵医嘱肌注维生素 K13 天
- C. 新生儿取侧卧位
- D. 3 天内不宜沐浴
- E. 勤换尿布，为防止哭吵，多抱婴儿

42、先兆子宫破裂的主要表现为()

- A. 突然感到剧烈腹痛
- B. 病理性缩复环
- C. 休克
- D. 宫颈口不继续扩张
- E. 胎心音消失

43、在胎盘剥离前出现大出血时应选用下述哪种方法()

- A. 徒手剥离胎盘
- B. 从脐静脉中注入缩宫素

- C. 肌注麦角新碱
- D. 用纱条填塞宫腔
- E. 牵引脐带, 使胎盘剥离

44、晚期产后出血处理包括()

- A. 给予宫缩剂, 止血剂
- B. 给予抗生素预防感染
- C. 必要时子宫切除
- D. 刮宫术
- E. 以上说法均正确

45、以下关于病理性缩复环的描述, 错误的是()

- A. 在脐部或脐部以上可见明显环状凹陷
- B. 子宫在病理性缩复环处及其下方发生破裂
- C. 子宫上段逐渐变薄
- D. 子宫下段被动拉长变薄
- E. 宫体增厚变短

46、关于新生儿头皮血肿, 下列哪一项是错误的()

- A. 多在娩出时即存在
- B. 发生在顶骨骨膜下
- C. 可有局部波动感

- D. 血肿不超过骨缝
- E. 3~8 周后可消失

47、了解卵巢功能与下列哪一项无关()

- A. 白带检查
- B. 后穹隆涂片
- C. 阴道侧壁涂片
- D. 基础体温测定
- E. 宫颈黏液检查

48、有关胎膜早破，下列哪一项处理不妥()

- A. 不满孕 37 周无感染的产妇用期待疗法
- B. 不满孕 35 周有感染的产妇及时终止妊娠
- C. 住院待产，卧床休息
- D. 破膜超过 12 小时的产妇应给予抗生素
- E. 近预产期的产妇可自然分娩

49、下列哪一项是盆腔检查后的记录顺序()

- A. 阴道, 宫颈, 子宫, 双侧附件, 外阴
- B. 双侧附件, 子宫, 宫颈, 阴道, 外阴
- C. 外阴, 阴道, 宫颈, 子宫, 双侧附件
- D. 子宫, 宫颈, 双侧附件, 外阴, 阴道

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/895300100032011110>