

2024 年四川省青白江区《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库及参考答案（名师推荐）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 仅作为吸入给药的平喘药是()

- A: 布地奈德
- B: 特布他林
- C: 沙丁胺醇
- D: 沙美特罗

答案：D

2. 可用于肝硬化腹水以及加速某些毒物排泄的药物是

- A: 托拉塞米
- B: 氢氯噻嗪
- C: 氨苯蝶啶
- D: 乙酰唑胺

答案：A

3. 可沉积于牙齿和骨中，造成牙齿黄染的药物是()

- A: 四环素
- B: 链霉素
- C: 磺胺嘧啶
- D: 青霉素

答案：A

4. 下述质子泵抑制剂中对氯吡格雷疗效影响最小的是()

- A: 兰索拉唑
- B: 泮托拉唑
- C: 埃索美拉唑
- D: 奥美拉唑

答案: B

5. 维生素 A 的适应证不包括

- A: 夜盲症
- B: 干眼病
- C: 角膜软化
- D: 坏血病

答案: D

6. (2018 年真题) 属于胆固醇吸收抑制剂的调节血脂药是 ()

- A: 依折麦布
- B: 辛伐他汀
- C: 非诺贝特
- D: 烟酸

答案: A

7. 服用阿司匹林可增加患者消化道黏膜损伤和胃溃疡的风险为降低此风险,应采取的措施是 ()

- A: 不推荐 65 岁以上老年患者使用阿司匹林进行冠心病二级预防
- B: 应长期合用质子泵抑制剂
- C: 阿司匹林不应与其他抗血小板药物合用
- D: 用阿司匹林前宜先根治幽门螺杆菌感染

答案: D

8. 链激酶的作用机制是

- A: 抑制血小板聚集
- B: 抑制维生素 K 在肝细胞合成凝血因子
- C: 促进纤维蛋白溶解
- D: 加速抗凝血酶Ⅲ的作用

答案：C

9. 氨基苷类抗生素的抗菌机制是

- A: 影响叶酸代谢
- B: 影响胞浆膜的通透性
- C: 抑制细菌细胞壁的合成
- D: 抑制蛋白质合成的全过程

答案：D

10. （2016 年真题）患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

- A: 餐后 1 小时
- B: 餐时
- C: 餐后半小时
- D: 餐前半小时

答案：B

11. 有耳毒性的药物是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 螺内酯
- C: 呋塞米
- D: 乙酰唑胺

答案：C

12. 以下不属于强心苷的禁忌证的是()

- A: 慢性收缩性心力衰竭
- B: 梗阻性肥厚型心脏病
- C: 室性心动过速、心室颤动
- D: 预激综合征伴心房颤动或扑动

答案：A

13. 下列哪种氨基酸与螺内酯合用时可导致血钾升高

- A: 精氨酸
- B: 谷氨酸
- C: 门冬氨酸
- D: 赖氨酸

答案：A

14. 解救由蒽醌类抗肿瘤药物导致的心肌炎，应当选用的药物是

- A: 右雷佐生
- B: 纳洛酮
- C: 氟马西尼
- D: 乙酰半胱氨酸

答案：A

15. 属于第二代 α_1 肾上腺素受体阻断剂的是

- A: 西地那非
- B: 他达拉非
- C: 特拉唑嗪
- D: 度他雄胺

答案：C

16. 青光眼患者应该慎用

- A: 噻托溴铵
- B: 孟鲁司特
- C: 沙丁胺醇
- D: 沙美特罗

答案：A

17. 高血压合并痛风者不宜使用

- A: 硝苯地平
- B: 氢氯噻嗪
- C: 依那普利
- D: 阿替洛尔

答案：B

18. 纳洛酮治疗的疾病或症状有

- A: 失眠
- B: 剧烈疼痛
- C: 惊厥
- D: 阿片中毒

答案：D

19. 可中效、稳定的降低糖化血红蛋白的是

- A: 吡格列酮
- B: 阿卡波糖
- C: 胰岛素皮下注射
- D: 西格列汀

答案：D

20. 属于解毒类保肝药的是

- A: 异甘草酸镁
- B: 双环醇
- C: 还原型谷胱甘肽
- D: 多烯磷脂酰胆碱

答案：C

21. 用于呼吸道合胞病毒引起的肺炎与支气管炎治疗的抗病毒药物是

- A: 利巴韦林
- B: 金刚烷胺
- C: 阿昔洛韦
- D: 碘苷

答案：A

22. 秋水仙碱的注意事项错误的是

- A: 尽量避免静脉注射和长期口服给药
- B: 可致可逆性维生素 B
- C: 不可用于长期痛风的预防
- D: 肾功能下降时可造成蓄积

答案：B

23. 属于延长动作电位时程的抗心律失常药是()

- A: 利多卡因
- B: 普鲁卡因胺
- C: 胺碘酮
- D: 维拉帕米

答案：C

24. 用于合胞病毒引起的肺炎和支气管肺炎的抗病毒药是

- A: 拉米夫定
- B: 碘苷
- C: 更昔洛韦
- D: 利巴韦林

答案：D

25. 他昔莫芬为前药，主要在肝脏经肝药酶代谢，该肝药酶是

- A: CYP3A4
- B: CYP286
- C: CYP2C19
- D: CYP2D6

答案：D

26. 克拉维酸与阿莫西林配伍使用是因前者可()

- A: 减少阿莫西林的不良反应
- B: 延缓阿莫西林经肾小管的分泌
- C: 扩大阿莫西林的抗菌谱
- D: 抑制 β -内酰胺酶

答案：D

27. 对癫痫小发作疗效最好的药物是

- A: 乙琥胺
- B: 氯硝西洋
- C: 地西洋
- D: 卡马西平

答案：A

28. 阿托品 2mg 时，出现的症状为()

- A: 瞳孔轻度散大
- B: 略有口干
- C: 语言不清
- D: 瞳孔扩大

答案：D

29. 与磺胺甲噁唑具有协同抑菌和杀菌作用的是()

- A: 呋喃唑酮
- B: 磺胺嘧啶
- C: 诺氟沙星
- D: 甲氧苄啶

答案：D

30. 属于浓度依赖性抗菌药物的是

- A: 氨基糖苷类
- B: 庆大霉素
- C: 头孢西丁
- D: 拉氧头孢

答案：B

31. 使用痤疮治疗药物不会出现

- A: 皮肤色素沉着
- B: 红斑
- C: 眼周局部刺激
- D: 肝脏氨基转移酶 AST 降低

答案：D

32. 监测他汀类药所致肌毒性的临床指标是()。

- A: 碱性磷酸酶
- B: 肌酸激酶
- C: 乳酸脱氢酶
- D: 尿淀粉酶

答案：B

33. 甲氧氯普胺的作用不包括

- A: 刺激泌乳素释放
- B: 促进胃肠蠕动
- C: 促进胃酸分泌
- D: 胃肠道兴奋作用

答案：C

34. 下列药物中，与甲氨蝶呤长期大量合用，可引起膀胱移行细胞癌的是

- A: 抗病毒药物
- B: 维生素类
- C: 抗生素
- D: 糖皮质激素

答案：D

35. 长春新碱

- A: 干扰 RNA 转录
- B: 直接破坏 DNA 结构和功能
- C: 干扰核酸生物合成

D: 影响蛋白质合成和功能

答案：D

36. 属于容积性泻药的是()

A: 欧车前

B: 番泻叶

C: 利那洛肽

D: 多库酯钠

答案：A

37. 厌氧菌引起的肺炎宜选用()

A: 氟康唑

B: 万古霉素

C: 阿奇霉素

D: 克林霉素

答案：D

38. 属于免疫调节型氨基酸注射液的是()

A: 复方氨基酸注射液(20AA)

B: 复方氨基酸注射液(18AA)

C: 赖氨酸注射液

D: 丙氨酰谷氨酰胺注射液

答案：D

39. 治疗维生素 D 中毒导致的变应性骨炎可选用

A: 奥利司他

B: 阿仑膦酸钠

C: 鲑降钙素

D: 阿法骨化醇

答案: C

40. 作用于 γ -氨基丁酸受体的药物是

A: 苯妥英钠

B: 卡马西平

C: 苯巴比妥

D: 佐匹克隆

答案: D

41. 属于阿片受体激动剂，晚期癌痛不宜长期使用的药物是

A: 吗啡

B: 秋水仙碱

C: 布洛芬

D: 哌替啶

答案: D

42. 适用于哺乳期妇女治疗甲亢的药物是

A: 碘剂

B: 丙硫氧嘧啶

C: 甲巯咪唑

D: 卡比马唑

答案: B

43. 以下泻药中，半乳糖血症患者禁用的是

A: 硫酸镁

B: 液状石蜡

C: 酚酞

D: 乳果糖

答案: D

44. 可用肝病的氨基酸制剂是

A: 复方氨基酸注射液（15AA）、复方氨基酸注射液（9AA）

B: 复方氨基酸注射液（6AA）、复方氨基酸注射液（9AA）

C: 复方氨基酸注射液（9AA）、赖氨酸注射液

D: 复方氨基酸注射液（15AA）、复方氨基酸注射液（6AA）

答案: D

45. 别嘌醇抗痛风的作用机制是

A: 可促进尿酸分解，将尿酸转化为一种溶解性更好的尿囊素

B: 抑制黄嘌呤氧化酶，阻止次黄嘌呤和黄嘌呤代谢为尿酸

C: 抑制近端肾小管对尿酸盐的重吸收，使尿酸排出增加

D: 抑制粒细胞浸润和白细胞趋化

答案: B

46. 胺碘酮抗心律失常的作用机制是

A: 提高窦房结和浦肯野纤维的自律性

B: 加快浦肯野纤维和窦房结的传导速度

C: 阻滞多种钾通道，延长动作电位的时程和有效不应期

D: 缩短心房和浦肯野纤维的动作电位时程、有效不应期

答案: C

47. 治疗滴虫病宜选用

A: 吡喹酮

B: 甲硝唑

C: 甲苯咪唑

D: 氯喹

答案: B

48. 配制静脉输液时,应选择氯化钠注射液或乳酸钠林格注射液稀释,不得使用葡萄糖注射液稀释的抗真菌药是()

A: 卡泊芬净

B: 氟康唑

C: 伏立康唑

D: 两性霉素 B

答案: A

49. 疗效优于乙琥胺,但因有肝毒性,仅在癫痫小发作合并大发作时应用的药物是

A: 丙戊酸钠

B: 卡马西平

C: 苯妥英钠

D: 苯巴比妥

答案: A

50. 沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下,请结合问题作答。

。

A: 贝那普利

B: 比索洛尔

C: 螺内酯

D: 呋塞米

答案: A

51. 治疗癫痫持续状态可首选

- A: 卡马西平
- B: 氯丙嗪
- C: 硫酸镁
- D: 地西泮

答案：D

52. 需与氨基糖苷类联合应用治疗布鲁菌病和鼠疫的是

- A: 青霉素
- B: 氯霉素
- C: 红霉素
- D: 四环素

答案：D

53. 用于功能性子宫出血、妊娠早期先兆流产、习惯性流产的是

- A: 硝苯地平
- B: 噻密啶
- C: 米非司酮
- D: 绒促性素

答案：D

54. 口服呋喃妥因可用于治疗()

- A: 肠道感染
- B: 尿路感染
- C: 肺感染
- D: 呼吸道感染

答案：B

55. (2016 年真题) 脂溶性较高，起效快，属于巴比妥类的镇静催眠药是

- A: 地西洋
- B: 阿普唑仑
- C: 异戊巴比妥
- D: 佐匹克隆

答案：C

56. 噻唑烷二酮类药物可降低

- A: 血容量
- B: 血红蛋白
- C: 女性骨折的风险
- D: 体重

答案：B

57. 可以降低血尿酸水平，但升高尿尿酸水平而导致肾结石的抗痛风药是

- A: 呋塞米
- B: 别嘌醇
- C: 秋水仙碱
- D: 丙磺舒

答案：D

58. 适用于各型高血压，对原发性或肾性高血压均有效的是

- A: 拉贝洛尔
- B: 肼屈嗪
- C: 卡托普利
- D: 氢氯噻嗪

答案：C

59. 丙硫氧嘧啶起效慢的主要原因是

- A: 肾脏排泄速度快
- B: 口服后吸收不完全
- C: 待已合成的甲状腺素耗竭后才能生效
- D: 肝内代谢转化快

答案：C

60. 某患者，突发高热、呕吐、惊厥，数小时后出现面色苍白、四肢厥冷、脉搏细速、血压下降至休克水平。经实验室检查诊断为暴发型流脑所致感染中毒性休克，应采取的抗休克药物为

- A: 阿托品
- B: 酚妥拉明
- C: 糖皮质激素
- D: 右旋糖酐

答案：C

61. 作用与第二代头孢菌素相似，对大多数超广谱 β -内酰胺酶稳定的药物是

- A: 红霉素
- B: 阿奇霉素
- C: 四环素
- D: 头孢米诺

答案：D

62. 利尿作用最强，特别当急、慢性肾衰竭（肌酐清除率 $<30\text{mL/min}$ ）时，可作为首选治疗的利尿剂为（）。

- A: 袢利尿剂
- B: 碳酸酐酶抑制剂
- C: 噻嗪类利尿剂
- D: 留钾利尿剂

答案：A

63. 用于肾移植的排异反应和类风湿关节炎的是()

- A: 硫唑嘌呤
- B: 甲泼尼龙
- C: 环磷酰胺
- D: 环孢素

答案：A

64. 林可霉素可以作为首选药的是

- A: 胆道感染
- B: 呼吸道感染
- C: 皮肤感染
- D: 金葡菌致骨髓炎

答案：D

65. 氯霉素类

- A: 禁用于 8 岁以下儿童
- B: 禁用于胆道阻塞患者
- C: 禁用于早产儿、新生儿
- D: 禁用于 18 岁以下儿童及青少年

答案：C

66. 噻嗪类利尿药发挥利尿作用的作用点是

- A: 磷酸二酯酶
- B: Na^+-Cl^- 共转运子
- C: 碳酸酐酶
- D: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子

答案：B

67. 下列关于胺碘酮的叙述，错误的是()

- A: 降低窦房结和普肯耶纤维的自律性
- B: 阻滞心肌细胞钠、钙及钾通道
- C: 对室上性和室性心律失常均有效
- D: 对 α 、 β 受体有激动作用

答案：D

68. 属于III类抗心律失常药

- A: 胺碘酮
- B: 普萘洛尔
- C: 利多卡因
- D: 奎尼丁

答案：A

69. 可用于治疗厌氧菌及产 ESBL 的革兰阴性杆菌感染的药物是()

- A: 头孢呋辛
- B: 头孢他啶
- C: 头孢唑林
- D: 头孢米诺

答案：D

70. 为鲨烯环氧酶的非竞争性、可逆性抑制剂，用于手癣、足癣、体癣及皮肤念珠菌病的药物是

- A: 制霉菌素
- B: 联苯卡唑
- C: 阿莫罗芬
- D: 特比萘芬

答案：D

71. 阿奇霉素

- A: 用于非典型病原体感染
- B: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注
- C: 肾毒性较大
- D: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

答案：A

72. 黄体酮治疗先兆流产，必须肌内注射给药的主要理由是()

- A: 口服吸收缓慢
- B: 口服后在消化道和肝内被迅速破坏
- C: 口服用药排泄快
- D: 肌内注射吸收迅速

答案：B

73. 可用维生素 B12 治疗的疾病是

- A: 缺铁性贫血
- B: 再生障碍性贫血
- C: 慢性失血性贫血
- D: 神经炎

答案：D

74. (2016 年真题) 鼻减充血药所致的典型不良反应是

- A: 血管舒张
- B: 心率减慢
- C: 血压升高
- D: 共济失调

答案: C

75. 易引起刺激性干咳的抗高血压药是()

- A: 非洛地平
- B: 卡托普利
- C: 厄贝沙坦
- D: 阿托伐他汀

答案: B

76. 复方氨基酸注射液(6AA)与等量 10%葡萄糖注射液稀释后缓慢静脉滴注,滴速为

- A: 滴速 20~30 滴 / 分
- B: 不超过 40 滴 / 分
- C: 不超过 15 滴 / 分
- D: 滴速 80~100 滴 / 分

答案: B

77. (2020 年真题) 关于非那雄胺作用特点的说法,错误的是

- A: 小剂量可促进头发生长,用于治疗源性脱发
- B: 能降低血清前列腺特异性抗原(PSA)水平
- C: 易引起直立性低血压
- D: 可抑制酮在前列腺内转化为双氢睾酮

答案：C

78. 在抗血小板药中，阿司匹林属于（）。

- A: 磷酸二酯酶抑制剂
- B: 环氧酶抑制剂
- C: 整合素受体阻断剂
- D: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂

答案：B

79. 大环内酯类药的主要作用靶点是

- A: 核糖体的 30S 亚基
- B: 核糖体的 50S 亚基
- C: 细胞壁丙氨酰丙氨酸
- D: 细胞内膜 PBP

答案：B

80. 可用于治疗乙型肝炎病毒感染的药物是

- A: 金刚烷胺
- B: 阿昔洛韦
- C: 恩替卡韦
- D: 更昔洛韦

答案：C

81. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1 期）伴出血。

- A: 胶体果胶铋胶囊
- B: 埃索美拉唑
- C: 克拉霉素

D: 阿莫西林

答案：A

82. 双炔失碳酯需服满的片数是

A: 7 片

B: 12 片

C: 14 片

D: 6 片

答案：B

83. 关于苯丙哌林与可待因镇咳作用强度比较，正确的是

A: 苯丙哌林镇咳作用约为可待因的 2 倍

B: 苯丙哌林镇咳作用约为可待因的 2~4 倍

C: 可待因镇咳作用约为苯丙哌林的 2~4 倍

D: 可待因镇咳作用约为苯丙哌林的 2 倍

答案：B

84. 小剂量碘主要用于

A: 地方性甲状腺肿

B: 黏液性水肿

C: 抑制甲状腺素的释放

D: 呆小病

答案：A

85. 大剂量糖皮质激素冲击疗法用于()

A: 抑制器官移植急性排斥危象

B: 变态反应性疾病

C: 湿疹

D: 肾病综合征

答案: A

86. 患者，男，56 岁，有高血压病史 4 年，体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。

A: 血钾

B: 血氯

C: 血钙

D: 血钠

答案: A

87. 下列抗心律失常药中，属于 Ia 类钠通道阻滞药的是()

A: 奎尼丁

B: 苯妥英钠

C: 普罗帕酮

D: 利多卡因

答案: A

88. 下列降压药中属于血管紧张素 II 受体阻断药的是()

A: 左旋氨氯地平

B: 坎地沙坦

C: 阿利克仑

D: 地尔硫

答案: B

89. 在常用剂量下，非那雄胺可使血清前列腺特异抗原(PSA)水平下降的幅度为

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 0.25

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/896232211220011030>