

护理理论考核试题（含答案）

1.属于传染病预防措施的是（） [单选题] *

- A.计划免疫(正确答案)
- B.封锁疫区
- C.环境消毒
- D.限制集会
- E.停工听课

2.确定一种传染病的检疫期是根据该病的（） [单选题] *

- A.潜伏期(正确答案)
- B.传染期
- C.症状明显期
- D.恢复期
- E.前驱期

3.传染病的基本特征，下列哪一项除外（） [单选题] *

- A.有病原体
- B.有传染性
- C.有遗传性(正确答案)
- D.有流行性
- E.有免疫性

4.患者女，28岁，某外企主管。近2日出现咽干、咽痛、喉痒、发热、头痛、全身不适。对该患者的健康指导，错误的内容是（） [单选题] *

- A.避免上呼吸道感染等诱发因素
- B.生活规律、劳逸结合
- C.遇到流感流行时使用抗生素预防感染(正确答案)
- D.坚持冷水洗脸
- E.坚持适度的运动，增强体质

5.患儿女,5岁,因患麻疹在家隔离治疗,社区护士指导家长消毒隔离措施不正确的是() [单选题] *

A.房间应经常通风换气

B.隔离至出疹后5天

C.患儿衣被及玩具等在阳光下暴晒2小时

D.家长护理患儿后,须在流动空气中停留30分钟以上,才能去邻居家

E.接触的易感患儿需隔离观察7天(正确答案)

6.患儿,男,3岁,发热,体温 39.2°C ,面部及躯干可见皮疹,诊断为麻疹,护士为其家属进行健康教育时,不正确的是() [单选题] *

A.多饮开水

B.勤剪指甲,防止抓伤皮肤

C.保持呼吸道通畅

D.保持病室通风,空气清新

E.应用酒精擦浴降温(正确答案)

7.对无并发症的急性腮腺炎患儿,正确的隔离方式是() [单选题] *

A.保护性隔离

B.接触性隔离

C.血液隔离

D.消化道隔离

E.家中隔离(正确答案)

8.丙型肝炎的主要传播途径是() [单选题] *

A.粪-口传播

B.水传播

C.食物传播

D.血液传播(正确答案)

E.媒介传播

9.戊型病毒性肝炎的主要传播途径是（） [单选题] *

A.血液传播

B.虫媒传播

C.接触传播

D.呼吸道传播

E.粪-口传播(正确答案)

10.患者，男，32岁，因患急性黄疸型肝炎住院，此时进行的护理措施，不妥当的是（） [单选题] *

A.接触患者应穿隔离衣

B.患者的排泄物直接倒入马桶冲掉(正确答案)

C.给予低脂肪食物

D.护理患者前后均应洗手

E.患者剩余的饭菜可用漂白粉混合搅拌后倒掉

11.艾滋病患者需要吸痰时，做法错误的是（） [单选题] *

A.吸痰前洗手，戴好口罩、护目镜

B.吸痰前穿好隔离衣

C.不与其他病人共用中心吸引系统

D.吸痰后吸痰管误落在地上，立即进行地面的清洁处理(正确答案)

E.用过的吸痰管及纱布装入高危袋中焚烧

12.流行性乙型脑炎极期最严重的三种症状是（） [单选题] *

A.高热意识障碍 呼吸衰竭

B.意识障碍 呼吸衰竭 循环衰竭

C.高热 惊厥 呼吸衰竭

D.高热 惊厥 循环衰竭(正确答案)

E.惊厥 呼吸衰竭 循环衰竭

13.患者男，35岁，因高热急诊入院。T39.5℃，主诉头痛、恶心、呕吐和嗜睡，并有颈项强直，该断为流行性乙型脑炎，应采取的隔离方式是（） [单选题] *

A.肠道隔离

B.昆虫隔离(正确答案)

C.接触性隔离

D.呼吸道隔离

E.保护性隔离

14.患儿男，6岁。1天前突发高热，体温达39℃.并伴有咽痛，吞咽痛。今晨发现耳后，颈部及上胸部出现分布均匀的丘疹，舌头肿胀，呈杨梅舌。正确的护理措施是（） [单选题] *

A.严密隔离

B.呼吸道隔离(正确答案)

C.消化道隔离

D.保护性隔离

E.无需隔离

15.患儿女，5岁。发热、出疹3天，诊断为猩红热住院。医生嘱家长在病程2-3周时检查尿液，护士应向家属解释，检查的目的是（） [单选题] *

A.检查有无肾损害(正确答案)

B.为控制活动量提供依据

C.决定饮食调整方案

D.了解药物副作用

E.了解疾病恢复情况

16.针对猩红热患儿家长的健康指导，错误的做法是（） [单选题] *

A.急性期绝对卧床休息1周

- B.疹退后脱皮时不可强行剥离
- C.隔离患儿至咽拭子培养 3 次阴性
- D.病程 2~3 周时做尿液检查(正确答案)
- E.发热期间给予半流质营养饮食

17.患者，女性，32 岁。一日前饮用不洁水后突发高热，继而出现腹痛、腹泻和里急后重感，出现黏液脓血便，诊断为急性细菌性痢疾，在治疗药物使用中不正确的是（） [单选题] *

- A.诺酮类药物是目前相对理想的药物
- B.孕妇及儿童应慎用诺酮类药物
- C.应积极分离病原菌并行药物敏感试验
- D.TMPSMZ 耐药虽然增强，但对多数病人仍有效
- E.青霉素为治疗首选药物(正确答案)

18.流行性脑脊髓膜炎患者典型的皮肤黏膜体征是（） [单选题] *

- A.瘀点、瘀斑(正确答案)
- B.色素沉着
- C.白斑
- D.发绀
- E.黄疸

19. 患儿，女，8 个月，体温 40.2℃，表现为哭闹、抽搐、呕吐、尖声哭叫、囟门隆起等，诊断为流行性脑脊髓膜炎，该患儿为流行性脑脊髓膜炎的哪一临床类型（） [单选题] *

- A.慢性败血症型
- B.轻型
- C.暴发型
- D.重型
- E.普通型(正确答案)

20. 小儿受结核杆菌感染至 PPT 试验阳性的时间为 () [单选题] *

A. 2~4 周

B. 4~8 周 (正确答案)

C. 10~12 周

D. 8~10 周

E. 12~16 周

21. 患儿男, 因早产住院, 现已 3 个月大, 需补种卡介苗, 护士应该做的是 () [单选题] *

A. 告诉患儿家属不宜补种

B. PPD 试验阴性再接种 (正确答案)

C. 直接补种

D. 与百白破疫苗同时接种

E. 减少接种剂量

22. 患者女性, 59 岁。因间断咳嗽、咳痰 5 年, 加重伴咯血 2 个月入院。入院后诊断为浸润型肺结核, 给予肌注链霉素, 口服利福平、雷米封等治疗。链霉素治疗的不良反应是 () [单选题] *

A. 肝脏损害

B. 眩晕、听力障碍 (正确答案)

C. 胃肠道刺激

D. 球后视神经炎

E. 周围神经炎

23. 患者女, 33 岁干咳伴乏力、低热、夜间盗汗、体重减轻 2 个月有余。X 线片: 右上肺阴影。疑诊断为肺结核收住院。在治疗过程中, 患者突然大量咯血出现窒息, 应采取的体位是 () [单选题] *

A. 右侧卧位

B. 左侧卧位

C.俯卧位(正确答案)

D.仰卧位

E.坐位

24.确诊肺结核病人最可靠的检查方法是（） [单选题] *

A.问病史

B.查体

C.痰查结核菌(正确答案)

D.X线检查

E.B超

25.患者男，30岁，咳嗽3个月，咳白色黏痰，内带血丝，午后低热，面颊潮红，疲乏无力，常有心悸，盗汗，较前消瘦，痰结核菌素试验阳性，对该患者的护理措施，正确的是（） [单选题] *

A.做好用具、餐具、病室和痰的消毒(正确答案)

B.加强活动锻炼，增强体质

C.服药至症状消失

D.到室外晒太阳

E.不需隔离

26.对肺结核咯血患者的护理措施，错误的是（） [单选题] *

A.消除紧张情绪

B.卧床休息，尽快止血

C.保持呼吸道通畅，预防窒息

D.协助患者健侧卧位，轻拍患者后背刺激咳嗽(正确答案)

E.必要时遵医嘱给予小剂量镇静、镇咳药

27.膝关节单纯滑膜结核患者除全身治疗外，局部治疗首选的方法是（） [单选题]

*

- A.膝关节加压融合术
- B.石膏固定
- C.穿刺抽脓，注入链霉素或异烟肼(正确答案)
- D.膝关节病灶清除术
- E.皮肤牵引

28.以膀胱刺激症状为主要临床表现的疾病（） [单选题] *

- A.肾肿瘤
- B.肾炎
- C.多囊肾
- D.肾结核(正确答案)
- E.肾结石

29.麻疹患者在出疹期首先出现皮疹的部位是（） [单选题] *

- A.前额、面、颈
- B.耳后、发际(正确答案)
- C.胸、背
- D.胸、腹
- E.四肢

30.早期诊断麻疹最有价值的依据是（） [单选题] *

- A.全身斑丘疹
- B.麻疹黏膜斑(正确答案)
- C.呼吸道卡他症状
- D.颈部淋巴结肿大
- E.1周前有麻疹接触史

31.水痘皮肤病变的病理特征是（） [单选题] *

- A.仅限黏膜

B.仅限表皮(正确答案)

C.仅限真皮

D.可侵及皮下组织

E.可侵及肌层

32. 3岁患儿，未患过水痘。现该患儿班级里出现水痘患儿。该患儿应在家隔离观察的时间是（） [单选题] *

A.1周

B.2周

C.3周(正确答案)

D.4周

E.5周

33.流行性腮腺炎的潜伏期平均为（） [单选题] *

A.6天

B.9天

C.12天

D.15天

E.18天(正确答案)

34.患有流行性腮腺炎患儿具有传染性的时段为（） [单选题] *

A.腮腺肿大前1日至消肿后3天(正确答案)

B.腮腺肿大前1天至出疹后5天

C.腮腺肿大前2天至出疹后5天

D.腮腺肿大前3天至出疹后9天

E.腮腺肿大期

35.患者男，28岁.在出差途中，不幸感染急性甲型肝炎在外地住院，他需要将自己生病的情况告知家人，于是给家里写信，他的信件应该用何种方法处理后再寄

[单选题] *

- A.高压蒸汽灭菌
- B.甲醛熏蒸柜熏蒸(正确答案)
- C.用紫外线照射
- D.用氯胺溶液喷雾
- E.过氧乙酸擦拭

36.为丙型肝炎患者抽血做肝功能检查,抽血后护士消毒双手正确的是() [单选题] *

- A.刷洗范围应在污染范围内
- B.流动水冲洗时,腕部应高于肘部
- C.洗手时,身体靠近洗手池
- D.双手共刷洗 2 分钟(正确答案)
- E.刷手毛刷可重复使用

37.患者男性,36岁。因吸食毒品后感染 HIV。2小时前因右下腹剧烈疼痛入院。入院后诊断为急性阑尾炎。现已接受手术治疗安返病房。术后病人意识清醒,病情平稳。针对该患者的护理措施,正确的是() [单选题] *

- A.将患者隔离在单间病房
- B.护士做任何操作均需戴手套
- C.告知患者应履行不感染他人的义务(正确答案)
- D.禁止患者与其他患者交流
- E.规定患者只能在规定的区域内活动

38.患者男性,36岁。因吸食毒品后感染 HIV。2小时前因右下腹剧烈疼痛入院。入院后诊断为急性阑尾炎。现已接受手术治疗安返病房。术后病人意识清醒,病情平稳。护士为该患者更换被血液污染的被单,正确的做法是() [单选题] *

- A.直接更换,更换后洗手
- B.选择戴手套并且操作后洗手(正确答案)

- D.手部皮肤完好可不戴手套
- E.直接更换，更换后消毒手

39.患者女性，38岁，身高160cm，体重45kg。因肺结核咯血收入院。夜班护士查房时发现该患者咯血约200ml后突然中断，呼吸极度困难，喉部有痰鸣音，表情恐怖，两手乱抓，眼球上翻，发绀。护士应判断患者最可能发生了（） [单选题] *

- A.出血性休克
- B.窒息(正确答案)
- C.肺不张
- D.肺部感染
- E.贫血

40.患者女性，59岁。因间断咳嗽、咳痰5年，加重伴咯血2个月入院。入院后诊断为浸润型肺结核，给予肌注链霉素，口服利福平、雷米封等治疗。上述病人痰液的最佳处理方法是（） [单选题] *

- A.消毒灵浸泡
- B.紫外线消毒
- C.痰吐在纸上用火焚烧(正确答案)
- D.甲酚消毒
- E.酒精消毒

41.患者，男，70岁。患肺结核20年，近年来病情反复，经常咯血，表现为烦躁，焦虑。护士在护理过程中，应注意的是（） [单选题] *

- A.高流量高浓度吸氧
- B.患者咯血期间可进温软饮食
- C.采取健侧卧位
- D.讲解疾病知识，给予鼓励和帮助(正确答案)

42.患者男性，38岁，有肺结核病史2年，突然咯血300ml，口唇紫绀。查体：神志清，心率100次/分，律齐，血压105/85mmHg，右肺可闻及湿罗音。首先的抢救措施是（） [单选题] *

- A.气管切开
- B.呼吸机辅助呼吸
- C.立即使用呼吸兴奋剂
- D.吸氧
- E.头低脚高位，清理呼吸道血块(正确答案)

43.男婴，1岁，未接种过卡介苗，PPD试验中度阳性，家长向护士询问原因，护士给予的正确解释是（） [单选题] *

- A.未感染过结核
- B.曾感染过结核
- C.近1周感染过结核
- D.对结核有免疫力
- E.体内有新的结核病灶(正确答案)

44.关于结核菌素试验的描述，正确的是（） [单选题] *

- A.小儿PPD阳性表示体内有活动性结核
- B.小儿PPD强阳性表示体内有活动性结核(正确答案)
- C.PPD阳性表示病情较重
- D.PPD硬结5mm以上为强阳性
- E.PPD强阳性表示曾接种过卡介苗

45.我国法定传染病为（） [单选题] *

- A.三类，36种
- B.三类，39种(正确答案)

37 种

D、三类，35 种

E、三类，40 种

46.下列哪一组标志物代表乙肝“大三阳”：（） [单选题] *

A、HBsAg 抗-HBc 抗-HBs

B、HBsAg HBeAg 抗-HBe

C、HBsAg HBeAg 抗-HBc(正确答案)

D、HBsAg 抗-HBe 抗-HBc

E、HBsAg 抗-HBa 抗-HBc

47.表示乙肝病毒复制活跃，传染性强的血清指标是：（） [单选题] *

A、HBsAg

B、HBeAg(正确答案)

C、抗-HBc

D、抗-HBe

E、抗-HBa

48.新冠病毒感染饮食营养专家建议：适量多饮水，每天不少于 ___ml（） [单选题] *

A.500

B.1000

C.1500(正确答案)

D.2000

E.1800

49.需要严格执行新冠肺炎筛查流程的是（） [单选题] *

A.所有来院的发热病人(正确答案)

B.所有来院病人

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/89705106000006156>