卫生系统招聘考试护理学专业知识(习题卷54)

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共84题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]传染病预防、控制预案应当不包括以下主要内容：()
A)传染病预防控制指挥部的组成和相关部门的职责；
B)疾病预防控制机构、医疗机构在发生传染病疫情时的任务与职责；
C)传染病预防、疫点疫区现场控制，应急设施、设备、救治药品和医疗器械以及其他物资和技术的储备与调用。
D)收集、分析和报告传染病监测信息，预测传染病的发生、流行趋势；

2.[单选题]又称原发性缺水的是
A)低渗性缺水
B)高渗性缺水
C)等渗性缺水
D)水中毒

3.[单选题]输血引起溶血反应，最早出现的主要表现为
A)头部胀痛、面部潮红、腰背部剧痛
B)寒战、高热
C)少尿
D)瘙痒、皮疹
E)呼吸急促、血压下降

4.[单选题]男性，25岁，车祸伤1小时。查体：脉搏130次/分，血压86/60mmHg.烦躁不安，发绀，严重呼吸困难，皮肤湿冷，左颈胸部皮下捻发感，气管右移，左胸饱满，左肺呼吸音消失。胸片示左肺完全萎陷。经急救处理，病情好转后又迅速恶化。此时治疗应立即
A)气管切开
B)清除呼吸道分泌物
C)左胸膜腔闭式引流
D)静脉快速输血补液
E)多头胸带包扎固定胸壁

5.[单选题]女性，65岁，咳嗽、咳痰伴发热3天，意识不清4小时，否认糖尿病史，高血压史12年在抢救治疗酮症酸中毒过程中，为避免发生低血糖反应，应及时静脉滴注葡萄糖溶液，血糖下降至何种说平时加用葡萄糖溶液：
A)8. 3mmol/L
B)11. 1mmol/L
C)6. 7mmol/L
D)13. 9mmol/L
E)5. 6mmol/L

6.[单选题]属门静脉属支的是（ ）
A)直肠下静脉
B)肠系膜下静脉

C)卵巢静脉
D)肾静脉
E)肝静脉

7.[单选题]病区护理管理的核心是
A)护理质量管理
B)患者管理
C)病区环境管理
D)探视的管理
E)陪护的指导与管理

8.[单选题]男性，28岁，心慌、怕热、多汗、消瘦、易饿4个月，甲状腺弥漫性I度肿大，血TSH降低、T3和T4增高，诊为甲亢。他巴唑每天30mg，20天后血白细胞2．2×10^9／L，中性粒细胞1．0×10^9/L。甲亢的下一步治疗宜选
A)他巴唑剂量减半再用
B)严密观察，减少他巴唑用量，并用升白细胞药
C)改用丙基硫氧嘧啶
D)核素131I治疗
E)立即手术治疗

9.[单选题]下列适合非手术治疗的是
A)绞窄性肠梗阻
B)肿瘤性肠梗阻
C)肠道畸形性肠梗阻
D)肠套叠
E)痉挛性肠梗阻

10.[单选题]男性，43岁，肝炎肝硬化病史5年，出现腹水1年，一周来低热伴轻度腹痛，腹水明显增多。腹水检查：淡黄色，比重1.017，蛋白26g/L，白细胞数500X106/L，中性粒细胞0.80。最可能的诊断是肝硬化合并
A)结核性腹膜炎
B)原发性肝癌
C)自发性腹膜炎
D)门静脉血栓形成
E)肝肾综合征

11.[单选题]男性，40岁，腹水一个月，6天前反复呕血，黑便，经抢救治疗后好转稳定，近日来嗜睡、认人不清，最合适的诊断是
A)肝性脑病
B)脑血管意外
C)脑炎
D)尿毒症
E)糖尿病昏迷

12.[单选题]主诉头痛，头晕20天，加重伴烦躁，呕吐，1天入院，查体，嗜睡，血压110／80mmHg，头部MRI显示第四脑室肿瘤，伴幕上脑室扩大。该患者可能发生的脑疝为
A)大脑镰疝
B)小脑幕切迹疝
C)小脑幕切迹上疝
D)枕骨大孔疝
E)脑中心疝

13.[单选题]婴幼儿化脓性脑膜炎最常见的病原体是

A)大肠埃希菌
B)脑膜炎双球菌
C)金黄色葡萄球菌
D)溶血性链球菌
E)轮状病毒

14.[单选题]诊断肝性脑病最有价值的实验室检测项目是()
A)血钾
B)血钠
C)血尿素
D)血肌酐
E)血氨

15.[单选题]男性，36岁，十二指肠溃疡穿孔修补术后5天，腹胀痛不适，恶心停止排气排便，查体:全腹胀，未见肠型，全腹压痛尤其以右下腹明显，轻度肌紧张，肠鸣音消失，血常规，白细胞11×109/L，中性86%，腹部X线平片，肠腔积气并可见小液气平面，应考虑为
A)急性阑尾炎
B)十二指肠溃疡穿孔
C)粘连性肠梗阻
D)麻痹性肠梗阻
E)弥漫性腹膜炎

16.[单选题]肝硬化患者近日发热，全腹压痛，抽出腹水混浊，为有效合理治疗，应尽快采取的措施为
A)腹水细菌培养
B)血细菌培养
C)腹水涂片染色查细菌
D)腹部平片
E)抗生素早期联合应用

17.[单选题]48岁，男性，肝硬化患者，有腹水。不规则服用利尿剂治疗，二天来出现嗜睡。体检：轻度黄疸，测血钠120mmol/L，血钾2.6mmol/L，氯化物92mmol/L，BUN 10mmol/L，血pH 7.5患者肝昏迷的诱因是
A)黄疸
B)低血钠
C)低血钾
D)酸中毒
E)氮质血症

18.[单选题]新生儿期保健的重点应放在
A)生后24小时内
B)生后第1周
C)生后头10天
D)生后头2周
E)生后头3周

19.[单选题]胆道出血的特点是：
A)来势凶，出血量大
B)置三腔二囊管后可止血
C)口服止血剂可有效止血
D)病情急，发作时无腹痛、发热及黄疸
E)反复发作，呈周期性，可自行停止或引起休克

20.[单选题]女，20岁，双下肢出现散在淤斑，伴有陈旧性出血点。查：Hb136g／L ，WBC8X109／L，PLT 50×109／L。骨髓检查巨核细胞150个／片，有成熟障碍，首选的治疗是：
A)输血小板
B)酚磺乙胺
C)糖皮质激素.
D)免疫抑制剂
E)脾切除术

21.[单选题]术中发现病变为实质性结节，最好做
A)结节摘除术
B)腺体大部切除术
C)全侧腺体切除术
D)腺体大部分切除加冰冻切片检查
E)一侧颈部淋巴扩清术

22.[单选题]男，33岁，反复腹痛10年，表现为右下腹和脐周为主的绞痛，伴有糊状泻，无脓血，并时有低热。体检发现右下腹包块。该患者的诊断应首先考虑
A)溃疡性结肠炎
B)结肠癌
C)Crohn病
D)肠梗阻
E)肠穿孔

23.[单选题]决定微循环营养通路周期性开闭的主要因素是()
A)血管升压素
B)肾上腺素
C)去甲肾上腺素
D)血管紧张素
E)局部代谢产物

24.[单选题]胃、十二指肠溃疡穿孔病人术前护理哪项不正确
A)禁食、禁饮
B)胃肠减压
C)严密观察生命体征和腹部情况
D)应用抗生素和止痛药
E)应用止痛药

25.[单选题]下列哪一项不是风湿热的主要表现：
A)血沉增快
B)心脏炎
C)皮下结节
D)环形红斑
E)舞蹈病

26.[单选题]在一个心动周期中，二尖瓣开放始于()
A)等容收缩期初
B)等容收缩期末
C)心室射血期初
D)等容舒张期初
E)等容舒张期末

27.[单选题]患者男性，22岁。因低热半个月，呼吸困难1天入院。查体：端坐位，颈静脉怒张，心率130次／分，心音低钝。X线检查：肺野清晰，心影弧度消失。诊断最可能是
A)扩张型心肌病
B)感染性心内膜炎
C)渗出性心包炎
D)病毒性心肌炎
E)法洛四联症

28.[单选题]区别轻、重型婴儿腹泻的主要指标是
A)病程长短
B)热度高低
C)大便次数
D)呕吐次数
E)有无水、电解质紊乱

29.[单选题]关于输血速度的描述，下列哪个是错误的
A)除儿童外，一般调节在每分钟4-6ml
B)心脏病人宜每分钟1ml
C)小儿每分钟约10滴
D)对失血性休克，应快速输人所需血量
E)对血容量正常的贫血，每次输血以200-400ml为宜

30.[单选题]眼经过充分发挥调节作用能够看清眼前物体的最近点，称为()
A)主点
B)节点
C)近点
D)远点
E)焦点

31.[单选题]下列哪项属于甲类传染病()
A)狂犬病
B)麻疹
C)肺结核
D)麻风病
E)霍乱

32.[单选题]男，26岁，右下腹持续性疼痛3天，并渐遍及全腹，伴发热2天，查体：全腹紧张有压痛和反跳痛，右下腹尤为显著，肠鸣音弱，血白细胞和中性粒细胞均增高，其诊断首先应考虑为
A)急性胰腺炎
B)急性肠系膜淋巴结炎
C)阑尾炎穿孔并发腹膜炎
D)急性化脓性胆管炎
E)溃疡病急性穿孔

33.[单选题]正常情况下原尿在肾小管中被吸收的部分占总量的：
A)95％
B)90％
C)99％
D)50％
E)30％

34.[单选题]有关美国麻醉医师协会（ASA）分级下列哪项正确
A)I级病人病情最重，Ⅴ级最轻
B)Ⅲ级病人的器官功能已受损但在代偿范围内
C)Ⅴ级病人风险大，但仍可考虑行择期手术
D)体格健康，发育营养良好各器官功能正常属Ⅱ级
E)I级病人无手术死亡率

35.[单选题]鼻导管给氧，下列哪项步骤不妥
A)导管插入长度为鼻尖至耳垂长度的2／3
B)导管用液状石蜡润滑
C)导管每天更换1～2次
D)氧气筒放置距暖气1m
E)停用时先取下鼻导管，再关氧气开关

36.[单选题]胃蛋白酶失去活性的最低pH值是
A)2. 0
B)3. 0
C)4. 0
D)5. 0
E)6. 0

37.[单选题]男性，30岁，腰椎3-4结核经非手术治疗半年遗留腰痛。X线示：无死骨和脓肿，病灶边缘清晰。影像学显示，患椎有不稳。宜采用的治疗是：
A)继续抗结核药物治疗
B)石膏背心固定
C)病灶清除术
D)脊柱植骨融合
E)病灶清除+冲洗术

38.[单选题]高排低阻型休克最常见于()
A)感染性休克
B)烧伤性休克
C)心源性休克
D)失血性休克
E)创伤性休克

39.[单选题]水肿型胰腺炎与出血坏死型胰腺炎的主要鉴别点是
A)发热
B)休克
C)剧烈腹痛、腹部体征
D)恶心、呕吐
E)电解质紊乱

40.[单选题]胃癌首选的治疗方法是()
A)中医中药治疗
B)放射治疗
C)化疗
D)手术治疗
E)免疫治疗

41.[单选题]急性肠梗阻行肠切除肠吻合术后早期，正确的护理措施为

A)绝对卧床，制动
B)及早进食
C)灌肠
D)低盐、低脂饮食
E)胃肠减压

42.[单选题]骨盆测量数值低于正常值的是
A)髂嵴间径28cm
B)骶耻外径19cm
C)出口后矢状径7.5cm
D)髂嵴间径25cm
E)坐骨结节间径9cm

43.[单选题]心力衰竭时下述减轻心脏负荷的治疗措施中，不正确的是
A)根据病情适当安排休息活动
B)绝对卧床休息
C)控制钠盐摄入
D)合理应用利尿剂
E)合理应用血管扩张剂

44.[单选题]下列心律失常中，最严重的是
A)室性心动过速
B)室上性心动过速
C)偶发室性期前收缩
D)房性期前收缩
E)心房颤动

45.[单选题]女性，38岁，因头痛伴呕双眼视物不清4个月，入院，查体，神清，视力：左眼0．3，右眼大致正常，眼底：左视乳头边缘色淡，右视乳头边缘不清，乳头隆起2D。首先应检查
A)视野
B)脑电图
C)脑脊液免疫蛋白
D)头颅CT或MRI
E)脑血管造影

46.[单选题]消除毒性弥漫性甲状腺肿症状，不降低甲状腺分泌甲状腺激素的药物是：
A)A．甲基硫氧嘧啶
B)B．心得安
C)C．碘剂
D)D．131I
E)E．碳酸锂

47.[单选题]直肠指检，扪到条索状，伴有轻压痛，挤压时外口有脓性分泌物流出者应考虑
A)内痔
B)肛瘘
C)外痔
D)直肠息肉
E)直肠癌

48.[单选题]男性，32岁，幽门梗阻7天，行胃肠减压及输液治疗后，全身乏力，脉搏细数，120/分，血Na+125mmol/L，Cl－89mmol/L，K+3．0mmol/L，CO2CP32mmol/L。最可能存在哪种酸碱失衡：

A)呼吸性酸中毒
B)呼吸性碱中毒
C)代谢性酸中毒
D)代谢性碱中毒
E)都不是

49.[单选题]患者女性，25岁。有性接触史，近3个月来发热、咳嗽、喘憋，疑为肺炎，经多种抗生素治疗无效，全身状况日渐衰竭，全身淋巴结肿大，为确诊首先考虑的检查是
A)痰培养
B)肺功能
C)胸部CT
D)胸部X线检查
E)HIV抗体测定

50.[单选题]有机磷中毒者呼出气体有
A)苦杏仁味
B)酒味
C)蒜臭味
D)苯酚味
E)烂苹果味

51.[单选题]头部被石块砸伤为：
A)加速性损伤
B)减速性损伤
C)挤压伤
D)挥鞭样损伤
E)颅颈连接处损伤

52.[单选题]骨盆骨折后造成的腹膜后血肿不易蔓延至:
A)肠系膜根部
B)肾区
C)膈下
D)侧腹壁
E)坐骨直肠窝

53.[单选题]结核性脑膜炎最简便的确诊方法是
A)脑脊液做豚鼠接种
B)结核菌素试验
C)脑脊液做结核菌培养
D)脑脊液沉渣或薄膜涂片找结核菌
E)头颅CT

54.[单选题]男性，28岁，反复右下腹痛，腹泻，低热半年，结肠镜检查见回盲部粘膜充血、水肿，溃疡形成，活检找到干酪样坏死性肉芽肿。该患者的诊断是
A)Crohn病
B)溃疡性结肠炎
C)肠结核
D)阿米巴痢疾
E)结肠癌

55.[单选题]Dixon手术适用于肿瘤距齿状线的距离是

A)5cm以上
B)4cm以上
C)3cm以上
D)2cm以上
E)1cm以上

56.[单选题]单纯性机械性肠梗阻可采用
A)充分准备后胃大部切除术
B)抗生素治疗、
C)立即手术，去除病因
D)先采用非手术治疗
E)腹部热敷

57.[单选题]患儿男，13岁。因高热、头痛、呕吐入院。查体：T40.2℃，皮肤散在淤血、瘀斑，脑膜刺激征阳性。对该患者的护理措施正确的是
A)消化道隔离
B)绝对卧床休息
C)给予高热量、低蛋白、高维生素饮食
D)频繁呕吐及意识障碍者给予胃管进食
E)病情观察时重点记录24小时出入量

58.[单选题]男性，39岁，有先天性心脏病.房间隔缺损，慢性充血性心衰，长期服用地高辛，因呕吐.腹泻2天入院。心电图提示：频发室性期前收缩。下列哪项处理措施错误：
A)停用地高辛
B)静脉注射胺碘酮
C)补钾
D)静脉注射西地兰
E)多巴胺

59.[单选题]15岁女童，锐器割伤右前臂。检查时发现右腕不能抬起应考虑：
A)正中神经损伤
B)桡神经损伤
C)尺神经损伤
D)肌皮神经损伤
E)腋神经损伤

60.[单选题]肩周炎 ：
A)肩关节外展受限
B)肩部疼痛，无活动受限
C)肘关节外侧疼痛
D)肘关节活动受限
E)Fenkelstein征阳性

61.[单选题]下列哪种情况不是硬脊膜外腔麻醉的禁忌症
A)穿刺点皮肤感染
B)凝血机制障碍
C)休克
D)脊柱结核或严重畸形
E)高血压Ⅰ期

62.[单选题]小腿部骨髓炎后残余穴豆道，多年不愈，边缘隆起，易出血，为明确诊断最好采用：

A)切除活检
B)穿刺活检
C)脱落细胞学检查
D)切取活检
E)以上都不是

63.[单选题]初产妇26岁,因妊娠36周,无痛性阴道少量流血3天来院就诊,检查:LOA,胎心140次/分,无明显宫缩,诊断为低置胎盘入院,恰当处理是:
A)绝对卧床休息,期待疗法
B)立即人工破膜
C)静滴催产素引产
D)行剖宫产术
E)以上都不是

64.[单选题]患儿女，12岁。因流行性脑脊髓膜炎人院。患者突然出现昏迷、潮式呼吸、一侧瞳孔扩大，应立刻
A)静脉滴注呋塞米
B)静脉滴注地塞米松
C)静脉滴注20%甘露醇
D)气管插管
E)使用人工呼吸机

65.[单选题]支气管痉挛时心率加快，哪种药物禁用？
A)阿托品
B)氨茶碱
C)氯胺酮
D)地塞米松
E)氨酰心胺

66.[单选题]患者男性， 24 岁，高热、流涕、咳嗽 4 天，于 2001 年 4 月 7 日入院。入院 1 天后出现呼吸困难，胸部 X 线片示双肺透亮度降低，经抗感染治疗患者症状不见缓解，呼吸困难进一步加重，胸部 X 线片示双肺呈白肺， R35 次／分，血气分析 (FiO229 %) 示 pH7.35， PaO256mmHg ， PaCO236mmHg 根据目前患者的病理生理状态，需紧急采用的是
A)高浓度吸氧
B)安慰患者
C)接面罩行无创通气
D)气管插管行有创通气
E)紧急输血

67.[单选题]患者女性，32岁，头痛一年半，近2个月头痛加重，伴有喷射性呕吐。烦躁后出现意识障碍，右侧瞳孔缩小，后又散大，光反应迟钝，左侧肢体运动障碍。呼吸加快。CT示左顶叶肿瘤。紧急抢救措施应是
A)立即开颅切除肿瘤
B)20%甘露醇静脉注射
C)脑脊液体外引流
D)去颅骨瓣减压
E)气管插管，保持呼吸道通畅

68.[单选题]腹部手术后3～4日最常见的并发症有
A)切口感染
B)切口裂开
C)肺不张
D)急性胃扩张

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/897111033016006110