

2024 年甘肃省西和县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库完整参考答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 可降低性传播疾病感染风险的个体避孕措施是

- A: 宫内节育器
- B: 口服复方短效避孕药
- C: 外用杀精剂
- D: 使用避孕套

答案：D

2. “发现并确认‘仙牛健骨颗粒’III期临床试验过程中连续发生严重不良事件，即暂停其新药试验”显示药物警戒的作用是

- A: 发现与规避假、劣药品流入市场
- B: 药品上市后风险评估
- C: 发现药品质量问题
- D: 药品上市前风险评估

答案：D

3. 女性，32 岁，3 年来月经量多，乏力、心悸。检查面色较苍白。血红蛋白 80g/L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 7×10^9

- A: 维生素 B
- B: 右旋糖酐铁肌注
- C: 输血
- D: 硫酸亚铁口服

答案：D

4.（2017 年真题）患者，男，59 岁，哮喘病史 8 年，近日因急性脑梗死就诊住院治疗 2 周后出院。对于该患者脑血管病的二级预防，宜选用的抗血小板药物是（）

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 氯吡格雷
- C: 阿司匹林
- D: 华法林

答案：B

5. 根据药物对胎儿的危害，美国 FDA 将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别属于妊娠毒性 B 级的药物是

- A: 万古霉素
- B: 葡萄糖
- C: 沙利度胺
- D: 阿莫西林

答案：D

6. 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重中枢神经系统疾病，引起药源性疾病的因素主要为

- A: 基础疾病因素
- B: 性别因素
- C: 年龄因素
- D: 遗传因素

答案：A

7. 易引起冠脉痉挛、心肌缺血的药物是

- A: 紫杉醇
- B: 环磷酰胺
- C: 氟尿嘧啶
- D: 阿霉素

答案：C

8. 静脉注射给药的外文缩写是

- A: iv
- B: i.h
- C: im
- D: ivgtt

答案：A

9. 患者,女,68岁,体重45kg,因发热、咳嗽咳痰入院治疗,临床诊断为社区获得性肺炎。化验结果:白细胞计数 $11.76 \times 10^9/L$,肌酐清除率 18ml/min。该患者使用下列抗菌药物治疗时不需要减量的是()

- A: 莫西沙星
- B: 阿莫西林
- C: 头孢噻肟钠
- D: 左氧氟沙星

答案：A

10. 格列本脲

- A: 宜餐后服用
- B: 宜清晨服用
- C: 宜睡前服用
- D: 宜餐前服用

答案：D

11. 口服用于肠道感染或肠道手术前准备的药物是

- A: 新霉素
- B: 妥布霉素
- C: 异烟肼
- D: 庆大霉素

答案：D

12. 一些药物的副作用是嗜睡、眩晕、视力模糊或定向力障碍等；为安全起见驾驶员应该

- A: 开车前 4 小时服用
- B: 开车前 4 小时慎用
- C: 开车前 2 小时慎用
- D: 开车前 2 小时服用

答案：B

13. 三环类抗抑郁药的致死量通常高于

- A: 1.5g
- B: 1g
- C: 2.5g
- D: 2g

答案：D

14. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及嗝气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有一 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

A: 左氧氟沙星 500mgqd+呋喃唑酮 100mgbid+四环素 500mgqid+枸橼酸铋钾 220mgbid，疗程 2 周

B: 四环素 500mg tid+甲硝唑 400mg tid+艾司奥美拉唑 20mg bid+枸橼酸铋钾 220mg bid，疗程 2 周

C: 克拉霉素 500mg bid+左氧氟沙星 200mg bid+甲硝唑 400mg qid+艾司奥美拉唑 20mg bid，疗程 2 周

D: 阿莫西林 1000mg bid+克拉霉素 500mg bid+艾司奥美拉唑 20mg bid+枸橼酸铋钾 220mg bid，疗程 2 周

答案：B

15. 高三酰甘油血症，首选的治疗药物是

A: ω -3 脂肪酸制剂

B: 贝特类

C: 烟酸类

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 他汀类

答案：B

16. 同时患有滴虫及念珠菌性阴道炎应首选的药品是

A: 曲古霉素

B: 甲硝唑

C: 硝酸咪康唑

D: 制霉菌素

答案：A

17. (2015 年真题) 患者，男，28 岁，2 天前因淋雨后出现发热，体温最高达 39℃，经实验室和胸片检查，临床诊断为社区获得性肺炎，无其他基础疾病。可首选的抗菌药物是 ()。

A: 阿米卡星

B: 头孢拉定

C: 亚胺培南西司他丁

D: 头孢哌酮舒巴坦

答案：B

18. 适宜于餐中给药的药物是

A: 复方铝酸铋

B: 法莫替丁

C: 二甲双胍

D: 缬沙坦

答案：C

19. (2015 年真题) 细菌感染腹泻患者宜选用 ()。

A: 干酵母

B: 乳果糖

C: 小檗碱

D: 阿苯达唑

答案：C

20. 患者，男，35 岁。于午饭后即开始出现胃部疼痛，胀满食少，后感觉脐周硬结、闷痛、拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因蛋白质进食过多而导致的继发性消化不良。

- A: 小檗碱
- B: 碳酸氢钠
- C: 双八面体蒙脱石散
- D: 胰酶

答案：D

21. 用于治疗溃疡性结肠炎，应多饮水，保持高尿流量，以防结晶尿的发生，必要时服用碳酸氢钠碱化尿液的药物是

- A: 格列吡嗪
- B: 阿卡波糖
- C: 二甲双胍
- D: 西格列汀

答案：A

22. 患者，男，45 岁，患有高血压，因感冒发热，咽痛，流鼻涕到药店买药，药师不应推荐其使用的药物是()

- A: 速克感冒片
- B: 复方酚咖伪麻胶囊
- C: 速感宁胶囊
- D: 维 C 银翘片

答案：B

23. 并不存在风险，目前不需采取措施；评判为

- A: 驳倒
- B: 待验证

C: 验证

D: 确认

答案: A

24. 归属专业学术机构网站的是

A: www.cmt.com.cn

B: www.ashp.org

C: www.merck.com

D: www.google.com

答案: B

25. 与阿米卡星合用会影响其排泄导致急性肾损害的药物是()

A: 铝碳酸镁

B: 阿司匹林

C: 维生素 B

D: 伏立康唑

答案: B

26. 可引起儿童良性颅压增高、囟门隆起的药物是

A: 抗组胺药

B: 氯霉素

C: 维生素 A

D: 苯妥英钠

答案: C

27. 对于铁剂的使用，正确的为（）

A: 待血红蛋白恢复正常后，仍需继续服 3~4 个月

B: 口服铁剂宜选用三价铁

C: 需要快速补铁的情况下，可以选择口服治疗

D: 碳酸氢钠抑制铁剂吸收

答案：D

28. 解热镇痛药用于退热属于对症治疗，因此两次用药的间隔时间应该是

A: 4~6 小时

B: 5~7 小时

C: 3~5 小时

D: 2~4 小时

答案：A

29. 不需要向指定的药品经营单位采购，但需要向具有相关药品经营资质企业购买的是

A: 高警示药品

B: 第二类精神药品

C: 贵重药品

D: 麻醉药品和第一类精神药品

答案：B

30. 医师开具处方应当使用

A: 通用名、商品名、卫计委公布的药品习惯名称

B: 通用名、商标名、商品名

C: 通用名、新活性化合物的专利药品名称、卫计委公布的药品习惯名称

D: 通用名、商标名、新活性化合物的专利药品名称

答案：C

31. 患者，男，59 岁，哮喘病史 8 年，近日因急性脑梗死就诊，住院治疗 2 周后出院。对于该患者脑血管病的二级预防，宜选用的抗血小板药物是

- A: 华法林钠
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 阿司匹林
- D: 氯吡格雷

答案：D

32. 服后不宜立刻饮水，以免冲淡药物

- A: 包衣片
- B: 粉剂
- C: 糖浆剂
- D: 胶囊剂

答案：C

33. 下列药物中，属于可逆性、选择性单胺氧化酶 A 抑制剂的是（）

- A: 吗氯贝胺
- B: 阿米替林
- C: 氟伏沙明
- D: 氯米帕明

答案：A

34. 针对儿童，最方便、最安全、最经济的给药途径

- A: 局部给药
- B: 口服给药
- C: 皮下注射
- D: 静脉给药

答案：B

35. 服用两咪替丁等 H₂ 受体阻断剂、地西泮等苯二氮革类药物应该禁用的是

- A: 酒
- B: 浓茶
- C: 食醋
- D: 烟

答案：D

36. 对 5 岁以下儿童高热时紧急退热，应该选用的药品是

- A: 20% 安乃近溶液滴鼻
- B: 20% 阿司匹林溶液滴鼻
- C: 布洛芬混悬液
- D: 贝诺酯混悬液

答案：A

37. (2017 年真题) 可能影响儿童骨骼发育的药物是 ()

- A: 头孢克洛
- B: 阿莫西林
- C: 诺氟沙星
- D: 复方磺胺甲噁唑

答案：C

38. 由国家基本药物临床应用指南和处方集编委会主编的是

- A: 《中国药典临床用药须知》
- B: 《医师案头参考》
- C: 《中国国家处方集》

D: 《国家基本药物处方集》

答案: D

39. 膀胱炎占尿路感染的 60%以上，致病菌多为

A: 金黄色葡萄球菌

B: 白假丝酵母菌

C: 淋病奈瑟菌

D: 大肠埃希菌

答案: D

40. 1%硫酸铜溶液催吐用于解救

A: 丙咪嗪中毒

B: 三唑仑中毒

C: 巴比妥中毒

D: 磷化锌中毒

答案: D

41. (2021 年真题) 避免与辛伐他汀合用的药物是 ()

A: 克拉霉素

B: 美罗培南

C: 头孢哌酮

D: 万古霉素

答案: A

42. “特异体质的患者及其家族成员可能发生过同样反应 (如药物过敏)”提示诊断药源性疾病必须

A: 致病药物的确定

B: 排除药物以外的因素

C: 流行病学的调查

D: 询问用药过敏史和家族史

答案: D

43. 最常用的解热镇痛药为

A: 塞来昔布

B: 谷维素

C: 阿司匹林

D: 对乙酰氨基酚

答案: D

44. (2017 年真题) 下列药物使用方式, 正确的是 ()

A: 硝酸甘油片在心绞痛发作的紧急情况下嚼碎用冰水送服

B: 氧氟沙星滴眼液打开使用后, 继续使用 3 个月

C: 酵母片在餐后整片用水送服

D: 乙酰半胱氨酸泡腾片用 100ml 温开水浸泡溶解后服用

答案: D

45. 分解尿酸成为可溶性产物, 可诱发抗体生成而使疗效下降, 尤其适用于放疗或化疗所致的高尿酸血症的药物是

A: 枸橼酸氢钾钠

B: 苯溴马隆

C: 拉布立酶

D: 非布司他

答案: C

46. 抗凝治疗

A: 阿司匹林

B: 低分子肝素

C: 巴曲酶

D: 阿替普酶

答案：B

47. 服用保泰松、水杨酸钠可呈现

A: 橘红至红色

B: 黄色

C: 红至黑色

D: 白陶土便

答案：C

48. 不能解除病因，不宜长期服用的；但对慢性钝痛如牙痛、头痛、关节痛等有较好的镇痛效果药物是

A: 阿司匹林

B: 谷维素

C: 罗通定

D: 地西泮

答案：A

49. 对乙酰氨基酚的妊娠毒性分级是（）

A: A 级

B: X 级

C: B 级

D: C 级

答案：C

50. (有关物质中毒的特效解毒剂)，有机氟中毒的特效解毒剂是

- A: 烯丙吗啡
- B: 维生素 K
- C: 乙酰胺
- D: 氯解磷定

答案：C

51. 实施静脉注射给药时，不宜选用 0.9% (g / ml) 氯化钠注射液做溶媒溶解的药品是

- A: 氟罗沙星
- B: 头孢菌素
- C: 苯妥英钠
- D: 阿昔洛韦

答案：A

52. 癫痫的药物治疗适用于各型癫痫的药物

- A: 丙戊酸钠
- B: 苯妥英钠
- C: 拉莫三嗪
- D: 卡马西平

答案：A

53. 肝肾两种途径清除的药物在严重肝功能减退时血药浓度升高

- A: 一般无须调整剂量
- B: 必须减量应用
- C: 须谨慎使用，必要时减量给药
- D: 尽可能避免使用

答案：B

54. 治疗结核病的患者的注意事项错误的是

- A: 充分了解抗结核药物服用中可能出现的不良反应，一旦出现要及时报告医生
- B: 增强体质增加高蛋白和维生素的摄入，日光浴
- C: 口服抗结核药可自行决定饭后服用
- D: 患者所用食具应于餐后煮沸消毒

答案：C

55. 药物警戒对用药安全具有重要作用。下列确认的用药不良事件中，属于发现药品使用环节问题的是

- A: “阿糖胞苷儿科事件”
- B: “亮菌甲素事件”
- C: “万络(罗非昔布)事件”
- D: “拜斯亭(西立伐他汀)事件”

答案：A

56. 用药期间饮酒可能出现“双硫仑样反应”的药物是 ()

- A: 美罗培南
- B: 克拉霉素
- C: 万古霉素
- D: 头孢哌酮

答案：D

57. 服药后 1h 内限制饮水的药物是

- A: 微生态制剂
- B: 镇静催眠药
- C: 磺胺类药物
- D: 胃黏膜保护剂

答案：D

58. 一般含服 5 分钟左右；用药后 30 分钟内不宜吃东西或饮水的是

- A: 咀嚼片
- B: 阴道栓剂
- C: 含漱剂
- D: 舌下片

答案：D

59. 连续应用抗菌药物 / 糖皮质激素眼用制剂的时间不宜超过

- A: 3 天
- B: 7 天
- C: 10 天
- D: 5 天

答案：C

60. 多用于病情急重者的制剂

- A: 滴丸剂
- B: 泡腾片剂
- C: 透皮贴剂
- D: 膜剂

答案：A

61. 下尿路感染的最突出表现是（）

- A: 肾区叩击痛
- B: 伴明显腰痛
- C: 膀胱刺激征
- D: 发热

答案：C

62. 属于浓度依赖性抗生素的是

- A: 美沙拉秦肠溶片
- B: 青霉素
- C: 多黏菌素
- D: 林可霉素

答案：C

63. 服药时进食高脂肪食物可促进药物吸收的是

- A: 格列本脲
- B: 硫酸亚铁
- C: 西咪替丁
- D: 维生素 A

答案：D

64. 以高 TC 为主血症首选

- A: 氟伐他汀
- B: 依折麦布
- C: 阿昔莫司
- D: 非诺贝特

答案：A

65. 原料血浆包装、贮存、运输的温度应控制在

- A: -10℃ 以下。
- B: -15℃ 以下
- C: -4℃ 以下
- D: -20℃ 以下

答案：D

66. 药品不良反应按照程度分为轻度、中度、重度三级。

A: 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无需治疗

B: 没有临床症状，无需治疗

C: 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害

D: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

答案：A

67. 患者，女，48 岁，身高 158cm，体重 72kg。最近因感觉易疲劳、怕冷、嗜睡、记忆力逐渐减退等情况前来就医。医生检查发现，患者眼睑和手部皮肤水肿，声音嘶哑、毛发稀落。实验室检查示：血清 TSH 水平升高。确诊为甲状腺功能减退症。

A: 4-6 周

B: 6-12 周

C: 3-4 周

D: 2-3 周

答案：A

68. 不能用于前列腺增生症治疗的药物是

A: 雄激素受体阻断剂

B: 雄激素

C: α_1 受体阻断剂

D: 5- α 还原酶抑制剂

答案：B

69. 中枢性降压药是

A: 利血平

- B: 可乐定
- C: 拉贝洛尔
- D: 肼苯哒嗪

答案: B

70. 适用于 L-dopa 治疗伴发疗效减退、症状波动的患者

- A: 司来吉兰
- B: 恩托卡朋
- C: 左旋多巴
- D: 苯海索

答案: B

71. 处方中外文缩写 p

- A: 微克
- B: 代表 ()
- C: 临睡时
- D: 必要时

答案: C

72. 新生儿服用氯霉素，因其在体内蓄积导致灰婴综合征，引起药源性疾病的因素主要为

- A: 基础疾病因素
- B: 遗传因素
- C: 年龄因素
- D: 性别因素

答案: C

73. 用于评估癌痛患者疼痛程度的是 ()

- A: 数字评分法
- B: CTP 评分标准
- C: Cochrane 证据分级
- D: APACHE 评分系统

答案：A

74. (2015 年真题) 静脉注射青霉素的适宜溶媒是 ()。

- A: 0.9 氯化钠注射液
- B: 50%葡萄糖注射液
- C: 复方氯化钠注射液
- D: 5%葡萄糖注射液

答案：A

75. 阿司匹林、胺碘酮、他汀类药物、抗抑郁药、广谱抗生素、银杏等能增强效果的是

- A: β 受体阻滞剂普萘洛尔等减慢心率的作用亦钝化
- B: 对异丙肾上腺素的敏感性降低
- C: 心血管系统与维持水电解质平衡的内环境稳定功能减弱，易发生体位性低血压
- D: 肝脏合成凝血因子能力下降，对肝素及华法林非常敏感

答案：D

76. 提示有潜在的风险，需要继续密切监测的信号属于

- A: 驳倒的信号
- B: 尚不确定的信号
- C: 确认的信号
- D: 部分确认信号

答案：B

77. 下列不属于药物警戒工作范畴的是

- A: 发现药物不良反应
- B: 指导制定临床治疗方案
- C: 发现药物相互作用
- D: 药品致死率估计

答案：B

78. 可引起排尿困难，尿潴留患者禁用的药物是

- A: 阿米替林
- B: 法莫替丁
- C: 加兰他敏
- D: 奥美拉唑

答案：A

79. 可碱化尿液，用于代谢性酸中毒的是

- A: 氨基酸
- B: 蛋白质
- C: 硫酸镁
- D: 乳酸钠

答案：D

80. 最有可能确认患者用药伤害事件的方法是

- A: 直接观察
- B: 计算机检测方法
- C: 病历审查
- D: 岗位工作问责

答案：C

81. 患者，男，23 岁，近日出现大便有鲜血、便后出血自行停止、肛门有坠胀感，无感染症状，诊断为痔疮。可用于患者的治疗药物是

- A: 10%樟脑软膏
- B: 复方片仔癀软膏
- C: 地塞米松软膏
- D: 复方甲硝唑栓

答案：B

82. 能增强华法林的抗凝作用的食物是

- A: 芒果
- B: 地瓜
- C: 维生素 K
- D: 韭菜

答案：A

83. 能显示药师的文献评价能力和技巧的咨询服务方法步骤是

- A: 形成答案并以口头形式提供给询问者
- B: 对查阅的资料进行评价、分析和整理
- C: 随访工作效果，并建立档案
- D: 对问题进行确定并归类

答案：B

84. 应用华法林抗凝治疗时，患者应该控制的国际标准化比值为

- A: 2.0~2.5
- B: >3.0
- C: <2.0
- D: 2.0~3.0

答案：D

85. 在日常饮食因素中，对高血压患者用药疗效影响最大的是

A: 饮茶

B: 高糖

C: 食醋

D: 食盐

答案：D

86. 抑制前列腺内双氢睾酮水平，达到降低雄激素水平，提高最高尿流率

A: 哌唑嗪

B: 特拉唑嗪

C: 度他雄胺

D: 索利那新

答案：C

87. 铁剂联用维生素 C

A: 延缓或降低抗药性

B: 作用不同的靶点

C: 促进机体的利用

D: 协同作用

答案：C

88. 妊娠后期长期使用，可导致胎儿严重出血，甚至死胎的药物是

A: 叶酸拮抗剂

B: 阿司匹林

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

C: 雌孕激素、雄激素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/897162034050010024>