

2023-24 年湖南省邵东县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库 AB 卷

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 临床用药实践表明，人类正常饮食中的一些品种将影响某些药物的药理作用。酒是人类饮食中对药物疗效影响最大的品种。酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之其对中枢神经产生抑制作用，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加不良反应发生率。

- A: 血糖不降
- B: 低血糖症状
- C: 过敏反应
- D: 血压升高

答案：B

2. 治疗药源性疾病的方法如下，最先采用的是

- A: 停用致病药物
- B: 拮抗致病药物
- C: 调整治疗方案
- D: 对症治疗

答案：A

3. 胃黏膜保护药硫糖铝应该

- A: 在早、晚餐前 1.5 小时服用

B: 在餐后 1~2 小时服用

C: 在餐前 1 小时服用

D: 在餐前 15 分钟服用

答案: C

4. 微粒型非诺贝特的用量是 ()

A: 0.6g, bid

B: 0.2g, tid

C: 0.2g, qd

D: 0.1g, tid

答案: C

5. 用于紧急避孕的药物是 ()

A: 罗格列酮

B: 甲睾酮

C: 黄体酮

D: 左炔诺孕酮

答案: D

6. 属于蛋白酶抑制剂的是 ()

A: 利托那韦

B: 依非韦伦

C: 利巴韦林

D: 齐多夫定

答案: A

7. 使用非甾体抗炎药治疗类风湿性关节炎时，为预防其胃肠副作用常并用

- A: H
- B: 维生素 K
- C: 钙剂
- D: 碱性药

答案：A

8. 根据时辰药理学，选择最适宜的给药时间，可增强药物疗效、避免不良反应、提高用药依从性以保证正常起居(避免夜尿过多)的是

- A: 清晨服氨基糖苷类
- B: 清晨服抗抑郁药
- C: 清晨服糖皮质激素
- D: 清晨服利尿药

答案：D

9. 对从事药学服务的药师而言，必须具备的专业知识能力要求是

- A: 扎实的药学专业知识
- B: 扎实的外语专业知识
- C: 扎实的人文知识
- D: 扎实的管理专业知识

答案：A

10. 患者男,73 岁,胃溃疡病史 2 年,半年前出现静止性震颤搓丸样运动迟缓,面具脸,慌张步态该患者应使用的药物是 ()

- A: 甲基多巴
- B: 司来吉兰
- C: 多奈哌齐
- D: 多巴丝肼 (苄丝肼左旋多巴)

答案：D

11. 可治疗男性性功能障碍的药物是

- A: 度洛西汀
- B: 维生素 E
- C: 西地那非
- D: 沙美特罗

答案: C

12. 关于肝功能不全患者用药，叙述不正确的是

- A: 口服肝毒性较大时可改为注射给药
- B: 明确诊断，合理选药
- C: 肝功能不全而肾功能正常的患者可选用对肝毒性小，并且从肾脏排泄的药物
- D: 避免或减少使用肝毒性大的药物

答案: A

13. （2018 年真题）患者，男，36 岁，因发热、咳嗽就诊，查血常规：白细胞计数 $6.28 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 65.7%，淋巴细胞百分比 15.1%。诊断为感冒。医生处方：阿奇霉素片 0.5g qd po. 该处方属于（）

- A: 有配伍禁忌
- B: 无适应证用药
- C: 用法、用量不适宜
- D: 有禁忌证用药

答案: B

14. 乙型肝炎病毒感染后在血清里最早出现的是

- A: HBsAg
- B: HBcAb

C: HBeAb

D: HBsAb

答案：C

15. 与蛇胆川贝液不宜联用的药物是

A: 可待因

B: 苯巴比妥

C: 阿托品

D: 氢氧化铝

答案：A

16. 血常规是最常用的医学检查指标，血常规异常可提示人们罹患某些疾患贫血患者常出现的血常规检查异常是

A: 中性粒细胞增多

B: 嗜酸性粒细胞增多

C: 血小板计数增多

D: 血红蛋白减少

答案：D

17. 下列药物不良事件中，属于假、劣药品事件的是

A: “拜斯亭(西立伐他汀)事件”

B: “康泰克 PPA 事件”

C: “万络(罗非昔布)事件”

D: “亮菌甲素事件”

答案：D

18. 耳蜗神经损伤及耳毒性

A: 庆大霉素

B: 阿奇霉素

C: 米诺环素

D: 氯霉素

答案：A

19. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件。处方按其性质分为法定处方和医师处方。《处方管理办法》还将处方分为麻醉药品处方、急诊处方、儿科处方、普通处方等。印刷用纸根据实际需要颜色区分，并在处方右上角以文字注明。

A: 淡绿色

B: 淡红色

C: 淡橙色

D: 淡黄色

答案：D

20. 静滴、静注等给药途径的不良反应发生率较高，说明药源性疾病的药物因素是

A: 不良生活方式

B: 药物制剂因素

C: 生理因素

D: 药物的使用

答案：D

21. 患者，女，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛。血常规见 WBC $15 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 85%。尿常规见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

A: 选用肾毒性小、不良反应少的抗菌药物

- B: 抗菌药物在尿和肾内的浓度要高
- C: 如该患者为妊娠期，可选用氨苄西林
- D: 首选针对革兰阳性菌的药物

答案：D

22. 亚胺培南

- A: 与多种药物存在配伍禁忌，一般应单独给药
- B: 与氯霉素合用因竞争药物的结合位点而产生拮抗作用
- C: 与呋塞米合用可加重肾功能损害
- D: 与丙戊酸钠合用可导致血药浓度过低而引发癫痫

答案：D

23. 会干扰乙醇代谢过程导致双硫仑样反应,用药期间不宜饮酒的药物是()

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 阿奇霉素
- C: 甲硝唑
- D: 阿司匹林

答案：C

24. IV 期新药临床试验样本数要求

- A: ≥ 300 例
- B: 主要病种 ≥ 300 例
- C: 常见病 ≥ 12000 例
- D: 20~30 例

答案：C

25. 患者，女，5 岁，体重 25kg。两天前受凉后发热，最高体温 38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

- A: 每天用药最多不应超过 3 次，用药不超过 3 天
- B: 每天用药最多不应超过 4 次，用药不超过 3 天
- C: 每天用药最多不应超过 6 次，用药不超过 3 天
- D: 每天用药最多不应超过 5 次，用药不超过 3 天

答案：B

26. 尿失禁治疗的首要处理原则是

- A: 调整生活方式
- B: 药物治疗
- C: 进行行为治疗
- D: 除去诱因和针对原发病进行治疗

答案：D

27. 患者，女，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190 / 110mmHg，R30 次 / 分，Bp108 次 / 分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 硝苯地平
- B: 多索茶碱
- C: 硝普钠
- D: 西地兰

答案：D

28. 羟甲戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂（他汀类）所致药源性损伤为

- A: 胃肠道系统损害
- B: 肾损害
- C: 肝损害
- D: 肺损害

答案：C

29. (血常规检查异常的病症) 骨髓增生病

- A: 红细胞沉降率减慢
- B: 血小板增多
- C: 淋巴细胞增多
- D: 白细胞增多

答案：B

30. 避免碘摄入过多，甲亢患者应尽量避免服用的药物是

- A: 链激酶
- B: 氯吡格雷
- C: 胺碘酮
- D: 阿托伐他汀钙

答案：C

31. 急性支气管炎呈自限性，对于急性单纯性支气管炎不建议常规使用抗菌药物，除非是出现了肺炎。治疗通常是对症和支持疗法。

- A: 伪麻黄碱
- B: 愈创木酚甘油醚
- C: 右美沙芬
- D: 苯海拉明

答案：C

32. 冠状动脉粥样硬化性心脏病患者，如无用药禁忌证，欲服用阿司匹林进行治疗，最佳剂量范围是（）

- A: 25~50mg / d
- B: 150~300mg / d
- C: 75~150mg / d
- D: 25~75mg / d

答案：C

33. 血栓性疾病患者实施抗凝治疗，应该控制国际标准化比值为

- A: <0.8
- B: 0.8~1.5
- C: >1.5
- D: 2

答案：B

34. 对中重度痤疮伴感染显著者推荐使用

- A: 10%过氧苯甲酰凝胶
- B: 红霉素-过氧苯甲酰凝胶
- C: 0.1%阿达帕林凝胶
- D: 0.03%维 A 酸乳膏剂

答案：C

35. 患者，48 岁，胸痛部位在心前区，为压迫性疼痛，发作数秒钟，含服硝酸甘油 1~2 秒疼痛即消失。

- A: 可出现干咳症状
- B: 不可吞服，应舌下含服
- C: 可能会出现头痛、面部潮红、心率反射性加快等不良反应
- D: 用药时应取坐位或蹲位

答案：A

36. 抑制细胞色素氧化酶损害中枢神经系统的是

- A: 氯化钠
- B: 磷化氢
- C: 氯化锌
- D: 磷化锌

答案：B

37. (用药与尿液检查异常) 氨苄西林可能引起

- A: 尿肌酐
- B: 尿血红蛋白
- C: 尿酮体
- D: 尿沉渣结晶

答案：D

38. 成本-效果分析

- A: 是成本-效果分析的一种特例
- B: 治疗结果采用临床指标表示，如治愈率
- C: 药物利用指数(DUI)
- D: 成本和治疗结果均用货币表示

答案：B

39. 经肾排泄的药物，在肝功能障碍时

- A: 必须减量应用
- B: 一般无须调整剂量
- C: 须谨慎使用，必要时减量给药
- D: 尽可能避免使用

答案：B

40. 高血压患者的降压目标部分有糖尿病、蛋白尿等高危患者的高血压
()

A: <150 / 90mmHg

B: <140 / 90mmHg

C: <130 / 80mmHg

D: <120 / 80mmHg

答案：C

41. 患者，女，55 岁，因家庭变故，情绪低落，晨起后较严重，近三个月有自杀倾向就诊，诊断为抑郁症，患者既往有高血压、冠心病史 5 年，目前服用卡托普利片、硝酸异山梨酯、阿托伐他汀钙片。本次就诊，医师处方文拉法辛缓释片 150mgqdpo，谷维素片 10mg tidpo 治疗，患者用药后出现血压升高，可能导致该患者血压升高的药物是

A: 硝酸异山梨酯

B: 卡托普利片

C: 文拉法辛缓释片

D: 谷维素片

答案：C

42. 归属于用药评价的是

A: 主要实验室检查数据

B: 主治医师签名

C: 对药物治疗的建设性意见

D: 同时合并应用的药品

答案：C

43. 可应用于有反复性偏头痛的抗偏头痛药是

- A: 阿司匹林
- B: 地西泮
- C: 苯噻啶
- D: 对乙酰氨基酚

答案：C

44. 热程持续 4 周以上，体温持续在 37.5-38℃ 间波动，其属于

- A: 长期低热
- B: 中低等度热
- C: 超高热
- D: 不明原因发热

答案：A

45. 用于治疗苯二氮?类药物中毒的特殊解毒剂是

- A: 氟马西尼
- B: 青霉胺
- C: 乙酰胺
- D: 纳洛酮

答案：A

46. 血栓的发生率增加的指标是

- A: $INR < 3$
- B: $INR > 5$
- C: $INR > 3$
- D: $INR < 1.5$

答案：D

47. 治疗痔疮的常用内服药是

- A: 九华膏
- B: 聚甲酚磺醛栓
- C: 地奥司明
- D: 联苯苄唑乳膏

答案: C

48. 患者,男,59岁,高血压病史5年,因头痛伴有恶心、呕吐就诊,MRI检查结果显示蛛网膜下腔出血。为防治脑血管痉挛,早期宜选用的药物()

- A: 氨氯地平
- B: 尼莫地平
- C: 硝苯地平
- D: 缬沙坦

答案: B

49. 表现为"牛肉样舌"的疾病为

- A: 巨幼细胞性贫血
- B: 再生障碍性贫血
- C: 淋巴瘤
- D: 缺铁性贫血

答案: A

50. 在骨骼疾病的诊断酶学中最重要的是

- A: ALP
- B: ACP
- C: LDH
- D: CK

答案：A

51. 一般情况下，容易透过透析膜被清除的药物是

- A: 分布容积小的药物
- B: 分子量大于 500 的药物
- C: 低水溶性的药物
- D: 血浆蛋白结合率高的药物

答案：A

52. 口服普萘洛尔用于解救的是（）

- A: 氯丙嗪中毒
- B: 苯丙胺中毒
- C: 瘦肉精中毒
- D: 硝西泮中毒

答案：C

53. 与阿莫西林配伍，可提高治疗的是（）

- A: 奥美拉唑
- B: 苄丝肼
- C: 叶酸
- D: 克拉维酸钾

答案：D

54. 丝裂霉素的主要毒副作用是（）

- A: 肺纤维化
- B: 溶血性尿毒症
- C: 出血性膀胱炎
- D: 心脏毒性

答案：B

55. 消化不良很常见，半数以上人群在生命过程中曾因此病症而就诊，其主要症状有上腹饱胀、食欲缺乏等表现。

- A: 胃蛋白酶合剂
- B: 莫沙必利
- C: 胰酶片
- D: 复方阿嗪米特肠溶片

答案：A

56. 患者因股癣前来药店购药，不宜推荐的药物是()

- A: 复方苯甲酸软膏
- B: 酮康唑软膏
- C: 联苯苄唑软膏
- D: 氢化可的松软膏

答案：D

57. 需要在冷处贮存的高警示药品是

- A: 胰岛素
- B: 降钙素
- C: 高锰酸钾
- D: 肾上腺素

答案：A

58. 与西咪替丁、喹诺酮类及大环内酯类药物合用，应减少其用量的药品是

- A: 孟鲁司特
- B: 氨茶碱

C: 异丙托溴铵

D: 噻托溴铵

答案: B

59. 下列药物中，可引起黑便的药物为（）

A: 枸橼酸铋钾

B: 复方氢氧化铝

C: 硫糖铝片

D: 铝碳酸镁

答案: A

60. 采用华法林进行抗凝治疗时，国际标准化比值（INR）的有效安全范围是

A: 0.8~1.5

B: 1.5~2.0

C: 2.0~3.0

D: 3.0~4.0

答案: C

61. 对一般药品而言，安全贮存的环境可以是

A: 室温(20~30℃)

B: 室温 25℃

C: 室温(10~30℃)

D: 室温 20℃

答案: C

62. 引起药源性肾病的药物,阿昔洛韦可导致

A: 前列腺素合成障碍

- B: 肾小管阻塞
- C: 直接肾毒性
- D: 肾间质纤维化

答案：B

63. 适用于已切除子宫的妇女()

- A: 单纯孕激素补充治疗
- B: 单纯雌激素补充治疗
- C: 雌孕激素序贯用药
- D: 雌孕激素连续联合用药

答案：B

64. 高热不退、头痛、谵妄以致昏迷

- A: 神经型
- B: 病毒型
- C: 胃肠型
- D: 肺炎型

答案：A

65. 分解尿酸成为可溶性产物，可诱发抗体生成而使疗效下降，尤其适用于放疗或化疗所致的高尿酸血症的药物是

- A: 非布司他
- B: 苯溴马隆
- C: 枸橼酸氢钾钠
- D: 拉布立酶

答案：D

66. 通风急性发作期应禁用的药物是：

- A: 秋水仙碱
- B: 别嘌醇
- C: 布洛芬
- D: 碳酸氢钠

答案：B

67. 下列药物治疗时，不必进行治疗药物监测的是

- A: 阿苯达唑
- B: 地高辛
- C: 环孢素
- D: 卡马西平

答案：A

68. 缓泻药连续使用的时间一般不应超过

- A: 10 日
- B: 5 日
- C: 3 日
- D: 7 日

答案：D

69. 某患者，男，64 岁，身高 174cm，体重 92kg，既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊。临床处方：阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

- A: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片
- B: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、辛伐他汀片
- C: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、单硝酸异山梨酯注射液
- D: 特拉唑嗪片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片

答案：C

70. 治疗头痛的非处方药应首选

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 阿司匹林
- C: 布洛芬
- D: 谷维素

答案：A

71. 6 个月～2 岁儿童 WBC 计数正常参考区间是

- A: $(200 \sim 300) \times 10$
- B: $(11.0 \sim 12.0) \times 10$
- C: $(4.0 \sim 10.0) \times 10$
- D: $(100 \sim 300) \times 10$

答案：B

72. 静脉滴注速度过快或口服剂量过大，可引起急性肾衰竭的药物是

- A: 阿昔洛韦
- B: 脂肪乳
- C: 利巴韦林
- D: 人促红素

答案：A

73. 某男性患者，57 岁，既往高血压病史 10 年，与儿子吵架后突然起病，言语不清，左侧肢体无力，意识不清，查体：BP220/120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激，左侧肢体不活动，左侧巴宾斯基征阳性。

A: 止血

- B: 脱水
- C: 降血压
- D: 扩容

答案：B

74. 下列治疗痤疮的药物中，患者在治疗期间及治疗结束后 1 个月应避免献血的是：

- A: 红霉素
- B: 异维 A 酸
- C: 过氧甲苯酰
- D: 克林霉素

答案：B

75. （2018 年真题）患者，男，65 岁，诊断为高血压（2 级），同时有哮喘病史，不宜选用的药物是（）

- A: 多沙唑嗪
- B: 卡托普利
- C: 普萘洛尔
- D: 非洛地平

答案：C

76. 可卡因属于兴奋剂中的

- A: β 受体阻断剂
- B: 利尿剂
- C: 麻醉药品
- D: 精神刺激剂

答案：D

77. 1 个半衰期给药 1 次；如需要立即达到稳态，可首剂加倍针对

- A: 半衰期大于 30 小时
- B: 半衰期大于 24 小时
- C: 半衰期小于 30 分钟
- D: 半衰期 8~24 小时

答案：D

78. 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方，氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他丁片 40mgpoqd。

- A: 美托洛尔缓释片
- B: 贝那普利片
- C: 阿司匹林肠溶片
- D: 氨氯地平片

答案：B

79. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

- A: 妊娠 3~5 周
- B: 妊娠 1~3 周
- C: 妊娠 1~2 周
- D: 妊娠 3~4 周

答案：A

80. 能诱发真菌或病毒感染、延缓创伤愈合、升高眼压和导致晶状体浑浊等风险，因此不应随意使用，除非患者是在眼病专科医师的密切监护下使用的结膜炎治疗药物是

- A: 利福平滴眼液
- B: 醋酸氢化可的松滴眼液
- C: 酞丁安滴眼液
- D: 碘苷滴眼液

答案：B

81. 病例系列研究试验结果属于循证医学证据级别的

- A: 2 级证据
- B: 1 级证据
- C: 4 级证据
- D: 3 级证据

答案：C

82. 复方铝酸铋

- A: 宜餐后服用
- B: 宜餐前服用
- C: 宜睡前服用
- D: 宜清晨服用

答案：B

83. 急性缺血性脑卒中抗血小板药物治疗的时机为

- A: 溶栓同时
- B: 溶栓前 12h
- C: 溶栓后 24h
- D: 溶栓后 12h

答案：C

84. 患者女 45 岁。一年前临床诊断为室上性心动过速服用美托洛尔片 25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡幽门螺杆菌阳性。医师处方：埃索美拉唑镁肠溶片 20mgbid，甲硝唑片 0.4gbid，克拉霉素片 50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊 0.6gbid。

- A: 维生素 B2 缺乏
- B: 维生素 B6 缺乏
- C: 维生素 A 缺乏
- D: 维生素 B12 缺乏

答案：D

85. 下列药物中，解救复方樟脑酊中毒的特效药是

- A: 氟马西尼
- B: 硫酸铜
- C: 碳酸氢钠
- D: 纳洛酮

答案：D

86. 抗肿瘤药物中，影响核酸合成的药物是

- A: 顺铂
- B: 依托泊苷
- C: 甲氨蝶呤
- D: 放线菌素

答案：C

87. 属于胃黏膜保护剂的是（）

- A: 多潘立酮
- B: 埃索美拉唑

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 铝碳酸镁

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/898035021051007022>