

医师节竞赛题库 1

一、单选题 每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。(共 197 题)

1. 氨水洗手的浓度为()
A. 1: 500 B. 1: 1000 C. 1: 1500
D. 1: 2000 E. 1: 5000
2. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄最具特征性的检查是()
A. 心电图检查 B. X 线检查 C. 第一心音亢进
D. 皮下小结 E. 以上均不是
3. 问诊正确的是()
A. 你心前区痛反射到左肩吗? B. 你右上腹痛反射到右肩痛吗?
C. 解大便有里急后重吗? D. 你觉得最主要的是哪里不适?
E. 腰痛时反射到大腿内侧痛吗?
4. 诊断心房颤动最重要的证据是()
A. 出现异常的 P 波 B. P 波消失 C. QR 间期不规则
D. QRS 波群形态不一致 E. 心室率快
5. 成人胸外心脏按压, 下列哪项正确()
A. 按压部位在胸骨下段, 剑突上 2.5~5 cm 处
B. 按压时以使胸廓下陷 2 cm 为度
C. 应用冲击式猛压, 下压时间与放松时间比为 2: 1
D. 放松时手掌根离开胸骨 E. 按压频率以 30 次/min 为宜
6. 下列哪种属结缔组织病()
A. 自身敏感性皮炎 B. 湿疹 C. 银屑病
D. 系统性红斑狼疮 E. 天疱疮
7. 肺部比较叩诊不正确的是()
A. 叩诊顺序, 由上至下, 由前至后, 左右对称比较叩诊
B. 叩诊时应注意音响变化 C. 叩前胸与侧壁时板指与肋间平行
D. 叩肩胛间区板指与脊柱平行 E. 叩肩胛下区时板指可任意放置
8. 老年人因切割伤造成无名指端缺损, 且有骨质外露, 处理应选择()
A. 拉拢皮肤直接缝合 B. 中厚皮片移植 C. 带蒂皮瓣移植
D. 缩短指骨缝合皮肤 E. 断指再植
9. 晶状体半脱位时, 临床检查可见()
A. 晶状体向悬韧带断裂的相对方向移位 B. 晶状体向悬韧带断裂方向一致移位

- C. 虹膜震颤、前房一致性变深 D. 在瞳孔区可见 360° 范围的晶状体赤道部
E. 在前房可见油珠状物

10. 在血浆胶体渗透压正常时, 心源性肺水肿是否出现取决于下列哪种因素()

- A. 肺动脉压(PAP) B. 心排血量(CO)
C. 肺毛细血管楔压(PCWP) D. 心排血指数(CI)
E. 右心房压

11. 干槽症的主要症状是()

- A. 大量出血 B. 剧烈疼痛 C. 拔牙创面肉芽水肿
D. 骨壁轻微触痛 E. 体温升高

12. 皮肤检查描述哪项不正确()

- A. 皮肤黏膜出血, 形成红色或暗红色斑, 压之不退色
B. 皮肤黏膜出血, 不高出皮肤, <2 mm 者, 为出血点
C. 荨麻疹呈苍白或片状发红改变, 不突出皮肤表面
D. 皮肤黏膜出血, 高出皮肤, 有波动, >5 mm 为血肿
E. 皮肤有小红点, 高出皮肤表面, 压之退色者为丘疹

13. 测血压时, 袖带过窄将使测得的血压()

- A. 增高 B. 降低 C. 舒张压降低, 脉压增大
D. 脉压变小 E. 不受影响

14. 腹部检查下列哪项错误()

- A. 振水音见于幽门梗阻 B. 肋下扪及肝脏提示肝大 C. 脾脏正常时不能扪及
D. 肠鸣音消失可见于肠麻痹 E. 腹主动脉搏动正常人可触到

15. 肾病综合征诊断标准是()

- A. 尿蛋白超过 3.5 g/d, 血浆蛋白低于 25 g/L
B. 尿蛋白超过 3.0/d, 血浆蛋白低于 28 g/L
C. 尿蛋白超过 3.5 g/d, 血浆蛋白低于 30 g/L
D. 尿蛋白超过 3.5 g/d, 血浆蛋白低于 35 g/L
E. 尿蛋白超过 4.0 g/d, 血浆蛋白低于 35 g/L

16. 关于亚急性细菌性心内膜炎抗菌治疗, 错误的是()

- A. 及早使用抗生素 B. 联合用药 C. 抗生素剂量要足
D. 疗程要长, 一般 4~6 周 E. 等血培养结果后再选用抗生素

17. 气胸作胸膜腔闭式引流放置引流管的部位是()

- A. 锁骨中线第 2 肋间 B. 锁骨中线第 3 肋间 C. 腋前线第 4 肋间
D. 腋前线第 5 肋间 E. 胸骨旁线第 4 肋间

18. 中重度支气管哮喘最主要的治疗药物是()

- A. 茶碱类 B. β 受体激动药 C. 抗胆碱能类

D. 糖皮质激素 E. 抗过敏类

19. 28 岁男性病人，急起发热，胸痛和气促 6 天，叩诊心界明显扩大，吸气时脉搏变弱。1 小时前呼吸困难急剧加重，心率 124 次 / min，齐，心音低远，血压为 8.0 / 6.0kPa(60 / 45mmHg)，颈静脉怒张。最有效的抢救措施为()

A. 静脉注射毛花苷 C B. 肌内注射哌替啶 C. 静脉滴注多巴胺与间羟胺
D. 持续吸高浓度氧 E. 心包穿刺减压

20. 溃疡病临床表现的最主要特征是()

A. 恶心、呕吐 B. 腹胀、暖气 C. 明显反酸
D. 节律性上腹痛 E. 出汗、心悸

21. 关于肺功能检查应用范围，下列哪项是错误的()

A. 确定肺功能障碍的程度 B. 判定肺功能障碍的类型
C. 可以发现肺部较小的病变 D. 可用以判断某些药物的疗效
E. 可以区别心源性和肺源性呼吸困难

22. 急性闭角型青光眼在急性发作期哪项不能作为诊断要点()

A. 视力急剧下降 B. 恶心、呕吐 C. 眼压升高、眼球坚硬如石
D. 混合充血、角膜水肿、瞳孔散大 E. 眼底可见明显青光眼杯

23. 缺氧性晕厥常见于()

A. 房间隔缺损 B. 室间隔缺损 C. 动脉导管未闭
D. 肺动脉瓣狭窄 E. 法洛四联症

24. 有关胸腔穿刺的方法，下列哪项不正确()

A. 穿刺抽液时，穿刺点取浊音明显部位，一般取肩胛线 7~9 肋间隙或腋中线 6~7 肋间
B. 穿刺抽气时，穿刺点取患侧锁骨中线第 2 肋间 C. 穿刺时应沿肋骨下缘进针
D. 抽液量每次不超过 1000 mL E. 抽气量每次可大于 1000 mL

25. 下列哪项不宜做纤维支气管镜检查()

A. 原因不明的咯血 B. 原因不明的咳嗽 C. 原因不明的喉返神经麻痹
D. 痰检结核分枝杆菌阳性，X 线胸片肺无病灶
E. 肺源性心脏病并肺门肿大，原因未明，PaO₂ 40 mmHg

26. 肝昏迷早期膳食应()

A. 禁食豆类 B. 禁食鱼类 C. 低蛋白膳食 D. 低钾 E. 低钠

27. 男，60 岁，发热、咳嗽月余，伴乏力消瘦，体格检查叩得右下肺浊音。下列情况可除外()

A. 肺空洞 B. 肺癌 C. 肺炎 D. 胸腔积液 E. 胸膜增厚

28. 关于新生儿生理性黄疸，下面哪项错误()

- A. 出生后 2~3 天出现黄疸 B. 足月新生儿出生后 2 周内黄疸消退
C. 足月新生儿血清总胆红素不超过 $205.2 \mu\text{mol/L}$
D. 以结合胆红素为主 E. 一般情况好, 不伴有其他症状

29. 下列哪项禁作骨髓穿刺()

- A. 显著血小板减少 B. 粒细胞缺乏症 C. 重度贫血
D. 血友病 E. 恶性组织细胞病

30. 某病人长期发热, 皮肤、关节、心、肝、肾各方面都有病态表现时, 下列哪种诊断可能性最大()

- A. 风湿 B. 结核 C. 肝炎 D. 系统性红斑狼疮 E. 肾脏疾病

31. 三度创面愈合过程的特点为()

- A. 伤后 3~5 天愈合, 不留瘢痕 B. 伤后 1~2 周愈合, 不留瘢痕
C. 3~4 周痊愈, 留有瘢痕 D. 3~4 周痊愈, 不留瘢痕
E. 需植皮后愈合, 遗留瘢痕或畸形

32. 区别腹部肿块来自腹腔或腹壁最简易的检查方法是()

- A. 超声检查 B. 胃肠钡餐检查 C. 腹部体格检查
D. 腹部 X 线平片 E. 放射性核素显像

33. 药物产生的副作用剂量是()

- A. 中毒量 B. LD_{50} C. 无效剂量
D. 极量 E. 治疗剂量

34. 有关气管切开术, 下列哪项不正确()

- A. 病人取仰卧位, 肩垫高、头后仰、颈伸直
B. 皮肤切口从环状软骨下缘至胸骨上切迹稍上方
C. 根据气管环为白色、触之有弹性、穿刺抽出气体来辨认气管
D. 自 2~3 环正中切开气管壁 E. 下呼吸道分泌物阻塞, 不适宜做气管切开

35. 肺心病病人, 测血气: $\text{pH} 7.25$, $\text{PaO}_2 5.3 \text{kPa}(40 \text{mmHg})$,

$\text{PaO}_2 9 \text{kPa}(67.5 \text{mmHg})$, $\text{HCO}_3^- 19 \text{mmol/L}$, $\text{BE} -6 \text{mmol/L}$, 应诊断为()

- A. 失代偿性呼吸性酸中毒 B. 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒
C. 代谢性酸中毒 D. 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒
E. 代偿性呼吸性酸中毒

36. 下列哪项是提示乙型肝炎病毒活动性复制的指标()

- A. HBsAg B. 抗 HBs C. HbeAg
D. 抗 HBe E. 抗 HBc

37. 下列问诊内容正确的是()

- A. 你心前区痛反射到左肩吗 B. 你右上腹痛反射到右肩痛吗

- C. 解大便有里急后重吗 D. 你觉得最主要的是哪里不适
E. 腰痛时反射到大腿内侧痛吗

38. 清创术下列操作哪项是错误的()
A. 伤口周围油污应用松节油擦去 B. 伤口周围皮肤用碘酊、乙醇消毒
C. 切除失去活力的组织和明显挫伤的创缘组织 D. 深部伤口不宜再扩大
E. 用无菌生理盐水或过氧化氢冲洗伤口

39. 关于结膜炎的治疗哪项是错误的()
A. 冲洗结膜囊 B. 冷敷 C. 局部点用抗生素
D. 全身应用抗生素 E. 遮盖患眼

40. 中心性发绀常具有下列哪项特点()
A. 常出现在肢体末梢 B. 伴有皮肤温度降低 C. 见于右心衰时
D. 见于发绀型先天性心脏病时 E. 见于严重休克时

41. 下列哪种股骨颈骨折最容易发生股骨头坏死()
A. 股骨头下骨折 B. 经颈股骨颈骨折 C. 经基底部股骨颈骨折
D. 不完全移位的股骨颈骨折 E. 稳定型股骨颈骨折

42. 下列哪种情况属于急诊血液透析的禁忌证()
A. BUN>30mmol / L B. Cr>908 μmol/L
C. 血钾>6.5mmol / L D. 严重酸中毒
E. 休克

43. 均称体型正常人肝叩诊相对浊音界，哪项是错误的()
A. 右锁骨中线第 5 肋间 B. 右锁骨中线上下径为 9~11 cm
C. 右腋中线第 8 肋间 D. 右肩胛线第 10 肋骨水平
E. 肝绝对浊音界比相对浊音界低 1~2 肋间

44. 乙型病毒性肝炎传给婴儿的主要方式是()
A. 粪-口传染 B. 注射血浆制品 C. 输血
D. 母婴垂直传染 E. 密切生活接触

45. 鉴别右心衰与肝硬化的主要特点是()
A. 有无腹水 B. 有无下肢水肿 C. 肝脏是否肿大
D. 颈静脉是否充盈 E. 有无脾脏肿大

46. 吸气性呼吸困难时，下列哪项叙述不正确()
A. 吸气费力 B. 呼气时伴有哮鸣音 C. 常伴有干咳
D. 高调吸气性喉鸣 E. 重者出现吸气时"三凹征"

47. 念珠菌性阴道炎患者外阴阴道可见()
A. 散在红色斑点 B. 边缘有不规则突起的溃疡 C. 白色膜状物

D. 小阴唇及阴道粘连 E. 阴道分泌物黄色水样

48. 下列穿刺部位, 哪项不正确()

- A. 股静脉穿刺点在腹股沟韧带下方紧靠股动脉外侧 0.5 cm 处
- B. 颈内静脉穿刺在颈部中段, 颈总动脉外侧刺入
- C. 颈内静脉穿刺, 在胸锁乳突肌锁骨头、胸骨头与锁骨形成的三角区顶部刺入
- D. 锁骨下静脉穿刺, 在右锁骨下缘中点或内中 1/3 或外、中 1/3 交界处刺入
- E. 动脉穿刺常选用股动脉、肱动脉或桡动脉

49. 留置导尿管更换的间隔时间为()

- A. 2 天 B. 3 天 C. 2~4 天 D. 5~7 天 E. 1~2 周

50. 女, 60 岁, 突感心前区疼痛, 血压 70/50mmHg, 经用右旋糖酐 40、多巴胺、间羟胺等处理后血压仍不升, 中心静脉压 18cmH₂O, 四肢厥冷且发绀。应给予以下哪项处理()

- A. 硝普钠 B. 去甲肾上腺素 C. 毛花苷 C
- D. 异丙肾上腺素 E. 呋塞米

51. 细菌性痢疾临床分型中哪项属急性()

- A. 慢性迁延型 B. 急性发作型 C. 慢性隐匿型
- D. 中毒型 E. 静止型

52. 治疗血友病 A 最有效的药物是()

- A. 库存全血 B. 白蛋白 C. FVIII 浓缩剂或克隆纯化 FVIII
- D. 糖皮质激素 E. 达那唑

53. 病理反射的出现是由于()

- A. 脊髓反射弧的损害 B. 神经系统兴奋性增高 C. 脑干网状结构损害
- D. 锥体束受损 E. 基底节受损

54. 一位肠梗阻病人发病 4 天入院, 血压 10 / 7kPa, 血钠 130mmol / L, 血钾 3mmol / L, CO₂CP14mmol / L, 其治疗程序应首先()

- A. 纠正酸中毒 B. 补钾 C. 急诊手术 D. 补钠 E. 输全血

55. 关于胃插管术, 下列哪项是错误的()

- A. 在胃扩张、幽门梗阻及食物中毒者可插管进行必要的治疗
- B. 肠梗阻者可插管进行胃肠减压 C. 对昏迷者, 可插管行营养治疗
- D. 对食管静脉破裂出血者, 可插管观察有无活动性出血
- E. 插管抽吸胃液进行分析

56. 已在主动脉第二听诊区闻及舒张期喘息性杂音, 下列哪项体征支持主动脉瓣关闭不全的诊断()

- A. 心尖区舒张期震颤 B. P₂ 亢进分裂 C. 交替脉
- D. 心界向左扩大 E. 血压 150/70mmHg

57. 检查发现病人胸廓的前后径等于横径，肋间隙增宽，应考虑为()
A. 扁平胸 B. 鸡胸 C. 正常胸廓 D. 漏斗胸 E. 桶状胸
58. 扪查乳房的方法哪项不正确()
A. 扪查乳房内半侧时，嘱病人举臂 B. 扪查乳房外半侧时，嘱病人垂臂
C. 应用手指掌面循序轻轻触按乳房 D. 乳房下部肿块，采平卧位举臂触诊
E. 抓捏乳房以利鉴别良、恶性肿瘤
59. 重度颅脑损伤昏迷患者的护理与治疗，下列哪项处理不正确()
A. 维持呼吸道通畅 B. 头低位，对脑水肿的治疗有帮助 C. 加强营养
D. 解除尿潴留 E. 应用促苏醒药物或高压氧治疗
60. 病历书写不正确的是()
A. 入院记录需在 24 小时内完成 B. 出院记录应转抄在门诊病历中
C. 接收（转入）记录由接受科室医师书写
D. 转科（转出）记录由转出科的住院科室医师书写
E. 手术记录由参加手术者均可书写
61. 急性前葡萄膜炎导致瞳孔缩小的最重要因素是()
A. 交感神经兴奋 B. 副交感神经兴奋 C. 瞳孔开大肌麻痹
D. 睫状肌痉挛和瞳孔括约肌持续性收缩 E. 睫状肌麻痹
62. 胸腔穿刺抽液引起急性肺水肿是由于()
A. 穿刺损伤肺组织 B. 抽液过多、过快，胸膜腔内压突然下降
C. 胸膜超敏反应 D. 穿刺损伤肺血管
E. 空气栓塞
63. 口对口人工呼吸时，将病人头部后仰，托起下颌，最主要的目的是()
A. 保持脑血液供应 B. 便于口对口接触 C. 避免口、鼻分泌物流出
D. 解除舌后坠造成的咽阻塞 E. 有利于保护颈椎
64. 关于胃镜检查的适应证，下列哪项不正确()
A. 上腹痛原因未明 B. 呕血原因未明 C. 胃溃疡性质未明
D. 咯血查因 E. 锁骨上淋巴结肿大查因
65. 风湿热急性期应用青霉素的目的是()
A. 控制急性心力衰竭 B. 减少心瓣膜病的发生 C. 清除链球菌感染灶
D. 制止风湿活动的进展 E. 以上都不是
66. 认为是抗动脉粥样硬化的因子是()
A. 乳糜微粒 B. 极低密度脂蛋白 C. 中间密度脂蛋白
D. 低密度脂蛋白 E. 高密度脂蛋白

67. 某休克病人, 心率快, 测中心静脉压为 5 cmH₂O, 应采取()
A. 迅速补充液体 B. 控制小量输液 C. 心功能不全, 立即给强心利尿药
D. 控制输血量, 加用强心药 E. 休克与血容量无关
68. 尿毒症合并感染时, 下列抗生素哪种不宜使用()
A. 青霉素 B. 多黏菌素 C. 林可霉素 D. 红霉素 E. 头孢菌素
69. 血液透析时, 动静脉瘘口的管理哪项是错误的()
A. 保持局部伤口无菌 B. 造瘘肢体不能过度弯曲
C. 严禁在造瘘侧肢体抽血、输液, 但可测量血压 D. 造瘘肢体不能受压
E. 避免包扎过紧
70. 环甲膜穿刺术穿刺针保留时间一般不超过()
A. 6 小时 B. 12 小时 C. 24 小时 D. 48 小时 E. 72 小时
71. 下列哪项不是急性龋的特点()
A. 多见于儿童或青年人 B. 质地湿软 C. 又称干性龋
D. 病变进展较快 E. 龋损呈浅棕色
72. 病程记录的书写下列哪项不正确()
A. 症状及体征的变化 B. 检查结果及分析 C. 各级医师查房及会诊意见
D. 每天均应记录 1 次 E. 临床操作及治疗措施
73. 胸部语颤减退或消失, 不出现于下列哪项情况()
A. 肺气肿 B. 大叶性肺炎 C. 阻塞性肺不张
D. 大量胸腔积液 E. 胸膜增厚
74. 有关骨折急救处理, 下列哪项错误()
A. 首先应止血及包扎伤口
B. 无夹板时, 可用树枝、木棍(板)、步枪等作临时固定支架
C. 可将伤员上肢缚于胸壁侧面, 下肢两腿绑在一起固定
D. 脊椎骨折病人最好俯卧位抬送
E. 搬动脊椎骨折病人时, 应采取一人抱肩, 一人抬腿的方法
75. 进行骨折复位, 下述哪项操作是正确的()
A. 将远端骨折段对准近侧骨折段所指的方向
B. 将近侧骨折段对准远侧骨折段所指的方向 C. 应在肢体的中立位进行复位
D. 应在肢体的功能位进行复位 E. 原则上应以反折、回旋的手法进行复位
76. 免疫具有()
A. 对病原微生物的防御功能 B. 抗原微生物的感染功能
C. 识别和排除抗原性异物的功能 D. 清除损伤和衰老细胞的功能
E. 清除突变细胞的功能

77. 当 HBV 前 C 区 1896 位核苷酸基因突变导致终止密码出现时, 可导致那种抗原消失()
A. HBsAg B. HbeAg C. HBcAg
D. HbxAg E. DreS2
78. 诊断急性心肌梗死最重要的心电图表现是()
A. 病理性 Q 波或 QS 波 B. ST 段弓背向上型上移 C. T 波倒置
D. 对应导联 ST 段下移 E. 多发室性期前收缩
79. 一侧瞳孔直接对光反应消失, 间接光反应存在, 病变在()
A. 同侧动眼神经 B. 对侧动眼神经 C. 同侧视神经
D. 对侧视神经 E. 视交叉
80. 气管切开术后出现广泛皮下气肿, 最简单的处理方法是()
A. 抽吸气体 B. 松解伤口缝线 C. 更换气管套管
D. 让其自行吸收 E. 理疗
81. 当听力较差侧的气导听力低于听力较好侧骨导听力多少即出现影子听力()
A. 10~20dB B. 20~30dB C. 30~40dB
D. 40~50dB E. 50~60dB
82. 左心衰时呼吸困难的特点, 不包括()
A. 活动时加重 B. 休息时减轻 C. 仰卧时加重
D. 常伴淤血性肝大 E. 常采取端坐呼吸体位
83. 目前诊断上消化道出血病因的首选检查方法是()
A. X 线钡餐检查 B. 超声检查 C. 选择性动脉造影
D. 胃镜检查 E. 放射形核素显像
84. 一咯血病人, 胸片示右上肺阴影, 首先应考虑的诊断是()
A. 肺癌 B. 肺炎 C. 肺不张 D. 肺结核 E. 肺脓肿
85. 下述哪项不属常见诊断失误的原因()
A. 病史资料不完整、不准确 B. 体查不细致、不全面 C. 医学知识不足
D. 主观臆断 E. 病人欠合作
86. 在鉴别阵发性室上性心动过速与阵发性室性心动过速时, 以下哪项对阵发性室性心动过速的诊断有肯定的意义()
A. 心室夺获及室性融合波 B. QRS 波群宽大畸形
C. 频率 200 次/min D. T 波与 QRS 波群方向相反
E. 以上都不是
87. 控制性给氧的浓度为()
A. <20% B. 24%~35% C. 35%~40%

D. 40% E. <50%

88. 肝细胞性黄疸应除外以下哪种临床表现()

- A. 血中结合胆红素增加 B. 严重者可出血倾向 C. 尿中结合胆红素阳性
D. 尿中尿胆原增高 E. 严重时大便呈陶土色

89. 深部脓肿切开排脓的指征是()

- A. 局部有红肿、剧痛 B. 全身发热，血白细胞数增高 C. 患部运动功能障碍
D. 局部有压痛及水肿 E. 局部穿刺有脓液

90. 有关纤维支气管镜检查，下列哪项不正确()

- A. 可直接窥视 1~4 级支气管内肿块 B. 可发现叶、段支气管腔阻塞
C. 可进行选择性支气管造影 D. 可直接窥视肺野浸润性病灶
E. 可进行肺浸润性病灶或肺外周肿块的活检

91. 关于胆道镜检查，下列哪项应慎重()

- A. 可疑胆道残余结石的诊断 B. 胆道出血的定位或止血
C. 进行选择性肝内胆管造影 D. 胆总管十二指肠瘘病人
E. 高龄或高危胆道结石

92. 喉黏膜表面麻醉，应用 1%丁卡因总量不应超过()

- A. 20mg B. 30mg C. 40mg
D. 50mg E. 60mg

93. 雾化吸入疗法选用药物时，下列哪种药物特性不适宜()

- A. 无强烈刺激征 B. 水溶性差，相对较稳定的药物 C. 无难闻气味
D. 耐热稳定 E. 机体对该药不过敏

94. 下述哪项不属诊断思维的注意问题()

- A. 现象与本质 B. 主要与次要 C. 临床表现与主诉
D. 局部与整体 E. 典型与不典型

95. 多根多处肋骨骨折因反常呼吸导致呼吸困难时，主要措施是()

- A. 肋间神经阻滞及骨折处封闭 B. 胸腔闭式引流
C. 控制输液量，防止肺水肿 D. 固定胸壁消除反常呼吸
E. 使用呼吸兴奋药

96. 冠心病心肌梗死最常发生在()

- A. 左主干分布的区域 B. 左旋支分布的区域 C. 左前降支分布的区域
D. 右冠状动脉分布区域 E. 室间隔支分布的区域

97. 治疗脑血栓形成最好的方法是()

- A. 急性期慎用血管扩张药 B. 抗凝治疗 C. 降纤治疗
D. 小剂量阿司匹林 E. rt-PA 静脉溶栓治疗

98. 结膜炎的治疗中哪项是错误的()
A. , 冲洗结膜囊 B. 冷敷 C. 局部点用抗生素
D. 全身应用抗生素 E. 遮盖患眼
99. 对所有高脂血症病人, 首要的、基本的, 并需长期坚持的治疗措施应该为()
A. 饮食治疗 B. 体育锻炼 C. 药物治疗
D. 血液净化治疗 E. 外科治疗
100. 肾病性水肿产生的主要因素为()
A. 全身毛细血管渗透性增加 B. 肾小球滤过率下降 C. 低蛋白血症
D. 继发性醛固酮增多 E. 以上均不是
101. 在骨折的急救中, 哪项处理不正确()
A. 首先抢救生命 B. 可用当时认为最清洁的布类包扎创口
C. 妥善的外固定十分重要 D. 开放外露的骨折断端均应立即复位
E. 病人经妥善固定后, 应迅速转运往医院
102. 现场急救时对扎入体内的异物应按下述哪项处理()
A. 立即将扎入体内的异物拔出 B. 将露出体外的异物外端去除后包扎
C. 将扎入体内的异物消毒后缓慢拔除
D. 将扎入体内的异物与身体一并包扎固定
E. 将扎入体内的异物与身体皮肤缝合固定
103. 下列哪项违反了手术时无菌操作规则()
A. 穿无菌手术衣后, 手术者背部不能接触
B. 穿无菌手术衣后, 手术者肩以上不能接触
C. 穿无菌手术衣后, 手术者腰以下不能接触
D. 穿无菌手术衣后, 手术者双手可交叉置于腋下
E. 不可在手术人员背后传递器械
104. 关于高危妊娠的描述, 错误的是()
A. 以往有异常妊娠史或不良分娩史 B. 年龄为 16-35 岁
C. 孕妇有严重合并症, 如心脏病、糖尿病
D. 各种妊娠并发症、胎位异常及骨盆狭窄
E. 早孕期间用过对胎儿有影响的药物或接触放射线
105. 下列关于阴阳学说的基本内容的提法哪项是错误的()
A. 阴阳的交感相错 B. 阴阳的对立制约 C. 阴阳的互根互用
D. 阴阳的消长和平衡 E. 阴阳的竞争势不两立
106. 20 岁男性病人, 近来感乏力、食欲不振、夜有盗汗, 以往无慢性咳嗽及史及肺结核史, X 线胸片检查发现右上肺一肋间有片状模糊阴影, 内有小透亮区, 痰涂片发现抗酸杆菌, 应诊断为()

- A. 右上肺原发型肺结核, 涂(+), 初治
- B. 右上肺继发型肺结核, 涂(+), 初治
- C. 右上肺原发型肺结核, 涂(+), 复治
- D. 右上肺继发型肺结核, 涂(+), 复治
- E. 血行播散型肺结核, 涂(+), 初治

107. 急性吗啡类中毒的特效解毒药是()

- A. 安易醒 B. 解氟灵 C. 纳洛酮
- D. 硫代硫酸钠 E. 亚硝酸异戊酯

108. 神经-体液活化对充血性心力衰竭的影响下述哪项错误()

- A. 心肌收缩活动增强 B. 心肌耗氧分压增加 C. β 受体上调
- D. 心室肥厚扩张 E. 心肌细胞凋亡

109. 主动脉瓣狭窄合并反复发作心绞痛的最好疗法为()

- A. 减少体力活动及强心利尿疗法 B. 进行低温下闭式主动脉瓣狭窄扩张术
- C. 积极准备进行主动脉瓣置换术
- D. 用药物控制心绞痛, 3~5年后再进行手术治疗
- E. 体外循环下主动脉瓣成形术

110. 下列哪种状况的病人不宜做血液透析()

- A. 严重休克低血压 B. 恶心 C. 呕吐 D. 嗜睡 E. 严重水肿

111. 急性胰腺炎患者饮食应()

- A. 少量多餐 B. 低盐饮食 C. 高维生素膳食
- D. 急性期禁食 E. 忌辛辣食物

112. 葡萄胎排出后 HCG 恢复正常的时间最迟不超过()

- A. 4周 B. 6周 C. 8周 D. 10周 E. 12周

113. 以下哪条眼外肌不受动眼神经支配()

- A. 下直肌 B. 上直肌 C. 下斜肌 D. 上斜肌 E. 内直肌

114. 影响精神分裂症预后的因素中, 下列哪种说法是错的()

- A. 有明显阳性家族史, 病前性格缺陷明显者, 预后不佳
- B. 起病较急, 病程呈间断发作者预后较差 C. 发病前有明显诱因者预后较好
- D. 早期发现, 早期治疗, 家庭对病人照顾支持好者, 预后较好
- E. 起病年龄早, 预后差

115. 女, 33岁, 因消瘦乏力, 下腹部发现一肿块, 迅速增大1个月就诊。妇科检查: 子宫正常大小, 右侧扪及儿头大小的囊肿, 活动差, 左侧阴性。剖腹探查见少量血性腹水, 囊肿表面有乳头状突起, 质脆, 有大网膜粘连。该患者选择的手术范围为()

- A. 囊肿摘除术 B. 双附件切除术 C. 双附件切除术+子宫全切除术
- D. 双附件切除术+大网膜切除术

E. 子宫全切除术+双附件切除术+大网膜切除术

116. 最易发生种植复发的涎腺肿瘤是()

- A. 肌上皮癌 B. 多形性腺瘤 C. 腺淋巴瘤
D. 基底细胞腺瘤 E. 嗜酸细胞腺瘤

117. 以下哪种为抗病毒药()

- A. 利福平 B. 克林霉素 C. 红霉素 D. 阿昔洛韦 E. 酮康唑

118. 虹膜炎继发性青光眼是由于()

- A. 虹膜周边前粘连、瞳孔闭锁 B. 房水分泌过多 C. 血-房水屏障功能破坏
D. 玻璃体大量炎症细胞 E. 炎症反复发作使房角后退

119. 小儿体重计算公式正确的是()

- A. 1岁以内婴儿体重=出生时体重(kg)+月龄 $\times$ 0.25kg
B. 7~12月龄婴儿体重=6kg+月龄 $\times$ 0.25kg
C. 2岁以后小儿体重=年龄 $\times$ 2+7或8(kg)
D. 小于6个月龄婴儿体重=出生时体重(kg)+月龄 $\times$ 0.6kg
E. 2岁以前小儿体重=出生时体重(kg)+月龄 $\times$ 0.25kg

120. 胆道感染最常见的致病菌是()

- A. 金黄色葡萄球菌 B. 链球菌属 C. 大肠埃希菌
D. 副大肠埃希菌 E. 铜绿假单胞菌

121. 糖皮质激素的抗休克作用应除外()

- A. 稳定细胞膜和溶酶体膜 B. 增加心排血量,降低外周阻力
C. 维持血管壁的完整性,降低毛细血管壁通透性 D. 抑制花生四烯酸代谢产物
E. 促进垂体 β -内啡肽的分泌

122. 下列传染病中,哪种属于甲类传染病()

- A. 艾滋病 B. 鼠疫 C. 传染性非典型肺炎
D. 肺炭疽 E. 人感染高致病性禽流感

123. 拔牙术中的并发症不包括()

- A. 出血 B. 牙折断 C. 干槽症
D. 颞下颌关节脱位 E. 牙根进入上颌窦

124. 开声门肌肉是()

- A. 环杓后肌 B. 环杓侧肌 C. 杓肌 D. 环甲肌 E. 甲杓肌

125. 女性病人,50岁,右乳内上方可扪及4cm $\times$ 5cm $\times$ 3cm硬块,呈结节状,与皮肤有粘连,右腋下可扪及2cm $\times$ 3cm $\times$ 4cm、融合成块状淋巴结,左锁骨上亦可扪及4cm $\times$ 2cm $\times$ 3cm淋巴结,质硬,应诊断为()

- A. 乳腺结核 B. 乳腺癌Ⅰ期 C. 乳腺癌Ⅱ期

D. 乳腺癌Ⅲ期 E. 乳腺癌Ⅳ期

126. 外界气压降低时, 机体中氮的脱饱和最慢的组织是()

A. 血液 B. 淋巴 C. 脂肪 D. 肌肉 E. 脑灰质

127. 前房角是指()

A. 虹膜之后与睫状体之间的间隙 B. 角膜之后的周边部分
C. 巩、角膜与虹膜睫状体之间的隐窝 D. 角膜与虹膜睫状体之夹角
E. 巩膜与虹膜睫状体之夹角

128. 男, 80 岁, 既往体健, 晨练后突起左下腹剧痛 1 天, 无呕吐, 肛门停止排便排气。体格检查: 明显腹胀, 以左下腹为主, 肠鸣音亢进, 直肠指检阴性。该患者初步诊断为()

A. 乙状结肠扭转 B. 肠套叠 C. 结肠肿瘤
D. 小肠扭转 E. 肠系膜血栓

129. 男, 22 岁, 血压 143/90 mmHg, 大量尿蛋白, 血浆清蛋白 25 g/L。下列何种疾病可能性大()

A. 隐匿性肾炎 B. 高血压肾小动脉硬化 C. 急性肾炎
D. 肾病综合征 E. 慢性肾炎

130. 我国男性病人中最常见的恶性肿瘤是()

A. 肺癌 B. 前列腺癌 C. 肝癌 D. 胃癌 E. 大肠癌

131. 诊断狼疮性肾炎, 下列哪项检查错误()

A. 尿蛋白阳性 B. ANA 阳性 C. C₃ 下降
D. 尿中异形红细胞异常 E. 血免疫球蛋白下降

132. 男, 3kg, 初生 1 天, 皮肤黏膜正常, 心肺正常, 肝肋下 2cm, 脾未扪及,

Hb190g/L, RBC 6.0×10^{12} / L, 末梢血涂片可见少量有核红细胞及少量幼稚粒细胞, Hb

F0.65。该患者可能的诊断是()

A. 新生儿败血症 B. 新生儿血红蛋白病 C. 新生儿红白血病
D. 正常新生儿 E. 新生儿溶血病

133. 缺血性骨坏死最易发生于()

A. 股骨颈骨折 B. 髌骨骨折 C. 髌臼骨折
D. 胫骨下段骨折 E. 肱骨上段骨折

134. 妊娠 38 周先兆子痫, 血压 150/100mmHg(20/13.3kPa), 尿蛋白(++), 尿相对密度 1.024, 血红蛋白 120g/L, 血细胞比容 0.4, 宫底剑突下 2 横指, 左枕前位, 头半固定, 胎头及骨盆正常, 宫口未开。此时选用最恰当的处理是()

A. 剖宫产 B. 硫酸镁解痉加扩容治疗 C. 大剂量利尿药
D. 缩宫素静脉滴注引产 E. 大剂量降压药

135. 情感高涨与欣快症的区别点, 下列哪项是错误的()
- A. 前者对任何事都感兴趣, 表现出轻松愉快, 洋洋自得; 后者给人以呆傻、愚蠢的印象
- B. 前者有较大的感染力; 后者缺乏感染力, 不能与正常人产生共鸣
- C. 前者对知识和智力的利用增加; 后者则下降
- D. 前者与环境的协调性保持完整; 后者与环境保持不协调
- E. 前者是情感性精神病的症状之一; 后者是精神分裂症症状之一
136. 用化学方法杀灭细菌称为()
- A. 消毒性 B. 灭菌法 C. 抗菌术 D. 无菌术 E. 抑菌术
137. 急性前葡萄膜炎的治疗首选的药物是()
- A. 1%阿托品眼膏 B. 2%后马托品眼膏 C. 5%去氧肾上腺素
- D. 0.1%肾上腺素 E. 1%阿托品眼药水
138. 上颌窦癌较为有效的治疗方案为()
- A. 手术治疗 B. 放射治疗 C. 化学治疗
- D. 手术治疗+放射治疗 E. 手术治疗+化学治疗
139. 女, 26岁, 继发性闭经已4年, 检查卵巢不增大, 肌内注射黄体酮5天, 停药后4天引起子宫出血, 再行垂体兴奋试验, 注射后45分钟促黄体素值增高3倍。此病例的闭经原因是()
- A. 丘脑下部 B. 腺垂体 C. 卵巢 D. 神经垂体 E. 子宫
140. 颅内压增高的容积代偿(即空间代偿), 首先有赖于()
- A. 脑组织被压缩, 进而发生脑萎缩 B. 脑组织部分转移 C. 脑血流量的减少
- D. 脑脊液和 / 或静脉血液被排出颅腔外 E. 颅腔的扩大
141. 急性小脑幕裂孔疝时患侧瞳孔散大的机制是()
- A. 中脑动眼神经核受压 B. 视神经受压 C. 动眼神经受压
- D. 迷走神经受压 E. 交感神经受刺激
142. 心肌梗死时最先出现的症状是()
- A. 发热 B. 胃肠道症状 C. 心动过速 D. 心律失常 E. 心绞痛
143. 以下哪项检查为发现心肌缺血、诊断心绞痛最常用而简便的方法()
- A. 心电图 B. 心尖搏动图 C. 心脏B超
- D. 冠状动脉造影 E. 放射性核素心肌显像
144. 肺动脉栓塞病人血清酶学检查时下列哪项增高一般不明显()
- A. CK B. CK-MB C. AST D. LDH E. ALT
145. 胃切除术后最严重的并发症是()

- A. 血栓性静脉炎 B. 十二指肠残端破裂 C. 术后胃出血
D. 术后伤口感染 E. 术后低血糖综合征

146. 关于颅骨的发育, 下述哪项错误()

- A. 颅缝闭合时间为生后 6~8 周 B. 后囟在出生时已很小或已闭合
C. 前囟在 1~1.5 岁时闭合 D. 前囟早闭见于小头畸形
E. 面部骨骼发育较颅骨晚

147. 鼻腔内侧壁支架组成不包括()

- A. 中隔软骨 B. 筛骨正中板 C. 梨骨
D. 腭骨鼻嵴 E. 腭骨垂直部

148. 按三度四分法, 水疱性烧伤伤及()

- A. 表皮 B. 真皮 C. 皮下 D. 皮肤全层 E. 肌肉

149. 开放性脑损伤的描述哪项正确()

- A. 头皮裂伤 B. 颅骨骨折 C. 有脑脊液漏或脑组织从伤口溢出
D. 头皮裂伤并颅骨骨折 E. 以上都不是

150. 传染性非典型肺炎患者血清标本应带冰在几小时内运送至实验室()

- A. 2 小时 B. 4 小时 C. 12 小时 D. 24 小时 E. 72 小时

151. 根据哪方面的临床表现区别中枢性瘫痪和周围性瘫痪()

- A. 肌力的大小 B. 有无感觉障碍 C. 有无病理反射
D. 有无大小便障碍 E. 有无意识障碍

152. 气分证的代表方剂是()

- A. 清营汤 B. 白虎汤 C. 麻杏石甘汤 D. 犀角地黄汤 E. 桑菊饮

153. 关于颅内压增高的临床表现, 下列哪项不正确()

- A. 喷射性呕吐多见 B. 后期常伴有视力障碍 C. 阵发性头痛是主要症状之一
D. 某些病例可始终不出现"三主征" E. 在婴幼儿头痛出现较早且较重

154. 化学性眼外伤急救处理原则首选()

- A. 球结膜下注射止血 B. 扩瞳 C. 冲洗结膜囊
D. 抗感染 E. 理疗

155. 细菌性角膜溃疡中最严重的致病菌是()

- A. 金黄色葡萄球菌 B. 肺炎链球菌 C. 溶血性链球菌
D. 铜绿假单胞菌 E. 流感嗜血杆菌

156. 老年病人, 反复咳嗽、咳痰 10 多年, 近 2 年气促明显, 活动后加重, 就诊当天上午上厕所时突感气促加重, 伴胸痛。体格检查: 双肺呼吸音减弱, 叩诊呈过清音, 左上肺似呈鼓音。急诊检查首选下列哪项()

A. 胸部透视 B. 心电图 C. 血气分析 D. 肺功能检查 E. 血常规

157. 女, 50 岁, 上唇肿胀, 剧痛 2 天。体格检查 上唇中部见紫红色肿块, 局部可见 1 个脓头, 诊断为唇痈。该病人最危险的并发症是()

A. 眶下间隙感染 B. 海绵窦血栓性静脉炎 C. 败血病
D. 高热 E. 鼻旁脓肿

158. 急性下壁心肌梗死的心电图改变主要表现在下列哪些导联()

A. V1~V3 B. II、III、aVF
C. V1~V5
D. I、AVL、V5、V2~V4

159. 脑膜瘤发生于()

A. 蛛网膜细胞 B. 硬脑膜细胞 C. 软脑膜细胞
D. 脑组织细胞 E. 神经纤维细胞

160. 预防破伤风最有效最可靠的方法是()

A. 彻底清创 B. 应用青霉素 C. 注射 TAT
D. 注射人体破伤风免疫球蛋白 E. 注射破伤风类毒素

161. 急性胆囊炎术中发现胆囊内有多发绿豆大小的结石, 治疗宜用()

A. 胆囊造口术 B. 胆囊切除术 C. 胆总管 T 管引流术
D. 括约肌切开术 E. 胆囊切除、胆总管探查 T 管引流术

162. 为预防局部麻醉药的毒性反应, 常用的术前用药是()

A. 吗啡 B. 哌替啶 C. 巴比妥类药物 D. 阿托品 E. 氯霉素

163. 颞骨为一复合骨块, 参与其组成有误的是()

A. 鳞部 B. 鼓部 C. 乳突部 D. 岩部 E. 枕部

164. 关于睑板腺囊肿的手术治疗, 正确的是()

A. 在睑结膜面行一个与睑缘垂直的切口
B. 在睑结膜面行一个与睑缘平行之切口 C. 在皮肤表面行切口
D. 术中用小匙刮去内容物及创口缝合 E. 以上都不是

165. 结核菌素试验呈假阴性者如下述, 但哪项应除外()

A. 重症粟粒性肺结核 B. 重度营养不良 C. 机体免疫功能低下
D. 急性传染病后 E. 接种卡介苗 8 周时

166. 造成休克死亡的三大原因是()

A. 心、脑、肾功能衰竭 B. 心、肺、肾功能衰竭 C. 心、肝、肾功能衰竭
D. 肝、肺、肾功能衰竭 E. 心、肝、肺功能衰竭

167. 下列哪项不属于骨折并发症()

- A. 压疮 B. 缺血性肌挛缩 C. 缺血性骨坏死
D. 关节强直 E. 关节僵硬

168. 某肾病患儿，长期低盐饮食，受凉后呕吐，进食即呕，非喷射性，食欲差，神萎，嗜睡，突起惊厥，呼吸不规则。最可能的原因是()

- A. 低钙血症 B. 低镁血症 C. 合并颅内感染
D. 低钠血症 E. 脑血栓形成

169. 硫喷妥钠静脉麻醉哪种患者应慎用或禁忌()

- A. 体表脓肿切开引流 B. 烧伤换药 C. 痉挛和惊厥
D. 婴幼儿 E. 短小手术

170. 从牙体剖面观察，以下哪项不是牙体的组成部分()

- A. 牙釉质 B. 牙骨质 C. 牙本质 D. 牙髓腔 E. 牙髓

171. 结膜炎的治疗中，哪一项是错误的()

- A. 冲洗结膜囊 B. 冷敷 C. 局部点用抗生素
D. 全身应用抗生素 E. 遮盖患眼

172. 肝性脑病病人血氨增高，导致中枢神经系统功能紊乱最主要的机制()

- A. 干扰大脑的蛋白质代谢 B. 干扰大脑的脂肪代谢 C. 干扰大脑的水盐代谢
D. 干扰大脑的能量代谢 E. 干扰大脑的微量元素的正常含量

173. 下列哪项不是共同性斜视的特点()

- A. 渐进发病 B. 眼球运动无异常 C. 第二斜视角大于第一斜视角
D. 无复视 E. 无代偿头位

174. 骨髓增生极度活跃最多见的疾病是()

- A. 溶血性贫血 B. 缺铁性贫血 C. 急性白血病
D. 失血性贫血 E. 慢性粒细胞白血病

175. 急性腹膜炎合并麻痹性肠梗阻所致的缺水为()

- A. 高渗性缺水 B. 低渗性缺水 C. 等渗性缺水
D. 原发性缺水 E. 继发性缺水

176. 当测量骨盆出口横径<8cm时，应进一步测量()

- A. 骶耻内径 B. 骶耻外径 C. 出口前矢状径
D. 出口后矢状径 E. 耻骨弓角度

177. 传染性非典型肺炎患者的潜伏期为()

- A. 2~21天，多为14天 B. 12天 C. 14~25天
D. 10天 E. 21天

178. 下列恶性组织细胞病临床表现中哪项有误()

- A. 不规则发热 B. 进行性全血细胞减少 C. 进行性肝脾大
D. 进行性淋巴结肿大 E. 进行性呼吸困难

179. 关于脐血管含氧量, 下列哪项错误()

- A. 脐动脉含氧量最高 B. 下腔静脉含氧量较低 C. 脐静脉含氧量较高
D. 主动脉含氧量较低 E. 肺静脉含氧量较少

180. 男, 7 岁, 发热 10 天, 咳嗽 7 天, 左胸痛 1 天, 曾用青霉素 3 天无改善, 体温 40℃, 心率 110 次/min, 呼吸 32 次/min, 咽充血明显, 左背上方呼吸音略低, 未闻及啰

音, 心音强, 血白细胞计数 $9.1 \times 10^9 / L$, 中性细胞占 0.6, 胸片示左肺中部云雾状阴

影。该患儿最可能的诊断是()

- A. 金黄色葡萄球菌肺炎 B. 肺炎支原体肺炎 C. 呼吸道合并病毒性肺炎
D. 腺病毒肺炎 E. 原发综合征

181. 传染性非典型肺炎密切接触者判定标准中, 下列哪项不正确()

- A. 乘坐未配备高效微粒过滤装置的民用航空器的舱内所有人员
B. 乘坐全封闭空调列车, 患者所在硬座、硬卧车厢或软卧同包厢的全部乘客
C. 乘坐全密封空调客车时, 与患者同乘一辆汽车的所有人员
D. 轮船上与患者同一舱室的全部人员和为该舱室提供服务的乘务人员
E. 日常生活中, 曾与患者自其出现症状前 1 周起有过接触的全部人员

182. 鼻外伤引起的脑脊液鼻漏的处理, 下述哪项不正确()

- A. 降低颅内压 B. 鼻腔内药物腐蚀疗法 C. 鼻腔填塞
D. 预防感染 E. 保守治疗无效者应手术治疗

183. 下列关于儿童颌骨骨折治疗原则的叙述错误的是()

- A. 尽早复位 B. 固定时间较成人短 C. 必须恢复伤前的咬合关系
D. 尽可能采用保守治疗 E. 如要手术治疗, 术中应避免损伤牙胚

184. 精神科使用氯丙嗪主要是针对()

- A. 抑郁 B. 兴奋躁动、幻觉妄想、思维障碍 C. 衰弱无力、精神萎靡
D. 情感淡漠、精神衰退 E. 记忆力减退、智能障碍

185. 胆脂瘤型中耳炎最危险的并发症是()

- A. 面瘫 B. 耳后瘻管 C. 颅内并发症 D. 迷路炎 E. 颈深部感染

186. 化脓性骨髓炎是指下列何类组织的化脓性感染()

- A. 骨髓 B. 骨皮质和骨髓 C. 骨骺板和骨髓
D. 骨骺和骨髓 E. 骨髓、骨和骨膜

187. 下列疾病出现心绞痛发作时, 何者不宜用硝酸甘油()

- A. 主动脉瓣关闭不全 B. 主动脉瓣狭窄 C. 梗阻性肥厚型心肌病
D. 稳定型心绞痛 E. 变异型心绞痛

188. 开放性胸部损伤的正确定义是()
A. 胸壁有伤口 B. 肋骨骨折合并血气胸 C. 支气管断裂
D. 胸壁伤口与胸膜腔相通 E. 血气胸伴皮下气肿
189. 法洛三联症常见的症状是()
A. 呼吸困难 B. 心悸气促 C. 杵状指趾 D. 发绀 E. 蹲踞
190. 急性梗阻性化脓性胆管炎最常见的梗阻因素为()
A. 肿瘤或肿瘤压迫 B. 结石、蛔虫 C. 胆管狭窄
D. 慢性胰腺炎 E. 胆肠内引流后吻合口狭窄
191. 尿中出现何种管型对诊断肾盂肾炎有帮助()
A. 红细胞管型 B. 上皮细胞管型 C. 白细胞管型
D. 颗粒管型 E. 混合管型
192. 最常发生习惯性脱位的关节是()
A. 肩关节 B. 肘关节 C. 腕关节 D. 髋关节 E. 膝关节
193. 婴儿佝偻病发病的主要原因是()
A. 甲状旁腺功能不全 B. 维生素 D 缺乏 C. 钙缺乏
D. 食物中钙磷比例不当 E. 婴儿生长发育快
194. 下述哪项不是卵巢功能检查方法()
A. 阴道涂片检查 B. 宫颈粘液检查 C. 基础体温测定
D. 血中雌孕激素测定 E. 测定血清 FSH、LH 及 PRL
195. 关于腺样体肥大, 以下哪项说法是错误的()
A. 可引起耳、鼻、咽喉等症状 B. 多发生于 3~5 岁的儿童, 成人少见
C. 位于鼻咽顶后壁中线处, 为咽淋巴环外环的一部分
D. 严重者可出现腺样体面容 E. 可行腺样体切除术
196. 关于急性肾炎的治疗, 下列哪项是错误的()
A. 青霉素为其特异性治疗 B. 急性期 1-2 周内宜卧床休息
C. 要注意防止急性期严重症状的发生 D. 对症治疗
E. 保护肾功能
197. 成人上颌窦窦腔的平均容积为()
A. 3mL B. 10mL C. 13mL D. 15mL E. 20mL

二、多选题 由一个题干和 A、B、C、D、E 五个备选答案组成, 题干在前, 选项在后。要求考生从五个备选答案中选出二个或二个以上的正确答案, 多选、少选、错选均不得分。(每题 1.0 分, 共 197.0 分)

198. 临床思维的基本原则有()

- A. 实事求是的原则, "一元论"原则
- B. 用发病率和疾病谱观点选择诊断的原则
- C. 首先考虑器质性疾病的诊断, 然后考虑功能性疾病的原则
- D. 首先考虑可治的疾病的原则, 简化思维程序的原则
- E. 见病见人的原则

199. 根据尿道口异常, 尿道下裂可分哪些类型 () ()

- A. 阴茎头型
- B. 阴茎型
- C. 阴囊型
- D. 会阴型
- E. 球部尿道型

200. 关于切痂术, 下述哪些说法是正确的()

- A. 主要适用于三度创面
- B. 平面应达深筋膜
- C. 切痂后尽可能立即植皮
- D. 三度创缘的深二度创面不能使用切痂术
- E. 坏死的深部组织也应切除

201. 以下哪些是静脉切开术的适应证()

- A. 静脉穿刺失败
- B. 需长期输液
- C. 婴幼儿输液
- D. 静脉高营养治疗
- E. 心导管检查

202. 综合的临床诊断应包括()

- A. 病因诊断
- B. 病理解剖诊断
- C. 病理生理诊断
- D. 疾病的分型与分期
- E. 并发症及伴发疾病诊断

203. 下列疾病常用的洗胃液哪些是正确的()

- A. 原因不明急性中毒用温水洗胃
- B. 有机磷农药敌百虫中毒用碳酸氢钠溶液洗胃
- C. 重金属中毒用茶水洗胃
- D. 有机磷农药对硫磷(1605)中毒用高锰酸钾洗胃
- E. 敌百虫中毒用碳酸氢钠洗胃

204. 大肠癌的并发症有()

- A. 肠梗阻
- B. 化脓性腹膜炎
- C. 结肠周围脓肿
- D. 溃疡性结肠炎
- E. 肠出血

205. 超声雾化疗法常用的药物有()

- A. 抗生素
- B. 激素
- C. 平喘镇咳祛痰药
- D. 抗过敏药
- E. 中药

206. 引起腹部压痛的原因有()

- A. 腹部炎症
- B. 肿瘤浸润
- C. 脏器淤血
- D. 肠寄生虫病
- E. 检查手法欠妥

207. 心室率缓慢的心电图可见于()

- A. 房性期前收缩二联律下传受阻
- B. 窦性心动过缓
- C. 心房颤动伴三度 AVB 交界区自转性心律
- D. 室性自转性心律
- E. 非阵发性心动过速室性自转性心律

208. 阴道镜检查, 下述各项中正确的是()

- A. 以复方碘溶液涂布宫颈可发现碘不着色区
- B. 遇典型图像可摄像

- C. 不会发生并发症 D. 对异常区可做活检
E. 观察血管可加绿色滤光器

209. 导尿操作, 下列哪些正确()

- A. 男性消毒从尿道口开始 B. 女性消毒从大腿内侧开始, 由外向内顺序进行
C. 导尿管插入深度为 2.5 cm
D. 膀胱过度充盈, 应立即插入导尿管, 快速放尿
E. 导尿管管径大小适当, 成年男性以 F24~F26 为宜

210. 儿科特殊病史应包括()

- A. 生产史 B. 喂养史 C. 生长发育史 D. 预防接种史 E. 生活史

211. 气管内插管的主要应用范围包括()

- A. 喉梗阻 B. 全身麻醉 C. 喉水肿 D. 呼吸衰竭 E. 心搏骤停

212. 脓疱疮的局部治疗原则是()

- A. 杀菌 B. 消炎 C. 收敛 D. 干燥 E. 消毒

213. 胃肠减压术常用于()

- A. 腹部大手术后 B. 急性胃扩张 C. 肠梗阻
D. 食物中毒 E. 胃、十二指肠穿孔

214. 下列关于肿瘤的叙述中, 哪些是正确的()

- A. 良性肿瘤常呈膨胀性生长 B. 肉瘤少有淋巴转移
C. 肿瘤的良恶性确定依靠病理切片 D. 肿瘤出现转移则不应行根治性手术
E. 对实体瘤的治疗常采用综合疗法

215. 以下哪些情况属于膀胱镜检查禁忌证()

- A. 前列腺肥大症 B. 尿道狭窄 C. 急性膀胱炎及急性尿道炎
D. 膀胱肿瘤 E. 结核性挛缩膀胱

216. 甲状腺危象最主要的临床表现有()

- A. 高热可达 40℃ 以上, 大汗 B. 呕吐、腹泻明显 C. 焦虑、谵妄以致昏迷
D. 心动过速, 150~120 次/min
E. 血中 WBC 和中性粒细胞均显著升高

217. 常见的误诊、漏诊的原因包括下面哪几种()

- A. 病史资料不完整、不确切 B. 观察不细致或检验结果误差
C. 先入为主、主观臆断 D. 医学知识不足、缺乏临床经验
E. 疾病的临床表现不同

218. 过去病史包括下列哪几项内容()

- A. 传染病史及接触史 B. 手术外伤史 C. 家族遗传病史
D. 局灶病史 E. 预防接种史及药物过敏史

219. 以下哪些项目是循证医学的应用范围()
- A. 医疗管理 B. 制定卫生政策 C. 卫生技术评价
D. 指导临床实践 E. 药物研究与应用
220. 放射性¹³¹I 治疗甲状腺功能亢进的机制包括 () ()
- A. β 射线破坏甲状腺组织 B. 破坏甲状腺血管使血流下降, 使甲状腺缩小
C. 破坏淋巴细胞减少 TRAB 的生成 D. 拮抗甲状腺素
E. 经垂体抑制 T3、T4 分泌
221. 以下哪些疾病可通过膀胱镜检查及尿路逆行造影明确诊断()
- A. 输尿管肿瘤 B. 输尿管透 X 线结石 C. 输尿管狭窄
D. 先天性巨输尿管症 E. 肾囊肿
222. 下列通气方法的适应证哪些说法是正确的()
- A. 间歇通气适用于无自主呼吸者
B. 压力支持通气适用于有自主呼吸但通气不足者
C. 呼气末期正压呼吸适用于急性呼吸窘迫综合征
D. 高频通气适用于无自主呼吸者
E. 间歇指令通气和间歇同步指令通气适用于停机过渡的准备
223. 关于子宫肌瘤, 下列哪些说法正确()
- A. 往往在绝经后有所缩小 B. 是妇女最常见的良性肿瘤
C. 可能与雌激素有关 D. 肉瘤变较多见
E. 一般不引起症状而在盆腔检查时被发现
224. 利用消化道内镜进行治疗的有()
- A. 电凝电切息肉 B. 胆道取石 C. 肝癌切除
D. 食管曲张静脉套扎 E. 食管曲张静脉碘化剂治疗
225. 引起侵袭性腹泻, 导致排粘液血便的病原体是 () ()
- A. 志贺菌 B. 空肠弯曲菌 C. 侵袭性大肠埃希菌
D. 葡萄球菌 E. 伤寒沙门菌
226. 胎儿的附属物包括()
- A. 胎盘 B. 胎膜 C. 羊水 D. 蜕膜 E. 脐带
227. 支气管肺癌的早期表现为()
- A. 刺激性咳嗽持续 2~3 周, 治疗无效 B. 新近出现持续性反复痰中带血
C. 反复发作在同一部位的肺炎 D. 无中毒症状的血性胸腔积液
E. 原因不明的四肢关节疼痛
228. 纤维支气管镜检查的并发症有()

A. 出血 B. 并发感染 C. 心搏骤停 D. 喉返神经麻痹 E. 气胸

229. 做脑电图前应要求受检者做好下列哪些准备()

A. 检查前 1 天用肥皂水洗头 B. 检查前应禁食
C. 检查前 1 天应停用镇静、安眠药 D. 检查前停用抗癫痫药 1~3 天
E. 穿衣质量不受限制

230. 长期高浓度持续给氧可能导致()

A. 氧抽搐 B. 抑制呼吸 C. 视力下降
D. 肺氧中毒 E. 二氧化碳潴留

231. 牙根距离上颌窦底很近，拔牙时易将牙根推入上颌窦内的牙齿有 () ()

A. 上颌中切牙 B. 上颌双尖牙 C. 上颌第一磨牙
D. 上颌第二磨牙 E. 上颌尖牙

232. 可引起白细胞减少的常见药物有()

A. 多柔比星 B. 布洛芬 C. 甲硫氧嘧啶 D. 甲基多巴 E. 别嘌醇

233. 奇脉常见于下列疾病()

A. 冠心病 B. 心肌炎 C. 心肌病
D. 心包腔积液 E. 缩窄性心包炎

234. 传染性非典型肺炎病人胸片检查可见()

A. 不同程度的片状、斑片状浸润性阴影 B. 呈网状改变 C. 大片状阴影
D. 常为多叶或双侧改变 E. 阴影消散吸收较快，肺部阴影与症状体征相符

235. 造成临床表现不典型的因素有()

A. 年老体弱 B. 治疗的干扰 C. 医师的认识水平
D. 主诉不清楚 E. 器官移位

236. 有关隔离衣的使用，下列哪些说法正确()

A. 使用过的隔离衣，衣领是污染区 B. 隔离衣只能在隔离区使用
C. 护理不同病种病人不能共用隔离衣 D. 隔离衣应每天更换
E. 隔离衣弄湿后应立即更换

237. 诊断失误包括()

A. 漏诊 B. 误诊 C. 病因判断错误
D. 疾病性质判断错误 E. 延误诊断

238. 颌骨囊肿包括 () ()

A. 根端囊肿 B. 始基囊肿 C. 鳃裂囊肿
D. 鳃裂囊肿 E. 角化囊肿

239. 推拿按摩适合于下面哪几型颈椎病的保守治疗 () ()
- A. 脊髓型颈椎病 B. 食管型颈椎病 C. 交感神经型颈椎病
D. 椎动脉型颈椎病 E. 神经根型颈椎病
240. 传染性非典型肺炎病人出院必须具备的标准是()
- A. 体温正常 7 天以上 B. 呼吸系统症状明显改善 C. X 线胸片有明显吸收
D. 心功能恢复正常 E. 肝功能基本正常
241. 脾功能亢进切脾指征有()
- A. 脾大显著, 造成明显压迫症状 B. 贫血 C. 严重的血小板减少及出血
D. 粒细胞极度减少并有反复感染 E. 骨髓增生减低
242. 下列哪些因素与染色体畸变有关()
- A. 孕母年龄过大 B. 放射线 C. 病毒感染
D. 化学药物 E. 遗传因素
243. 肺主入一身之气, 主要体现在()
- A. 主呼吸之气 B. 肺主宣发 C. 参与气的生成
D. 调节全身气机 E. 布散精微和津液到全身
244. 恶性高血压的特点包括()
- A. 发病急骤, 多见于中、青年 B. 血压显著升高, 尤以收缩压持续升高明显
C. 头痛, 视物模糊, 眼底出血 D. 肾损害突出, 可出现肾功能不全
E. 进展迅速, 预后不佳
245. 小肠梗阻最易产生()
- A. 呼吸性酸中毒 B. 代谢性酸中毒 C. 呼吸性碱中毒
D. 代谢性碱中毒 E. 严重失水
246. 新生儿期发生惊厥应考虑哪些原因()
- A. 新生儿颅内出血 B. 先天性代谢异常 C. HIE
D. 化脓性脑膜炎 E. 高热惊厥
247. 鼻咽癌()
- A. 无地理分布及种族分布特点 B. 黄种人鼻咽癌发病率高 C. 好发于青少年
D. 与 EB 病毒有密切关系 E. 与吸烟有密切关系
248. 诊断血友病的主要实验室检查有()
- A. 凝血时间延长 B. 凝血酶原消耗不良 C. 部分凝血活酶时间延长
D. 血块回缩不良 E. 因子 VIII 活性测定
249. 口腔超声洁治不宜用于 () ()
- A. 放置心脏起搏器的病人 B. 乙型病毒性肝炎病人 C. 肺结核病人
D. 肿瘤病人 E. 艾滋病病人

250. 颅内压增高是神经外科常见的临床病理综合征。是以下疾病的共有征象()()
A. 颅脑损伤 B. 脑肿瘤 C. 脑出血 D. 脑积水 E. 颅内炎症

251. 子宫肌瘤手术指征包括()
A. 黏膜下肌瘤突出子宫颈口者 B. 症状明显, 导致贫血
C. 肌瘤影响生育, 病人要求生育 D. 子宫增大如妊娠 2.5 个月大小
E. 肌瘤小, 近绝经期无症状者

252. Guillain-Barre 综合征的主要临床表现是()
A. 病前 1~4 周有感染史 B. 四肢对称性弛缓性瘫痪 C. 可有脑神经损害
D. 脑脊液蛋白-细胞分离现象 E. 肌电图检查 F 波消失, 神经传导速度减慢

253. 小儿腹泻的治疗原则包括()
A. 调整饮食, 合理用药 B. 应用广谱抗生素积极治疗 C. 预防和纠正脱水
D. 禁食至腹泻停止 E. 保护肠黏膜

254. 急性心肌梗死的并发症包括()
A. 急性左心衰 B. 乳头肌功能失调或断裂 C. 心律失常
D. 心脏破裂 E. 栓塞

255. 关于子宫, 正确的描述是()
A. 未产发的宫颈外口呈圆形 B. 成年妇女宫颈管长约 2.5~3.0cm
C. 子宫内膜基底层无周期性变化 D. 宫颈管黏膜层有许多腺体分泌酸性黏液
E. 子宫浆膜层为覆盖宫体底部及前后面的腹膜

256. 产科病房母乳喂养的规定包括()
A. 早吸吮 B. 24 小时同室 C. 每天喂奶 6~8 次
D. 开奶前不喂食 E. 婴儿吸吮困难时用奶瓶喂

257. 放射介入治疗前准备包括()
A. 治疗前 4~6 小时禁水 B. 做好碘过敏试验 C. 穿刺处备皮
D. 术前做好出、凝血时间测定 E. 停用显影效果的药物

258. 慢性宫颈炎的治疗, 下列哪些正确()
A. 局部上药 B. 全身大量抗生素治疗 C. 电熨治疗
D. 激光治疗 E. Leep 刀治疗

259. 下列哪些疾病与雌激素有关()
A. 子宫内膜癌 B. 卵巢颗粒细胞瘤 C. 卵巢无性细胞瘤
D. 子宫肌瘤 E. 宫颈癌

260. 根据侵犯部位不同, 念珠菌病可分为以下几种类型()
A. 肺念珠菌病 B. 内脏念珠菌病 C. 皮肤念珠菌病

D. 肠道念珠菌病 E. 黏膜念珠菌病

261. 嗅觉减退或丧失可见于()

A. 鼻息肉 B. 颅前窝骨折 C. 鼻骨骨折
D. 萎缩性鼻炎 E. 鼻中隔穿孔

262. 临床上易引起药疹的药物有()

A. 抗生素及解热镇痛类 B. 镇静催眠药及抗癫痫药 C. 异种血清制剂及疫苗
D. 某些中药及制剂 E. 放射造影剂

263. 外科感染的病原体包括()

A. 病毒 B. 细菌 C. 真菌 D. 寄生虫 E. 昆虫

264. 脑血栓形成急性期的治疗方法包括()

A. 抗血小板黏附聚集 B. 尼莫地平拮抗细胞内钙超载
C. 头部或全身亚低温治疗 D. 降纤酶降纤治疗
E. 用依达拉奉清除氧自由基

265. 在高压氧下哪些细菌生长会受抑制()

A. 厌氧菌 B. 某些兼性厌氧菌 C. 某些需氧菌
D. 各种细菌 E. 各种耐药菌

266. 下述哪些是根性感觉障碍的表现()

A. 受损范围呈带状 B. 出现感觉分离 C. 投射性疼痛
D. 症状在病变对侧 E. 受损范围呈节段性

267. 对损伤修复的不利因素有 () ()

A. 感染 B. 低蛋白血症 C. 服用消炎痛 D. 糖尿病 E. 肝硬化

268. 法洛四联症是指 () ()

A. 室间隔缺损 B. 肺动脉口狭窄 C. 右心房肥大
D. 主动脉骑跨 E. 右心室肥大

269. 急性泪囊炎治疗方法正确的是 () ()

A. 早期局部热敷 B. 全身和局部使用敏感抗生素
C. 尽快行泪道冲洗，排出泪囊内的脓液 D. 脓肿形成后应尽快切开排脓
E. 应尽快行泪囊鼻腔吻合术

270. 关于肿瘤的预防，下列哪些叙述是正确的()

A. I 级预防是减少发生率 B. II 级预防是降低死亡率
C. III 级预防是提高生存质量 D. 癌症可用免疫预防，但不宜使用化学预防
E. 有 1/3 的癌是可以预防的

271. 器质性精神障碍的特点包括()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/898040113126006113>