

2019 年住院医师规范化培训(胸心外科)真题精选

[单项选择题]1、

目前引起小儿急性脓胸的最多见的致病菌是（ ）。

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 链球菌
- C. 肺炎双球菌
- D. 大肠杆菌
- E. 结核杆菌

参考答案：A

[单项选择题]2、

主动脉瓣下狭窄的临床特点除外

- A. 管型主动脉瓣下狭窄患者室间隔/左心室壁厚度比值常接近 1.0
- B. 隔膜型主动脉瓣下狭窄隔膜切除后易复发
- C. 合并室间隔缺损则肺动脉高压出现早
- D. 大部分患者合并主动脉瓣关闭不全
- E. 以局限性狭窄为多见

参考答案：C

[单项选择题]3、

术中不易找到阑尾的原因不包括

- A. 切口过小，暴露不好
- B. 麻醉不佳，肌肉不松
- C. 炎症粘连，阑尾被包裹
- D. 阑尾萎缩或已溃烂掉

E. 以上都是

参考答案：D

参考解析：

术中不易找到阑尾的原因包括：切口过小，暴露不好；麻醉不佳，肌肉不松；炎症粘连，阑尾被包裹。故答案应选D。

[单项选择题]4、

国家实行预防接种制度的对象是()

A. 儿童

B. 在校学生

C. 未成年人

D. 成年人

E. 全体社会公民

参考答案：A

[单项选择题]5、

男性，44岁，咳嗽，胸痛3年，半年前曾咳出毛发，胸片示：右前上纵隔一圆形阴影，内有钙化，右上叶近纵隔处小片炎性浸润，首选的处理是

A. 纵隔肿瘤放射治疗

B. 冷冻治疗

C. 抗炎治疗

D. 化学治疗

E. 手术切除肿瘤，修补支气管或切除右上肺叶

参考答案：E

[单项选择题]6、

不是舒张性心力衰竭特点的是

A. 左心室舒张期充盈降低

- B. 左心室射血分数降低
- C. 心肌顺应性下降
- D. 超声心动图 E 峰 < A 峰
- E. 心腔大小可正常

参考答案： B

[单项选择题]7、

某医师在为患者施行右侧乳房肿瘤摘除术时，发现左侧乳房也有肿瘤，当即进行活检，确诊为乳腺病。医师判断将来可能癌变，未征求患者意见。同时切除了左侧乳房。医师的这种做法。违背了病人权利的哪一点

- A. 平等的医疗权
- B. 保密权
- C. 隐私权
- D. 知情同意权
- E. 获得信息权

参考答案： D

[单项选择题]8、

下列胃十二指肠溃疡病，不需外科手术治疗的是

- A. 胃十二指肠瘢痕性幽门梗阻
- B. 胃十二指肠溃疡急性穿孔，腹腔污染严重
- C. 溃疡恶变
- D. 36 岁的男性患者，因十二指肠溃疡引起严重腹痛
- E. 复合溃疡，经正规内科治疗无效

参考答案： D

参考解析：

本题考核的知识点是胃十二指肠溃疡外科治疗的适应证。十二指肠溃疡外科治疗的适应证主要包括：①出现严重并发症（如瘢痕性幽门梗阻、急性穿孔或大出血等）；②内科治疗无效。胃溃疡外科治疗的适应证为：①规律内科治疗无效；②内科治疗溃疡愈合后复发；③出现严重并发症（如瘢痕性幽门梗阻、急性穿孔或大出血等）；④胃十二指肠复合型溃疡；⑤直径 2.5cm 以上、疑有恶性变者。目前仍认为十二指肠溃疡一般不发生恶性变，胃溃疡手术适应证比十二指肠溃疡要宽些。故答案应选 D。

[单项选择题]9、

下列损伤中，易引起肾衰竭的是

- A. 肝破裂
- B. 多发性肋骨骨折
- C. 肾挫裂伤
- D. 挤压伤
- E. 以上都不是

参考答案：D

参考解析：

肝破裂主要导致出血性休克；多发性骨折也可导致休克和运动障碍；肾挫裂伤主要表现为肾区疼痛和血尿；多发肋骨骨折主要出现胸部体征和呼吸障碍。而严重挤压伤处有广泛组织破坏、出血和坏死，大量血红蛋白、肌红蛋白，形成色素管型，可使肾小管堵塞，造成尿少、尿闭；此外，组织坏死及代谢产物均可使肾小球滤过率降低、肾缺血，从而引起休克和急性肾衰竭。故答案应选 D。

[单项选择题]10、

怀疑肺癌的病人应首选哪项检查

- A. 纤维支气管镜检查
- B. 痰脱落细胞检查
- C. 胸部 X 线检查
- D. 经皮肺穿
- E. 剖胸探查术

参考答案：C

参考解析：

胸部 X 线检查是发现肺癌的最重要的一种方法，对鉴别诊断、判定类型、选择疗法、观察病情变化、判定预后均有重要价值。方法包括胸透、摄胸片、断层摄影、支气管或血管造影、电子计算机体层扫描(CT)、磁共振(MRI)等。痰脱落细胞检查是诊断肺癌简便易行的有效方法。要求标本新鲜，反复送检，一般须 4~6 次以上，阳性率可达 80%左右。纤维支气管镜检查最适宜中心型肺癌的检查诊断，可直接观察到癌肿位于支气管腔内的部位、形态、大小，并可进行病理细胞学诊断。

[单项选择题]11、

关于胸壁结核的手术要点，下列正确的是

- A. 彻底切除病变的皮肤及窦道口
- B. 胸壁受累区域组织均需清除干净
- C. 窦道行至肋骨后方时，应切除该段肋骨
- D. 局部敷撒链霉素，放置引流，缝合切口，加压包扎
- E. 以上都是

参考答案： E

参考解析：

胸壁结核的手术要点：①切口。以脓肿为中心，沿肋骨走向作皮肤切口。如有窦道或局部皮肤被累及，可作梭形切口，切除窦道和累及皮肤。②切除浅层脓肿。一般胸壁冷脓肿分为浅层及深层。手术原则是浅层脓肿应彻底切除，深层脓肿应刮除病灶，切除覆盖脓腔的组织，以利填充肌瓣。作浅层脓肿切除时，在切开皮肤并皮下分离至适当大的范围后，切开肌层，将脓肿自肌层分离至肋骨平面的浅、深脓腔交接处，将浅层脓肿壁全部切除。③清除深层脓肿病灶。用探针沿窦道探查肋骨内面的深层脓腔，将受累的肋骨和遮盖脓腔的肋骨、骨膜、肋间肌充分切除，显露脓腔底部，然后将底部的干酪样坏死组织和肉芽组织刮除。④缝合切口。用生理盐水冲洗局部，将链霉素粉撒于残腔内，根据残腔大小，再将附近肌肉分离成瓣，转移充填空腔，用细肠线将肌瓣缝合固定在腔底，最后缝合皮肤。术毕，宜放置引流，切口加压包扎。

[单项选择题]12、

欧美医学伦理学(生命伦理学)四原则不含

- A. 不伤害
- B. 有利
- C. 尊重

D. 胆识

E. 公正

参考答案：D

[单项选择题]13、

在医疗、保健、预防机构中试用期满一年可参加执业医师资格考试者，应具有
的学历是

A. 高等学校医学专科学历

B. 高等学校医学本科学历

C. 中等医学专业学校毕业

D. 中等专业学校医学专业取得执业助理医师资格者

E. 高等学校医学专业专科取得执业助理医师执业证书者

参考答案：B

[单项选择题]14、

结肠癌常见的临床表现可有

A. 贫血、体重减轻

B. 持续腹部不适、隐痛

C. 大便带有黏液和血便

D. 腹部扪及包块

E. 以上均是

参考答案：E

参考解析：

结肠癌的临床表现包括：①排便习惯与粪便性状改变：出现最早；②腹痛：早期常为隐痛、不适或腹胀；③腹部肿块；④肠梗阻；⑤全身症状：贫血、消瘦、乏力、低热。不同病理类型和部位的结肠癌临床表现有所区别。右半结肠癌以全身症状、贫血、腹部肿块为主要表现；左半结肠癌则以肠梗阻、腹泻、便秘、黏液血便为主要表现。故答案应选E。

[单项选择题]15、

在塌方现场挖出一位伤员，烦躁，面部青紫，咳嗽剧烈，吸气呈三凹征，右胸壁压痛和反常呼吸，右股骨折断端外露。首要的紧急处理是

- A. 立即清创包扎固定右股骨骨折
- B. 张力性气胸紧急行右胸腔减压
- C. 清理口腔和呼吸道分泌物与异物
- D. 加压包扎，固定浮动胸壁消除连枷胸
- E. 镇静吸氧

参考答案：C

参考解析：

病人被塌方砸伤和掩埋，有连枷胸、开放性股骨骨折，但最危急的是上呼吸道梗阻。先应清除口腔咽喉分泌物，必要时气管插管保持呼吸道通畅，即C。

[单项选择题]16、

风湿性心脏病二尖瓣狭窄最常见的心律失常是

- A. 室上性心动过速
- B. 心房颤动
- C. 室性早搏
- D. 房室传导阻滞
- E. 房性早搏

参考答案：B

参考解析：

风湿性心脏病二尖瓣狭窄最常见的心律失常是心房颤动。

[单项选择题]17、

下列哪一项不是贲门失弛缓症的治疗方式

- A. 应用解痉药物，少食多餐，避免过冷过热和刺激性饮食
- B. 内镜下末端食管注射肉毒杆菌毒素
- C. 气囊或探条食管扩张疗法

- D. 结肠代食管术
- E. 贲门肌层切开术（Heller 手术）

参考答案：D

[单项选择题]18、

管理本行政区域医师工作的机构是

- A. 县级以上人民政府劳动人事部门
- B. 县级以上人民政府工商行政部门
- C. 县级以上人民政府卫生行政部门
- D. 各级医师协会
- E. 各级政府

参考答案：C

[单项选择题]19、

对于人感染高致病性禽流感患者应当采取的预防、控制措施是

- A. 为甲类传染病，按照甲类处理
- B. 为乙类传染病，按照甲类处理
- C. 为丙类传染病，按照丙类处理
- D. 为丙类传染病，按照乙类处理
- E. 因未发现流行的证据，按常规处理

参考答案：B

参考解析：

新修订的《传染病防治法》规定，对乙类传染病中的非典、肺炭疽和人感染高致病性禽流感患者采取甲类预防、控制措施。

[单项选择题]20、

上腹部手术后出现顽固性呃逆，首先应考虑到

- A. 手术造成膈神经损伤

- B. 腹膜后血肿刺激腹腔神经丛
- C. 膈下感染
- D. 粘连引起胃扭转
- E. 术后肠粘连

参考答案：C

参考解析：

手术后发生呃逆者并不少见，多为暂时性，但有时可为顽固性。呃逆的原因可能是神经中枢或膈肌直接受刺激引起。施行上腹部手术后，如果出现顽固性呃逆，要特别警惕吻合口或十二指肠残端漏，导致膈下感染。此时，应做CT、X线摄片或B超检查，一旦明确有膈下积液或感染，需要及时处理。故答案应选C。

[单项选择题]21、

在何种情况下考虑支气管断裂（ ）。

- A. 广泛皮下气肿
- B. 严重血气胸
- C. 张力性气胸
- D. 明显反常呼吸
- E. 张力性气胸引流后仍有大量气体逸出，肺扩张不全

参考答案：E

[单项选择题]22、

原发性肺癌最常见的组织类型为（ ）

- A. 鳞癌
- B. 腺癌
- C. 肺泡癌
- D. 混合型癌
- E. 肺转移癌

参考答案：A

[单项选择题]23、

女性，45岁，发现颈前偏右有一随吞咽移动肿块，手术切除病理证实甲状腺滤泡腺癌，并作了下列的描述，你认为哪项是不正确的

- A. 与乳头状癌一样，滤泡腺癌均属分化良好的甲状腺癌
- B. 血行转移较乳头状癌更少见
- C. 腺体内多中心比乳头状癌更为少见
- D. 滤泡腺癌预后与肿瘤侵犯血管程度有关
- E. 在同一瘤块中，同时可发现有部分乳头状癌存在

参考答案：B

[单项选择题]24、

《传染病防治法》规定，传染病暴发、流行时，当地政府应当

- A. 立即组织力量进行防治，切断传染病的传播途径
- B. 限制或者停止集市、集会
- C. 停业、停工、停课
- D. 临时征用房屋、交通工具
- E. 宣布疫区

参考答案：A

参考解析：

《传染病防治法》规定，传染病暴发、流行时，当地政府应当立即组织力量，按照控制预案进行防治，切断传染病的传播途径。

[单项选择题]25、

男性，56岁，因进行性吞咽困难5个月就诊，入院检查诊断为食管癌，根据综合情况，决定行食管癌切除术。试问食管癌治疗方法应除外下列哪项

- A. 食管癌切除后，结肠代食管
- B. 食管癌切除后，空肠代食管

C. 食管癌切除后，食管断端吻合

D. 食管癌切除后，胃代食管

E. 胃造瘘术

参考答案：C

[单项选择题]26、

以下哪一项不是治疗慢性脓胸常用的手术方法

A. 塑料球填塞术

B. 改进引流方法

C. 胸廓成形术

D. 胸膜纤维板剥离术

E. 胸膜肺切除术

参考答案：A

参考解析：

塑料球填塞术用于结核病。

[单项选择题]27、

基因诊断及治疗的伦理原则应除外

A. 尊重病人的原则

B. 知情同意的原则

C. 有益于病人的原则

D. 保守秘密的原则

E. 创新至上的原则

参考答案：E

[单项选择题]28、

考虑为腹部实质脏器损伤伴内出血病人，下列检查哪项最重要

A. 季肋部外伤史

- B. 腹部压痛，反跳痛及肌紧张
- C. 血压低于 70/50mmHg
- D. 血红蛋白值逐渐减少
- E. 腹腔穿刺抽出不凝固血液

参考答案：E

参考解析：

诊断性腹腔穿刺和腹腔灌洗术有利于早期诊断并提高确诊率。

[单项选择题]29、

新生儿主动脉瓣狭窄的特点除外

- A. 心内膜纤维弹性组织增生
- B. 可出现差异性发绀
- C. 可出现心内膜下心肌缺血
- D. 外周动脉搏动减弱
- E. 早期治疗均可行双心室矫治

参考答案：E

[材料题]30、

女性，45岁，劳累后胸闷、心悸3年，加重2个月，曾有夜间阵发性呼吸困难及咳血性泡沫痰病史；咯血2次，为痰中血丝。双下肢无明显水肿。既往有四肢关节酸痛史。听诊：心尖区舒张期隆隆样杂音，肺动脉瓣区第二音增强。

[子母单选]1.

该患者最可能的诊断是

- A. 风湿性心脏病二尖瓣关闭不全
- B. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄
- C. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄伴关闭不全
- D. 风湿性心脏病主动脉瓣狭窄
- E. 肺癌

参考答案：B

[子母单选]2.

该患者的病理生理改变以下哪项不符合

- A. 肺淤血
- B. 肺间质水肿
- C. 左房扩大
- D. 左室肥大
- E. 右室肥大

参考答案：D

[子母单选]3.

最合适的治疗方法为

- A. 二尖瓣替换术
- B. 二尖瓣整复术
- C. 二尖瓣直视分离术
- D. 二尖瓣闭式分离术
- E. 不需手术

参考答案：D

[子母单选]4.

如果超声心动图发现该患者有二尖瓣关闭不全存在，则最合适的治疗方法为

- A. 二尖瓣替换术
- B. 二尖瓣球囊扩张术
- C. 二尖瓣直视分离术
- D. 二尖瓣闭式分离术
- E. 不需手术

参考答案：A

[单项选择题]31、

男性，50岁，吞咽异物感1个月，既往有乙型肝炎病史20年，进一步检查应首先考虑

- A. 硬质食管镜检查
- B. 胸部CT检查
- C. 食管内镜超声检查
- D. 食管X线钡剂造影检查
- E. 带网气囊食管脱落细胞学检查

参考答案：E

参考解析：

食管脱落细胞学检查是目前诊断早期食管癌比较可靠的方法，早期食管癌位于黏膜层比较小，内镜容易遗漏。

[单项选择题]32、

生命伦理学诞生于

- A. 19世纪50、60年代美国
- B. 19世纪50、60年代日本
- C. 20世纪50、60年代美国
- D. 20世纪50、60年代日本
- E. 20世纪80、90年代中国

参考答案：C

[单项选择题]33、

一年轻人在打羽毛球时自己的球拍把额头碰破了一块皮，到某医院就医。接诊医生查看后，问明患者属公费医疗，于是开出了CT检查单。查后结果为阴性。此类现象产生的根源是

- A. 医生诊断水平不高

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/898054035024007003>